

**Codeadviezen expertgroep ICD-10**  
versie 20220101

## Inhoud

Inhoud.....	2
Inhoudsopgave op alfabetische volgorde .....	9
Codeadviezen.....	14
0-1 Definitie hoofddiagnose en primaire diagnose .....	14
0-2 Coderen van nevendiaagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ.....	15
0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen .....	17
0-4 Aanvullend coderen.....	18
0-5 Multipele aandoeningen .....	19
0-6 Multiorgaanfalen (MOF) .....	19
0-7 Koemelkallergie.....	19
0-8 Acute exacerbaties bij chronische aandoeningen .....	20
0-9 DES dochter/kleinkind.....	21
0-10 Dubbelzijdige aandoeningen.....	21
0-11 Opname voor diagnostisch onderzoek (zonder behandeling).....	22
0-12 Aandoeningen en complicaties ten gevolge van chirurgische en medische behandeling .. .....	23
0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen.....	31
0-14 Aanduiding 'NAS' bij O-codes en codes voor perinatale aandoeningen.....	32
0-15 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten.....	33
0-16 Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie.....	34
0-17 Onderzoek vanwege positieve iFOBT-test bij darmkankerscreening .....	36
0-18 Plastische (reconstructieve) chirurgie .....	37
0-19 De aanduiding 'NAS' voor aandoeningen niet aanwezig bij start opname .....	37
0-20 Hoofddiagnose bij postoperatieve overname vanuit een ander ziekenhuis.....	40
0-21 Hiërarchie van exclusies .....	41
0-22 Dagger-asteriskcombinaties .....	42
0-23 Neutropene koorts door chemotherapie .....	43
0-24 Hoofddiagnose bij opname voor orgaantransplantatie.....	43
0-25 Primaire diagnose bij interne overname .....	43
1-1 Diarree NNO.....	45
1-3 Bacteriëmie .....	46
1-4 Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie .....	46
1-5 COVID-19.....	47
2-1 Maligne neoplasma van onafhankelijke multipele lokalisaties C97 .....	53
2-4 Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit.....	53
2-5 Doorgroei van maligne neoplasma.....	56

2-6	Marginale zone lymfoom .....	57
2-7	Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie.....	57
2-8	Lymfangitis-, peritonitis- en pleuritis carcinomatosa .....	58
2-9	Symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit.....	59
2-10	Meerdere onafhankelijk gelokaliseerde primaire maligne tumoren in één orgaan .....	60
2-11	Gebruik van code C77.8.....	61
2-12	Secundaire lokalisatie van maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (C81-C96) .....	61
2-13	Recidief carcinoom.....	62
2-14	Mastitis carcinomatosa .....	63
2-15	Codering tumorgedrag bij blaastumoren .....	63
3-1	Postoperatieve afwezigheid milt.....	64
3-3	Doorgeschoten antistolling.....	64
3-4	Macrocytaire anemie zonder foliumzuurdeficiëntie.....	64
3-5	Trombocytose/trombocytemie NNO .....	65
3-6	Anemie door cytostatica .....	65
3-7	Anemie bij neoplasma (C00-D48).....	65
4-1	Ontregelde diabetes.....	66
4-2	Diabetische voet.....	67
4-3	Mitochondriële encefalopathie .....	67
4-4	Refeeding syndroom .....	67
4-5	Type 2-diabetes met insulinebehandeling.....	68
4-6	Hyperosmolaire hyperglykemische ontregelde diabetes mellitus .....	68
5-1	Acute alcoholintoxicatie/ comazuipen .....	69
5-3	Roken.....	69
5-4	Psychomotore retardatie.....	69
5-5	GHB-intoxicatie.....	70
5-6	Schadelijke gevolgen van lachgas (recreatief gebruik).....	70
6-2	Occipitalis neuralgie .....	71
6-4	ICU acquired weakness .....	71
6-5	Rib-tip syndroom.....	71
6-6	Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) .....	72
7-1	Seniel cataract.....	72
9-1	Postoperatief atriumfibrilleren.....	72
9-3	Rechtsdecompensatie en cardiomyopathie.....	73
9-4	Idiopathische pulmonale hypertensie .....	73
9-5	STEMI/non-STEMI .....	73
9-6	Hemorragisch herseninfarct.....	73
9-7	AV geleidingsstoornis .....	74

9-10	Acuut coronair syndroom .....	74
9-11	Recidief myocardinfarct.....	74
9-12	CADASIL.....	75
9-13	Minor stroke .....	75
9-14	Stenose arterie .....	75
9-15	Multipele klepaandoeningen .....	76
9-16	Claudicatio intermittens / Fontaine / PAOD.....	77
9-18	Stenose van een coronaire stent en van een coronaire bypass (CABG).....	78
9-19	Hoofddiagnose bij out of hospital cardiac arrest (OHCA).....	78
9-20	Hoofddiagnose bij behandeling en nazorg acuut myocardinfarct met coronairsclerose... .....	80
9-21	Doorgemaakt CVA (uit de reeks I60-I64).....	81
9-22	Asystolie niet resulterend in reanimatie en/of overlijden.....	82
9-23	Slechte, matige, of verminderde ventrikelfunctie .....	83
9-24	Links- en rechts decompensatio cordis.....	83
9-25	Arteriële wandonregelmatigheden en niet-significante arteriosclerose .....	83
9-26	Aborted myocardinfarct .....	84
9-27	MINOCA .....	84
9-28	Longembolie met rechtsbelasting.....	85
10-1	Exacerbatie van COPD o.b.v. een pneumonie.....	85
10-2	Exacerbatie chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (J40- J47).....	85
10-3	Bronchiale hyperreactiviteit.....	86
10-4	Pneumosepsis .....	86
10-5	Tonsillitis en hypertrofie van de tonsillen bij tonsillectomie.....	87
10-6	Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie .....	87
10-7	Influenza.....	88
10-8	Cryptogene organiserende pneumonie (COP / BOOP) .....	89
10-9	Emfysemateus COPD .....	89
10-10	E-sigaret gerelateerde aandoeningen en gebruik van e-sigaret .....	90
10-11	Astma en COPD overlap syndroom (ACOS) .....	91
10-12	Trapped lung .....	91
10-13	Eosinofiel astma .....	92
11-3	Short bowel syndroom .....	92
11-6	Rectaal bloedverlies.....	92
11-7	Naadlekkage na ileocecale resectie .....	93
11-8	Watermeloenmaag / GAVE.....	93
11-9	High output stoma (HOS) .....	93
11-10	Overloopdiarree .....	94
11-11	Presacraal abces.....	94

11-12	Inwendige herniatio na een gastric bypass.....	94
11-13	Bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening.....	95
12-1	Neuroom in litteken.....	95
12-2	Hand-voet-syndroom na chemotherapie.....	95
12-4	Sacrale dimple.....	96
12-5	Dog-ear.....	96
13-1	Opsoclonus-myoclonussyndroom.....	97
13-2	Haglundse exostose.....	97
13-3	Niet traumatische labrumlesie van het heupgewricht.....	97
13-4	Girdlestone situatie heup.....	97
13-5	Chondropathie en niet traumatisch(e) chondraallesie/ kraakbeenletsel van de knie... ..	98
13-7	Impingement van de enkel.....	98
13-8	Spondylodiscitis.....	98
13-10	Pseudoradiculair syndroom.....	99
13-11	Posttraumatische dystrofie.....	99
13-12	Lage rugpijn.....	100
13-13	Artrose primair / secundair.....	100
13-14	Carpal boss.....	100
13-15	'Oud' versus 'vers' letsel van het bewegingsstelsel.....	101
13-16	Klapvoet.....	101
13-17	Neurogene claudicatio.....	102
13-18	ANCA-geassocieerde vasculitis.....	102
14-1	Fausse route urethra door katheter.....	102
14-2	Urosepsis.....	103
14-3	Preterminale nierinsufficiëntie.....	103
14-4	Astma renale.....	104
14-5	Bacteriurie NNO.....	104
15-1	Partus - hemofilie dragerschap.....	105
15-2	Harde buiken bij een gravida.....	105
15-3	Minder leven (foetale bewegingen) voelen tijdens de zwangerschap.....	105
15-4	Spontane drielingbevalling in ziekenhuis.....	105
15-5	Gebruik O80-O84.....	105
15-6	Dreigende serotiniteit.....	106
15-7	Voortijdig breken van de vliezen.....	106
15-8	Langdurige bevalling.....	107
15-10	Pijnbestrijding bij de bevalling.....	108
15-12	Stuitligging/bevalling.....	108
15-13	Gebruik O35.-.....	109
15-14	GBS-dragerschap bij zwangerschap en bevalling.....	109

15-15	Bekkeninstabiliteit.....	110
15-16	Hoofddiagnose bij bevalling.....	110
15-17	Afbreken zwangerschap vanwege foetale afwijking.....	112
15-18	HIV-positiviteit bij zwangerschap en bevalling.....	113
15-19	O-codes bij andere specialismen dan gynaecologie.....	113
15-20	Zwangerschapsduur missed abortion en intra-uteriene vruchtdood.....	114
15-21	Angst voor de bevalling.....	114
15-22	Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed.....	115
16-1	BRUE/ALTE.....	116
16-2	Zuigeling van moeder met diabetes tijdens zwangerschap zonder gevolgen voor het kind.....	116
16-3	Behoeftte aan extra zorg/aandacht/observatie bij gezonde neonaten.....	117
16-4	Perinatale en neonatale aandoeningen.....	117
16-5	Pasgeborene van moeder met GBS-infectie, pasgeborene geen infectie.....	120
16-6	Pasgeborene van moeder met HIV-infectieziekte, pasgeborene geen infectie.....	121
16-7	Pasgeborene van moeder met GBS- of HIV-dragerschap, pasgeborene geen infectie.....	121
16-8	Pasgeborene zowel prematuur als dysmatuur.....	122
17-1	Pitt-Hopkins syndroom.....	123
17-2	Cheilognatopalatoschisis.....	123
17-3	Gecorrigeerde congenitale afwijkingen.....	123
18-1	Huilbaby.....	124
18-2	Verhoogd PSA.....	124
18-3	Prerenale en postrenale nierinsufficiëntie.....	124
18-5	Keelpijn.....	125
18-6	SIRS.....	125
18-8	Verhoogd troponine.....	126
18-9	Hemodynamische instabiliteit.....	127
18-10	Longinfiltraat NNO.....	127
18-11	Consolidatie long NNO.....	127
19-1	Aneurysma spurium / vals aneurysma t.g.v. een hartkatheterisatie.....	128
19-2	Mediale en laterale collumfractuur.....	128
19-3	Delayed graft na een transplantatie.....	129
19-4	Brandwonden.....	129
19-5	Trauma capitis.....	129
19-6	Licht traumatisch schedelhersenletsel (LTSH).....	130
19-7	CAPD-gerelateerde peritonitis.....	130
19-8	Lijnsepsis.....	131
19-9	Luxatie gewrichtsprothese door ongeval.....	131

19-10	Antebrachiifractuur .....	132
19-11	Subcutaan gelopen infuus (extravasatie) .....	132
19-12	Complicatie van een JJ-stent (dubbel J-katheter) .....	133
19-13	Niet-traumatisch subcutaan emfyseem.....	133
20-2	Vervoermiddelen .....	134
20-3	Rollator .....	134
20-4	Val uit maxi cosi etc .....	134
20-5	Peritoneaal dialyse.....	135
20-6	Complicaties na het plaatsen van orthopedische protheses.....	135
20-7	Vierde en vijfde teken bij ongevalstoedracht.....	136
20-8	Y-codering bij complicaties door genees- en heelkundige behandeling.....	137
20-9	Ongevalscode voor gewonde scooterrijder .....	138
20-10	Gebruik van meerdere codes uit hoofdstuk 20 .....	139
20-11	Y-code voor bijwerking van immunotherapie als behandeling voor maligne aandoening.....	139
20-12	Ongeval met elektrische step.....	139
21-2	Palliatieve zorg .....	140
21-5	Status na gastric bypass.....	140
21-6	Status na sleeve gastrectomie .....	140
21-7	Status na plaatsing endoluminale sleeve .....	141
21-8	Verwijderen van een CAPD katheter .....	141
21-9	Z76.3 en Z76.2.....	141
21-10	Abstinerend beleid.....	142
21-11	Status na CABG en PTCA.....	142
21-12	Z-codes voor verrichtingen in de LBZ.....	142
21-13	Leeftijdsgrens oudere primigravida en zeer jonge primigravida.....	143
21-14	Opname voor preventieve verrichtingen i.v.m. genetische aanleg.....	143
21-15	Status na TIA.....	144
21-16	Euthanasie .....	144
21-17	Aanwezigheid van katheters.....	145
Wijzigingen.....		146
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20220101 .....	146
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20211001 .....	148
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20210701 .....	149
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20210401 .....	150
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20210101 .....	152
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20201001 .....	155
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20200701 .....	156
	Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20200501 .....	156

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20200101 .....	157
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20191001 .....	158
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20190401 .....	158
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20190101 .....	159
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20181001 .....	160
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20180701 .....	160
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20180401 .....	161
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20180101 .....	162
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20171001 .....	163
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20170701 .....	163
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20170401 .....	163
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20170101 .....	164
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20161001 .....	165
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20160701 .....	165
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20160401 .....	166
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20160101 .....	167
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20151001 .....	167
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150801 .....	169
Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 .....	170
Bijlage 1 Lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren .....	171

De eerste 2 cijfers van de codeadviezen verwijzen naar het betreffende hoofdstuk in de systematische lijst van de ICD-10. Adviezen beginnend met een 0 verwijzen niet naar een specifiek hoofdstuk. De "oude" ICD-9 codeadviezen (CvZ'80) mogen als leidraad worden gebruikt als de ICD-10, of bovenstaande ICD-10 adviezen geen antwoord geven op uw vraag.

Met de ingangs- of mutatedatum van een advies wordt bedoeld dat het advies geldig is voor opnames met ontslag vanaf die datum.

## Inhoudsopgave op alfabetische volgorde

0-12	Aandoeningen en complicaties ten gevolge van chirurgische en medische behandeling	23
0-13	Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen	31
0-14	Aanduiding 'NAS' bij O-codes en codes voor perinatale aandoeningen	32
0-4	Aanvullend coderen	18
21-17	Aanwezigheid van katheters	145
9-26	Aborted myocardinfarct	84
21-10	Abstinerend beleid	142
5-1	Acute alcoholintoxicatie/ comazuipen	69
0-8	Acute exacerbaties bij chronische aandoeningen	20
9-10	Acuut coronair syndroom	74
15-17	Afbreken zwangerschap vanwege foetale afwijking	112
13-18	ANCA-geassocieerde vasculitis	102
3-7	Anemie bij neoplasma (C00-D48)	65
3-6	Anemie door cytostatica	65
19-1	Aneurysma spurium / vals aneurysma t.g.v. een hartkatheterisatie	128
15-21	Angst voor de bevalling	114
19-10	AntebrachiifRACTuur	132
6-6	Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)	72
9-25	Arteriële wandonregelmatigheden en niet-significante arteriosclerose	83
13-13	Artrose primair / secundair	100
10-11	Astma en COPD overlap syndroom (ACOS)	91
14-4	Astma renale	104
9-22	Asystolie niet resulterend in reanimatie en/of overlijden	82
9-7	AV geleidingsstoornis	74
1-3	Bacteriëmie	46
14-5	Bacteriurie NNO	104
16-3	Behoeftte aan extra zorg/aandacht/observatie bij gezonde neonaten	117
15-15	Bekkeninstabiliteit	110
11-13	Bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening	95
19-4	Brandwonden	129
10-3	Bronchiale hyperreactiviteit	86
16-1	BRUE/ALTE	116
9-12	CADASIL	75
19-7	CAPD-gerelateerde peritonitis	130
13-14	Carpal boss	100
17-2	Cheilognatopalatoschisis	123
13-5	Chondropathie en niet traumatisch(e) chondraallesie/ kraakbeenletsel van de knie	98
9-16	Claudicatio intermittens / Fontaine / PAOD	77
0-2	Coderen van nevendagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ	15
2-15	Codering tumorgedrag bij blaastumoren	63
19-12	Complicatie van een JJ-stent (dubbel J-katheter)	133
20-6	Complicaties na het plaatsen van orthopedische protheses	135
18-11	Consolidatie long NNO	127

1-5	COVID-19	47
10-8	Cryptogene organiserende pneumonie (COP / BOOP)	89
0-22	Dagger-asteriskcombinaties	41
0-19	De aanduiding 'NAS' voor aandoeningen niet aanwezig bij start opname	37
0-1	Definitie hoofddiagnose en primaire diagnose	14
19-3	Delayed graft na een transplantatie	129
0-9	DES dochter/kleinkind	21
4-2	Diabetische voet	67
1-1	Diarree NNO	45
12-5	Dog-ear	96
9-21	Doorgemaakt CVA (uit de reeks I60-I64)	81
3-3	Doorgesloten antistolling	64
2-5	Doorgroei van maligne neoplasma	56
15-6	Dreigende serotiniteit	106
0-10	Dubbelzijdige aandoeningen	21
10-9	Emfysemateus COPD	89
10-13	Eosinofiel astma	92
10-10	E-sigaret gerelateerde aandoeningen en gebruik van e-sigaret	90
21-16	Euthanasie	144
10-2	Exacerbatie chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (J40- J47)	85
10-1	Exacerbatie van COPD o.b.v. een pneumonie	85
14-1	Fausse route urethra door katheter	102
15-14	GBS-dragerschap bij zwangerschap en bevalling	109
15-13	Gebruik O35.-	109
15-5	Gebruik O80-O84	105
2-11	Gebruik van code C77.8	61
20-10	Gebruik van meerdere codes uit hoofdstuk 20	139
17-3	Gecorrigeerde congenitale afwijkingen	123
5-5	GHB-intoxicatie	70
13-4	Girdlestone situatie heup	97
13-2	Haglundse exostose	97
12-2	Hand-voet-syndroom na chemotherapie	95
15-2	Harde buiken bij een gravida	105
18-9	Hemodynamische instabiliteit	127
9-6	Hemorragisch herseninfarct	73
0-21	Hiërarchie van exclusies	41
11-9	High output stoma (HOS)	93
15-18	HIV-positiviteit bij zwangerschap en bevalling	113
9-20	Hoofddiagnose bij behandeling en nazorg acuut myocardinfarct met coronairsclerose	80
2-4	Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit	53
15-16	Hoofddiagnose bij bevallingen	110
0-24	Hoofddiagnose bij opname voor orgaantransplantatie	43
9-19	Hoofddiagnose bij out of hospital cardiac arrest (OHCA)	78
0-20	Hoofddiagnose bij postoperatieve overname vanuit een ander ziekenhuis	40
10-6	Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie	87
18-1	Huilbaby	124

4-6	Hyperosmolaire hyperglykemische onregelde diabetes mellitus	68
6-4	ICU acquired weakness	71
9-4	Idiopathische pulmonale hypertensie	73
13-7	Impingement van de enkel	98
10-7	Influenza	88
11-12	Inwendige herniatie na een gastric bypass	94
18-5	Keelpijn	125
13-16	Klapvoet	101
0-7	Koemelkallergie	19
13-12	Lage rugpijn	100
15-8	Langdurige bevalling	107
0-15	Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten	33
21-13	Leeftijdsgrens oudere primigravida en zeer jonge primigravida	143
19-6	Licht traumatisch schedelhersenletsel (LTSH)	130
19-8	Lijnsepsis	131
9-24	Links- en rechts decompensatio cordis	83
9-28	Longembolie met rechtsbelasting	85
18-10	Longinfiltraat NNO	127
19-9	Luxatie gewrichtsprothese door ongeval	131
2-8	Lymfangitis-, peritonitis- en pleuritis carcinomatosa	58
3-4	Macrocytaire anemie zonder foliumzuurdeficiëntie	64
2-1	Maligne neoplasma van onafhankelijke multipele lokalisaties C97	53
2-6	Marginale zone lymfoom	57
2-14	Mastitis carcinomatosa	63
19-2	Mediale en laterale collumfractuur	128
2-10	Meerdere onafhankelijk gelokaliseerde primaire maligne tumoren in één orgaan	60
15-3	Minder leven (foetale bewegingen) voelen tijdens de zwangerschap	105
9-27	MINOCA	84
9-13	Minor stroke	75
4-3	Mitochondriële encefalopathie	67
0-6	Multiorgaanfalen (MOF)	19
0-5	Multipele aandoeningen	19
9-15	Multipele klepaandoeningen	76
11-7	Naadlekkage na ileocoecale resectie	93
13-17	Neurogene claudicatio	102
12-1	Neuroom in litteken	95
0-23	Neutropene koorts door chemotherapie	42
13-3	Niet traumatische labrumlesie van het heupgewricht	97
2-7	Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie	57
19-13	Niet-traumatisch subcutaan emfyseem	133
6-2	Occipitalis neuralgie	71
15-19	O-codes bij andere specialismen dan gynaecologie	113
0-17	Onderzoek vanwege positieve iFOBT-test bij darmkankerscreening	36
20-12	Ongeval met elektrische step	139
20-9	Ongevalscode voor gewonde scooterrijder	138
4-1	Ontregelde diabetes	66

0-11	Opname voor diagnostisch onderzoek (zonder behandeling)	22
21-14	Opname voor preventieve verrichtingen i.v.m. genetische aanleg	143
13-1	Opsoclonus-myoclonussyndroom	97
13-15	'Oud' versus 'vers' letsel van het bewegingsstelsel	101
11-10	Overloopdiarree	94
21-2	Palliatieve zorg	140
15-1	Partus - hemofilie dragerschap	105
16-7	Pasgeborene van moeder met GBS- of HIV-dragerschap, pasgeborene geen infectie	121
16-5	Pasgeborene van moeder met GBS-infectie, pasgeborene geen infectie	120
16-6	Pasgeborene van moeder met HIV-infectieziekte, pasgeborene geen infectie	121
16-8	Pasgeborene zowel prematuur als dysmatuur	122
16-4	Perinatale en neonatale aandoeningen	117
20-5	Peritoneaal dialyse	135
15-22	Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed	115
15-10	Pijnbestrijding bij de bevalling	108
17-1	Pitt-Hopkins syndroom	123
0-18	Plastische (reconstructieve) chirurgie	37
10-4	Pneumosepsis	86
9-1	Postoperatief atriumfibrilleren	72
3-1	Postoperatieve afwezigheid milt	64
13-11	Posttraumatische dystrofie	99
18-3	Prerenale en postrenale nierinsufficiëntie	124
11-11	Presacraal abces	94
14-3	Preterminale nierinsufficiëntie	103
0-25	Primaire diagnose bij interne overname	43
13-10	Pseudoradiculair syndroom	99
5-4	Psychomotore retardatie	69
9-3	Rechtsdecompensatie en cardiomyopathie	73
2-13	Recidief carcinoom	62
9-11	Recidief myocardinfarct	74
11-6	Rectaal bloedverlies	92
4-4	Refeeding syndroom	67
6-5	Rib-tip syndroom	71
5-3	Roken	69
20-3	Rollator	134
12-4	Sacrale dimple	96
5-6	Schadelijke gevolgen van lachgas (recreatief gebruik)	70
2-12	Secundaire lokalisatie van maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (C81-C96)	61
7-1	Seniel cataract	72
11-3	Short bowel syndrome	92
18-6	SIRS	125
9-23	Slechte, matige, of verminderde ventrikelfunctie	83
13-8	Spondylodiscitis	98
15-4	Spontane drielingbevalling in ziekenhuis	105
21-11	Status na CABG en PTCA	142

21-5	Status na gastric bypass	140
21-7	Status na plaatsing endoluminale sleeve	141
21-6	Status na sleeve gastrectomie	140
21-15	Status na TIA	144
9-5	STEMI/non-STEMI	73
9-14	Stenose arterie	75
9-18	Stenose van een coronaire stent en van een coronaire bypass (CABG)	78
15-12	Stuitligging/bevalling	108
19-11	Subcutaan gelopen infuus (extravasatie)	132
2-9	Symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit	59
10-5	Tonsillitis en hypertrofie van de tonsillen bij tonsillectomie	87
10-12	Trapped lung	91
19-5	Trauma capitis	129
3-5	Trombocytose/trombocytemie NNO	65
4-5	Type 2-diabetes met insulinebehandeling	68
14-2	Urosepsis	103
20-4	Val uit maxi cosi etc.	134
18-2	Verhoogd PSA	124
18-8	Verhoogd troponine	126
20-2	Vervoermiddelen	134
21-8	Verwijderen van een CAPD katheter	141
20-7	Vierde en vijfde teken bij ongevalstoedracht	136
0-16	Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie	34
1-4	Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie	46
15-7	Voortijdig breken van de vliezen	106
0-3	Waarschijnlijkheidsdiagnosen	17
11-8	Watermeloenmaag / GAVE	93
20-11	Y-code voor bijwerking van immunotherapie als behandeling voor maligne aandoening	139
20-8	Y-codering bij complicaties door genees- en heelkundige behandeling	137
21-9	Z76.3 en Z76.2	141

# Codeadviezen

## 0-1 Definitie hoofddiagnose en primaire diagnose

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 15-01-2014  
mutatiedatum: 01-07-2016 (definitie primaire diagnose toegevoegd, definitie hoofddiagnose is niet aangepast)

### **Definitie hoofddiagnose bij gebruik van de ICD-10 in de LBZ (voorheen LMR)**

Onder hoofddiagnose wordt in de LBZ verstaan de diagnose die achteraf (dus bij ontslag) wordt beschouwd als de belangrijkste reden van de opname in het ziekenhuis.

De hoofddiagnose hoeft dus niet de zwaarste diagnose te zijn. Het kan zijn dat een patiënt gedurende de ziekenhuisopname een nieuwe aandoening krijgt, die ernstiger is dan de aandoening waarvoor de patiënt is opgenomen. Deze nieuwe diagnose wordt dan als nevendiagnose geregistreerd, met de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname. Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, dan gaat het bij de hoofddiagnose niet per se om de doodsoorzaak. Ook bij overlijden wordt als hoofddiagnose de diagnose geregistreerd die achteraf wordt beschouwd als de oorzaak van de opname in het ziekenhuis.

Met deze definitie wordt dus afgeweken van de richtlijnen ICD-10, waarin als hoofddiagnose wordt gehanteerd dat 'de diagnose die aan het eind van het zorgmoment wordt gesteld voor de aandoening die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de behoefte van de patiënt aan behandeling of onderzoek'.

In het kader van de LBZ wordt vooralsnog dezelfde definitie gehanteerd voor hoofddiagnose als in het kader van de LMR. Voor de langere termijn zal in overleg met betrokken partijen worden nagegaan of en op welke wijze wordt aangesloten op de internationaal geldende definitie (conform richtlijnen ICD-10).

### **Definitie primaire diagnose**

De primaire diagnose is de diagnose die door het specialisme dat de zorg verleent achteraf (dus bij ontslag) beschouwd wordt als de voornaamste reden van opname, overname, medebehandeling of ICC.

(De hoofddiagnose is één van de primaire diagnoses die tijdens een opname is vastgelegd.)

## 0-2 Coderen van nevensdiagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-04-2016 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-01-2020

### Vraag

Welke nevensdiagnosen zijn relevant om te registreren bij de (dag)opnamen binnen de LBZ?

### Advies

Codeer alle nevensdiagnosen en risicofactoren die gedurende de huidige (dag)opname naast elkaar voorkomen of zich ontwikkelen en van invloed zijn op de behandeling of de uitkomst van de behandeling van de patiënt.

Het coderen van de nevensdiagnosen betreft slechts de aandoeningen die de huidige (dag)opname beïnvloeden op één van de volgende manieren:

- er is onderzoek of diagnostiek uitgevoerd
- er is een behandeling uitgevoerd
- er is een verlenging van de duur van het verblijf
- er is extra verpleegkundige zorg en/of andere monitoring nodig

Tevens is een selectie van (chronische) aandoeningen en risicofactoren gemaakt waarvan aannemelijk is dat zij van invloed zijn op de gezondheid, behandeling en/of prognose van de patiënt. Deze zijn samengevoegd tot een lijst. Zie bijlage 1 voor de Lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren.

Op deze lijst staan

- chronische aandoeningen en factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden -> indien vermeld, worden deze te allen tijde aanvullend gecodeerd
- aandoeningen en factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden die mogelijk genezen/overgaan -> indien vermeld, worden deze uiteraard alleen gecodeerd als ze nog actueel zijn

In beide gevallen hoeven de aandoeningen niet perse een relatie tot de opname te hebben.

Diagnosen die niet op de lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren staan en geen invloed hebben op de patiëntenzorg tijdens het huidige verblijf in het ziekenhuis worden niet gecodeerd, zelfs al zijn ze aanwezig.

Diagnosen die betrekking hebben op een vorige (dag)opname, niet op de lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren staan, en die geen invloed hebben op de huidige (dag)opname, worden niet gecodeerd.

### Toelichting

Binnen de LBZ worden de hoofddiagnose en eventuele nevensdiagnosen vastgelegd. Voor een correcte registratie is het belangrijk de juiste hoofddiagnose vast te leggen en de co-morbiditeit weer te geven aan de hand van nevensdiagnosen. De diagnosen spelen een rol binnen meerdere informatieproducten. Een aantal van deze informatieproducten wordt gebruikt om te benchmarken (het vergelijken van eigen ziekenhuisgegevens t.o.v. andere ziekenhuizen). Hierbij is het van zeer groot belang om uniform om te gaan met het coderen van de (neven)diagnosen en het vastleggen van overige items (zoals opname urgentie) waarmee de LBZ gevuld wordt.

Steeds meer informatieproducten zijn er op gericht een indicatie van kwaliteit van de zorg weer te geven. Een voorbeeld hiervan is de berekening van de onverwacht lange opname duur (OLO). Een ander voorbeeld is de HSMR-rapportage. Deze rapportage levert alleen betrouwbare

informatie op als alle instellingen dezelfde uitgangspunten hanteren bij de registratie van de gegevens.

Voor een goede en betrouwbare berekening van de HSMR is het belangrijk om naast het coderen van de juiste hoofddiagnose, ook volledig te zijn bij het coderen van relevante nevendiaagnosen. Dit betekent niet per definitie dat er zoveel mogelijk nevendiaagnosen gecodeerd moeten worden.

NB: Bij de berekening van de HSMR-cijfers wordt o.a. gebruik gemaakt van de Charlson index. Deze index bevat 17 comorbiditeitsgroepen die een voorspellende waarde hebben bij de berekening van de sterftkans. Het betreft veelal chronische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling van de patiënt. Ook bij aandoeningen die in de Charlson index zijn opgenomen moet beoordeeld worden of ze relevant zijn om gecodeerd te worden bij de betreffende (dag)opname binnen de LBZ. Het is dus niet zo dat alle aandoeningen op deze index standaard als nevendiagnose gecodeerd dienen te worden.

### **Uitwerking van het advies ter verduidelijking**

#### *A. Voorgaande aandoeningen (anamnese)*

Codeer geen aandoeningen of factoren uit het verleden die niet langer actueel zijn en die de thans verleende zorg niet beïnvloeden. Anamnescodes kunnen wél worden gecodeerd als de persoonlijke en/of familie anamnese impact heeft op de huidige zorgbehoefte en/of behandeling.

#### *B. Chronische aandoeningen*

Vaak hebben chronische aandoeningen gedurende het hele leven invloed op de gezondheidstoestand van de patiënt. Deze aandoeningen vereisen vrijwel altijd extra aandacht en zorg en moeten in dat geval gecodeerd worden. Als de chronische aandoening daarentegen tijdens de huidige opname geen reden voor extra zorg is (in de vorm van behandeling, controles en/of onderzoek), wordt de chronische aandoening niet gecodeerd.

Bij twijfel of de chronische aandoening reden is voor extra zorg, codeer de chronische aandoening dan wél als nevendiagnose.

#### *C. Aandoeningen/symptomen die deel uit maken van een ziekteproces*

Deze worden niet gecodeerd als nevendiagnose, tenzij de aandoeningen/symptomen op zich zelf extra zorg behoeven of dit is bepaald door andere aanwijzingen in de classificatie (dagger/asterisk).

#### *D. Afwijkende bevindingen/resultaten*

De codes voor afwijkende bevindingen (R70-R97) hebben betrekking op al dan niet specifieke resultaten van labonderzoek, diagnostische beeldvorming, functieonderzoek en andere diagnostische onderzoeken.

Deze codes mogen alleen gebruikt worden indien:

- Deze afwijkende bevinding heeft geleid tot verder onderzoek, en
- er geen aan het afwijkend resultaat gerelateerde diagnose gesteld is

## 0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-01-2015  
vervangt: CvZ aca 23.5

### Waarschijnlijkheidsdiagnosen

Niet in alle gevallen zal bij ontslag een diagnose gesteld kunnen worden en wordt de diagnose aangegeven als waarschijnlijkheidsdiagnose. Hoe te handelen in zulke situaties?

### Advies

Codeer een waarschijnlijkheidsdiagnose alsof deze zeker is.

### Toelichting

Wanneer een patiënt in een ziekenhuis wordt opgenomen is daar altijd een reden voor. Meestal is dat een patroon van klachten en/of symptomen en/of bevindingen die een bepaalde diagnose doen vermoeden. Vaak is de diagnose al vóór de opname duidelijk. In andere gevallen wordt de diagnose tijdens de opname gesteld of bijgesteld. Tenslotte kan het ook gebeuren dat de diagnose pas na ontslag of overlijden van de patiënt wordt gesteld of bijgesteld, of zelfs helemaal niet.

Het belang van een diagnose is dat deze dient als basis voor een behandelplan. Zolang de diagnose nog niet definitief is zal dat behandelplan zijn gebaseerd op een waarschijnlijkheidsdiagnose, vaak als onderdeel van een differentiaaldiagnose. De differentiaaldiagnose bevat een opsomming van mogelijke diagnoses, waarvan er vaak één het meest waarschijnlijk wordt geacht: de waarschijnlijkheidsdiagnose. Het begrip "diagnose" blijkt dus gedurende een zorgepisode een wisselende inhoud te kunnen hebben met een steeds grotere mate van zekerheid en precisie. Het moment van de diagnosestelling is daarbij van groot belang.

Om (dag)opnames waarbij geen zekere diagnose is gesteld toch eenduidig te kunnen registreren wordt zoals gebruikelijk, de LBZ definitie van hoofddiagnose gehanteerd:

*De diagnose die achteraf (dus bij ontslag) wordt beschouwd als belangrijkste reden voor de opname in het ziekenhuis.*

Er wordt hier dus altijd de voorkeur gegeven aan de meest specifieke diagnose, zoals die bekend is bij ontslag én die de reden vormt voor de opname. Impliciet wordt daarbij uitgegaan van de meest gebruikelijke situatie, namelijk dat de diagnose bij ontslag duidelijk is. In die gevallen, waarbij de diagnose nog niet definitief is, wordt geadviseerd de waarschijnlijkheidsdiagnose te registreren, omdat daarbij zo nauwkeurig mogelijk de reden van opname en de basis van het behandelplan wordt vastgelegd.

Gebruikelijke termen hierbij zijn:

- Waarschijnlijk
- Vermoedelijk
- Mogelijk
- Passend bij

N.B. Bij (kortdurende) opnames voor diagnostisch onderzoek, zoals bij verdenking op een bepaalde aandoening, zal de diagnose vaak nog minder zeker zijn. In dat geval geldt het advies (in afnemende volgorde van voorkeur):

- codeer de gediagnostiseerde aandoening<sup>1</sup>
- indien deze niet bekend is de symptomen
- indien ook deze niet bekend zijn Z01 of Z03

Een verdenking op een aandoening geldt dus over het algemeen niet als waarschijnlijkheidsdiagnose. Meestal is het een reden voor onderzoek en niet voor een specifieke behandeling. Wordt patiënt echter opgenomen om behandeld te worden voor de aandoening waarop verdenking is, dan wordt de betreffende aandoening gecodeerd.

### Voorbeelden

Koorts mogelijk bij urineweginfectie, start antibiotica  
Codeer urineweginfectie

Opname voor cystoscopie vanwege hematurie bij verdenking op blaastumor  
Codeer afhankelijk van de situatie:

- de gediagnosticeerde blaastumor
- hematurie als er geen blaastumor is vastgesteld

Afwijkende EEG met verdenking op epilepsie waarvoor medicatie geïndiceerd is:  
Codeer epilepsie

Koliekpijn waarschijnlijk o.b.v. niersteen  
Codeer niersteen

## 0-4 Aanvullend coderen

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Aanvullend coderen

Codeer alleen aanvullend indien de omschrijving van de code niet het gehele ziektebeeld beschrijft, en de omschrijving van de aanvullende code betekenisvol is.

### Voorbeelden

- Galwegobstructie door choledochussteen waarvoor stent in de galweg wordt geplaatst.  
K80.5 'steen van galweg zonder cholangitis of cholecystitis' + K83.1 'obstructie van galweg'
- Postoperatieve afwezigheid milt  
D73.0 'hyposplenie' + Z90.8 'verworven afwezigheid van overige organen'
- Cerebrale bloeding in/uit een hersenmetastase  
C79.3 'secundair maligne neoplasma van hersenen en hersenvliezen' + I61.9 'intracerebrale bloeding, niet-gespecificeerd'
- Bloeding van de lever in/uit een levermetastase  
C78.7 'secundair maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen' + R58 'bloeding, niet elders geassocieerd' (via de alfabetische index kom je voor bloeding van de lever uit op code K76.8 'overige gespecificeerde leverziekten', omdat de omschrijving van deze code niet de bloeding weergeeft is gekozen voor R58)

<sup>1</sup> Nagekomen uitslagen van het betreffende diagnostisch onderzoek moeten meegenomen worden bij het bepalen van de diagnose van de (dag)opname. Bv een PA-uitslag die bij ontslag nog niet bekend is. Deze telt mee bij het coderen van de uiteindelijke diagnose.

Zie voor meer voorbeelden over (betekenisvol) aanvullend coderen de voorbeelden in o.a. de codeadviezen 0-12 'Aandoeningen en complicaties ten gevolge van chirurgische en medische behandeling', 11-13 'Bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening' en 16-4 'Perinatale en neonatale aandoeningen'

## 0-5 Multipele aandoeningen

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-04-2018

### **Multipele aandoeningen**

Wanneer er bij een opname geen aandoening ernstiger is of zwaarder weegt dan een andere, kan gebruik worden gemaakt van de 'multipele' codes als hoofddiagnose of primaire diagnose. Alle bijbehorende specifieke codes dienen daaronder aanvullend gecodeerd te worden (zie 4.5.1 deel 2).

Bijvoorbeeld:

Multipele maligne tumoren in verschillende organen (verschillende 3-tekencategorieën): C97  
Multipele letsels (fracturen S02.7, brandwonden)  
Multipele complicaties bij diabetes (gebruik als vierde teken .7)  
Multipele aandoeningen bij HIV  
Combinaties van aandoeningen geclassificeerd onder 099.0-099.7: 099.8

### **Let op:**

Voor het coderen van verworven afwijkingen van meerdere hartkleppen geldt codeadvies 9-15 'Multipele klepaandoeningen'.

## 0-6 Multiorgaanfalen (MOF)

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-07-2016

### **Vraag**

Hoe wordt multiorgaanfalen (MOF) gecodeerd?

### **Advies**

Codeer de betrokken organen. Wanneer deze niet staan vermeld in de ontslagdocumentatie, dan navragen bij de specialist.

### **Toelichting**

Om multiorgaanfalen te kunnen coderen moet per geval worden nagegaan welke organen in hun functie gestoord zijn geraakt. In de alfabetische lijst van de ICD-10 wordt de suggestie R68.8 'Overige gespecificeerde algemene symptomen' gegeven via het zoekpad falen,- orgaan, - - multiple. Het wordt ten zeerste afgeraden deze codering te gebruiken; probeer altijd meer informatie te achterhalen over dit ernstige ziektebeeld.

## 0-7 Koemelkallergie

---

ingangsdatum: 15-01-2014 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-08-2015  
vervangt: CvZ aca 18.3

### Vraag

Hoe wordt koemelkallergie gecodeerd?

### Advies

- Codeer de belangrijkste manifestatie van de koemelkallergie + X49.-4 'Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen'.
- Codeer koemelkallergie NNO met T78.1 'Overige ongewenste reacties op voedsel, niet elders geclassificeerd' + X49.-4

### Toelichting

Voor de persoon die allergisch is voor koemelk is deze stof schadelijk. Codeer daarom aanvullend de blootstelling aan de koemelk met een code uit X49 'Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen'.

### Voorbeelden

- Gastro-enteritis door koemelk: K52.2 'Allergische en door voeding veroorzaakte gastro-enteritis en colitis' + X49.-4
- Eczeem door koemelk: L27.2 'Eczeem door ingenomen voedsel' + X49.-4
- Urticaria door koemelk: L50.0 'Allergische urticaria' + X49.-4
- Bronchusspasme door koemelk: J70.8 'Respiratoire aandoeningen door overige gespecificeerde uitwendige agentia' + X49.-4

## 0-8 Acute exacerbaties bij chronische aandoeningen

---

ingangsdatum: 15-01-2014  
vervangt: CvZ aca 19.4

### Vraag

Welke codes moeten worden geregistreerd als er sprake is van een acute exacerbatie van een chronische aandoening. Welke code gebruik je als hoofddiagnose?

### Advies

Indien de systematische index hierover geen uitsluitel geeft, volg dan de regels uit paragraaf 4.5.2 in deel 2 van de ICD-10 (zie 'Het coderen van acute en chronische aandoeningen'):

“Waar de hoofdaandoening is vastgelegd als zowel acuut (of subacuut) als chronisch en de ICD voorziet in afzonderlijke categorieën of subcategorieën voor beide, maar niet voor de combinatie daarvan, dan moet de categorie voor de acute aandoening bij voorkeur voor de hoofdaandoening worden gebruikt.

Voorbeeld 20: Hoofddiagnose: Acute en chronische cholecystitis  
Nevendiagnosen: -

Codeer acute cholecystitis (K81.0) als hoofdaandoening. De code voor chronische cholecystitis (K81.1) kan gebruikt worden als facultatieve aanvullende code.

Voorbeeld 21: Hoofddiagnose: Acute exacerbatie van chronische obstructieve bronchitis  
Nevendiagnosen: -

Codeer chronische obstructieve longaandoening met acute exacerbatie (J44.1-) als hoofdaandoening aangezien de ICD-10 voorziet in een passende code voor de combinatie.

## 0-9 DES dochter/kleinkind

---

ingangsdatum: 15-01-2014  
vervangt: CvZ aca 23.1

### Vraag

Hoe codeer je:

1. Een screening op een aandoening bij een DES- dochter?
2. De diagnose 'Aandoening toegeschreven aan DES-gebruik'?
3. De diagnose 'Aandoening mogelijk t.g.v. DES-gebruik (bijvoorbeeld hypospadie) van kleinkind van DES-gebruikster'?

### Advies

1. Codeer voor 'screening op aandoening bij DES-dochter' Z13.8 + Z91.8 (Specifiek screeningsonderzoek op overige gespecificeerde ziekten en aandoeningen + Persoonlijke anamnese met overige gespecificeerde risicofactoren, niet elders geclassificeerd).
2. Codeer voor 'Aandoening toegeschreven aan DES-gebruik' de code voor de aandoening + Y42.5 + Z84.2 (Overige oestrogenen en progestagenen leidend tot ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik + Familie-anamnese met overige ziekten van urogenitaal stelsel).
3. Codeer voor 'Aandoening mogelijk t.g.v. DES-gebruik (bijvoorbeeld hypospadie) van kleinkind van DES-gebruikster' de code voor de aandoening + Z84.2.  
Informatie: Hypospadie komt vaker voor bij kleinkinderen van DES-gebruiksters.

## 0-10 Dubbelzijdige aandoeningen

---

ingangsdatum: 01-09-2014  
mutatiedatum: 01-01-2017 & 01-04-2018

### Vraag

Mogen dubbelzijdige aandoeningen (bijv. dubbelzijdig dezelfde beenbreuk of dubbelzijdig hetzelfde mammacarcinoom) 2x met dezelfde code worden vastgelegd?

### Advies

Dubbelzijdige aandoeningen worden alleen vastgelegd bij codes waarbij de z.g.n. 'multipelen' categorieën worden gebruikt. Een dubbelzijdig dezelfde beenbreuk mag 2x gecodeerd worden. Als er niet één van de 2 fracturen overheerst, gebruik dan de code voor multipelen fracturen als hoofddiagnose/primaire diagnose en codeer de fracturen daaronder x2.

Bij aandoeningen waar de z.g.n. 'multipelen' categorieën niet worden gebruikt, registreer je de dubbelzijdigheid met één code.

Voorbeeld:

Dubbelzijdige gesloten femurschachtfractuur waarbij niet één enkele fractuur overheerst:  
Codeer als hoofdaandoening T02.5- 'Fracturen van meerdere regio's van beide onderste extremiteiten'.

Codeer aanvullend 2 x S72.3- 'Femurschachtfractuur'

Dit advies geldt voor alle categorieën waarbij met de z.g.n. 'multiple' codes gebruikt kunnen worden. Voor dubbelzijdige carcinomen, zie advies 2-10. Categorieën waar geen codes voor meerdere regio's/lokalisaties voorkomen, worden niet meervoudig gebruikt.

Voorbeelden van meerdere categorieën:

Letsels van meerdere lichaamsregio's (T00-T07)

Brandwonden en etsingen van meerdere lichaamsregio's (T29)

Maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) meerdere lokalisaties (C97): zie advies 2-10

Zie ook paragraaf 4.5.2 onder het kopje 'Het coderen van meerdere aandoeningen' en paragraaf 4.5.4 voor het coderen van meerdere aandoeningen en letsels in deel 2 van de ICD-10.

Voorbeelden van meerdere of dubbelzijdige aandoeningen waar geen z.g.n. 'meerdere' codes gebruikt worden:

Dubbelzijdig cataract (codeer 1 x H26.9)

Dubbelzijdige en/of meerdere nierstenen (codeer 1 x N20.0)

Meerdere en/of dubbelzijdige neuspoliepen (codeer 1 x J33.8)

## 0-11 Opname voor diagnostisch onderzoek (zonder behandeling)

---

ingangsdatum: 01-01-2015

vervangt: CvZ aca 14.10

### Vraag

Hoe wordt een opname in het kader van een diagnostisch onderzoek gecodeerd?

### Advies

Opname voor diagnostisch onderzoek (in afnemende volgorde van voorkeur):

- codeer de gediagnosticeerde aandoening
- indien deze niet bekend is codeer de symptomen
- indien ook deze niet bekend codeer Z00-Z13

### Toelichting

Bij een opname moet de diagnose zo specifiek mogelijk gecodeerd worden. Ook wanneer de opname in het kader van diagnostiek staat. Codeer hetzij de aandoening die vastgesteld wordt bij diagnostisch onderzoek of de (voornaamste) symptomen die aanleiding zijn tot het onderzoek.

Een code voor speciale onderzoeken (Z00-Z13) dient alleen gebruikt te worden als geen verdere informatie beschikbaar is.

Voorbeelden

Lactose intolerantie test wegens chronische diarree.

Codeer afhankelijk van de situatie

- Lactose intolerantie aangetoond: codeer lactose intolerantie
- Lactose intolerantie niet aangetoond: codeer diarree

Positieve uitslag allergietest pinda's zonder ziekteverschijnselen op dat moment

- Bij een allergische reactie door de provocatietest zonder aanwezige ziekteverschijnselen op dat moment, codeer je Z01.5 'Diagnostische huid- en overgevoeligheidstests'

## 0-12 Aandoeningen en complicaties ten gevolge van chirurgische en medische behandeling

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder

vervangt: CvZ aca 19.10

mutatiedatum: 01-10-2015 & 01-04-2016 & 01-07-2016 & 01-01-2021

### Vraag

Hoe kom je tot de juiste codering van aandoeningen en complicaties die ontstaan ten gevolge van chirurgische en medische behandeling?

Let op:

- bij een complicatie ten gevolge van een medische behandeling is er sprake van een oorzaak-/ gevolg relatie, zie ook punt 1.1: 'Wat is een aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling?'
- gangbaar is o.a. de term 'postoperatieve complicatie'. Voor de leesbaarheid hanteren we in dit advies de terminologie 'aandoeningen en complicaties die zijn ontstaan ten gevolge van een medische behandeling'

### Codeadvies

Indien een aandoening of complicatie is ontstaan ten gevolge van een medische behandeling, dan is de alfabetische lijst leidend voor het zoeken naar een juiste code.

Als een aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling niet in de alfabetische lijst is opgenomen (ook niet als synoniem) codeer dan:

- A Vroege complicaties van medische verrichtingen en mechanische complicaties: T80-T88 'Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geassocieerd'
- B Late<sup>2</sup> en functionele complicaties<sup>3</sup>: Binnen het betreffende hoofdstuk naar orgaansysteem, voornamelijk in het blok 'Aandoeningen van.....na medische verrichting niet elders geassocieerd'.

### Toelichting

Met dit codeadvies wordt een leidraad gegeven hoe tot de juiste code voor een aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling te komen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

1. Wat is een aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling
2. Hoe te handelen bij het coderen van een aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling

<sup>2</sup> Late complicaties zijn aandoeningen gespecificeerd als resttoestand of aandoeningen die 1 jaar of langer na de medische verrichting nog aanwezig zijn

<sup>3</sup> Een functionele complicatie is een complicatie waarbij het orgaan of lichaamsdeel niet (meer) optimaal functioneert, zonder dat het op een organische afwijking berust.

3. Aanvullend coderen, inclusief het gebruik van de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname, in de LBZ

Dit codeadvies sluit af met een groot aantal voorbeelden ter illustratie.

NB Zie codeadvies 20-6 voor complicaties na het plaatsen van orthopedische prothesen en 0-13 voor aandoeningen en complicaties door geneesmiddelen.

## **1 Wat is een aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling?**

1.1 Wanneer mag je een aandoening of complicatie die na een medische behandeling optreedt opvatten als een complicatie ten gevolge van de medische behandeling?

Vragen die men zich daarbij moet stellen zijn:

- ✓ Wat is een aandoening of complicatie na een medische behandeling?
- ✓ Is iedere complicatie die ontstaat na een medische behandeling ook een complicatie ten gevolge van het medisch handelen?
- ✓ Wanneer wordt een aandoening of complicatie gecodeerd als een complicatie ten gevolge van medisch handelen'?

Een aandoening of complicatie die na een medische behandeling is ontstaan, wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat het is ontstaan in de periode na de medische behandeling, waarbij in het midden wordt gelaten of er een relatie bestaat tussen de medische behandeling en de complicatie. Het kan dus zowel een naadlekkage zijn als een hartinfarct of zelfs een gebroken heup na een val onder de douche in het ziekenhuis. De term 'complicatie ten gevolge van medisch handelen' veronderstelt wél een relatie tussen de medische behandeling en de complicatie.

Een aandoening die zich bijvoorbeeld postoperatief manifesteert is dus niet per definitie een 'complicatie ten gevolge van medisch handelen'.

Bijvoorbeeld: een trombosebeen 3 weken na operatie kan ook worden veroorzaakt door de immobilisatie (bedrust) na de operatie, en is daarmee geen complicatie van medisch handelen.

1.2 Wat betekent dat voor de registratie?

Het probleem is dat vrijwel geen enkele specialist precies hetzelfde omgaat met de term 'complicatie'.

Voor de registratie zijn er twee mogelijkheden:

- I. De aandoening of complicatie is zonder twijfel een gevolg van de medische behandeling. In dit geval wordt gecodeerd volgens onderstaande instructie 'Hoe te handelen bij het coderen van een aandoening of complicatie ten gevolge van medisch handelen' Bijvoorbeeld wondinfectie; zonder operatie was er geen wondinfectie ontstaan.
- II. Als zich na een operatie een aandoening manifesteert die misschien een 'complicatie ten gevolge van medisch handelen' betreft, zonder dat de specialist de relatie aangeeft, is het advies hierover uitsluitend bij de specialist te vragen. Als navraag niet mogelijk is, wordt de betreffende aandoening niet als 'complicatie ten gevolge van medisch handelen' aangemerkt, maar op de gebruikelijke manier geregistreerd als aandoening die tijdens het verblijf in het ziekenhuis is ontstaan.

## **2 Hoe te handelen bij het coderen van een aandoening of complicatie ten gevolge van medisch handelen**

2.1 Aandoeningen en complicaties ten gevolge van chirurgische en andere medische behandelingen zijn op verschillende plaatsen binnen de ICD-10 opgenomen.

In de systematische lijst zijn hiervoor vier plaatsen te onderscheiden:

- I. T80-T88 'Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd'.

### *Bijvoorbeeld*

- Infectie na medische verrichting, niet elders geclassificeerd T81.4
  - Mechanische complicaties van implantaten o.a. T82.0
  - Shock tijdens of als gevolg van medische verrichting, niet elders geclassificeerd T81.1
  - Vasculaire complicaties na medische verrichting, niet elders geclassificeerd T81.7
  - Afstoting van beenmergtransplantaat T86.0
- II. Specifiek blok voor 'Aandoeningen na medische verrichting, niet elders geclassificeerd' aan het einde van de hoofdstukken die betrekking hebben op een orgaansysteem (behalve bij het hoofdstuk van de ziekten van huid en subcutis). Dit betreft veelal late en functionele complicaties.

### *Bijvoorbeeld*

- Lymfoedeem na mastectomie I97.2
  - Kyfose na bestraling M96.2
- III. Codes elders opgenomen binnen een orgaanhoofdstuk met omschrijving van de complicatie in de code.

### *Bijvoorbeeld*

- Bestralingscystitis N30.4
  - Complicatie van inbrengen van embryo bij embryotransfer N98.3
- IV. Codes elders opgenomen in een orgaanhoofdstuk waarbij in de alfabetische lijst de term 'postoperatief' als inclusie bij een code is opgenomen, zonder omschrijving van de complicatie in de code zelf.

### *Bijvoorbeeld bij de zoektermen*

- Oesofagitis (postoperatief) K20
- Osteomalacie bij volwassenen door malabsorptie (postoperatief) M83.2
- Strictuur van ureter (postoperatief) N13.5

## 2.2 Selectie van de juiste code voor de aandoening/complicatie

2.2.1 De alfabetische lijst is leidend voor het zoeken naar een juiste code. Zoek dus of daar een suggestie voor een code wordt gegeven. Dit kan via een hoofdingang voor een beschreven complicatie/aandoening of via een nevenzoekterm (ingesprongen term) bij een specifieke aandoening.

Voorbeelden van hoofdingangen zijn:

- Complicaties (door) (van)
- Mislukken, mislukt

### *Bijvoorbeeld*

Complicatie

- fixatiemateriaal

- - infectie of ontsteking

Complicatie

- stoma

- - blaas

Voorbeelden van nevenzoektermen (ingesprongen term) in de alfabetische lijst zijn:

- na medische verrichting
- na operatie
- postoperatief
- door hulpmiddel, implantaat of transplantaat
- als gevolg van medische verrichting
- mislukken
- mislukt

### *Bijvoorbeeld*

Embolie

- postoperatief

Emfyseem

- subcutaan

- - na medische verrichting

2.2.2 Als een complicatie van een verrichting niet in de alfabetische lijst is opgenomen (ook niet als synoniem) codeer dan:

**A** Vroege complicaties en mechanische complicaties:

T80-T88 'Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geassocieerd' (volg de inclusie- en exclusietermen)

#### *Bijvoorbeeld*

Luchtlekkage na pneumectomie T81.8 'Overige gespecificeerde complicaties medische verrichtingen niet elders geassocieerd' + Y83.6 'Verwijdering van overig orgaan'

**B** Late en functionele complicaties:

Binnen het betreffende hoofdstuk naar orgaansysteem, voornamelijk in het blok 'Aandoeningen van....na medische verrichting niet elders geassocieerd'.

#### *Bijvoorbeeld*

Postoperatief atriumfibrilleren na CABG I97.1 'Overige functionele stoornissen na hartchirurgie' + Y83.2 'Operatie met anastomose, bypass of transplantaat' + I48.9 'Atriumfibrilleren en -flutter, niet gespecificeerd'

NB Symptomen die geen invloed hebben op het zorgproces (bijvoorbeeld door verlenging van de opnameduur) of op de gezondheidstoestand van de patiënt, worden niet als complicatie gecodeerd (zie punt C bij de uitwerking van codeadvies 0-2).

#### *Bijvoorbeeld*

Postoperatieve misselijkheid, zonder invloed op behandeling → niet coderen.

### **3 Aanvullend coderen, inclusief het gebruik van de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname**

Een complicatiecode uit hoofdstuk XIX wordt altijd aanvullend gecodeerd met een code uit hoofdstuk XX (Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte) om de aard van de medische behandeling aan te geven.

Een code uit hoofdstuk XX kan ook aanvullend aan een aandoening uit de overige hoofdstukken gecodeerd worden. Dit is alleen relevant als de omschrijving van de code niet de uitgevoerde medische verrichting beschrijft.

#### *Bijvoorbeeld*

- T82.6 'Infectie en ontstekingsreactie als gevolg van hartklepprothese' aanvullend coderen met Y83.1 'Operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel'
- N30.4 'Bestralingscystitis' zonder vermelding van afwijkende gang van zaken, geen aanvullende Y-code voor de uitgevoerde verrichting. Dit staat immers al in de omschrijving van de code
- N99.0 'Nierinsufficiëntie na medische verrichting' aanvullende Y-code om de uitgevoerde medische verrichting aan te geven

Wanneer de specificiteit van een aandoening of complicatie van chirurgische en medische behandeling niet tot zijn recht komt in de omschrijving van de code, is het advies om nader te specificeren met een aanvullende code uit hoofdstuk I t/m XIX.

#### *Bijvoorbeeld*

- Stafylokokkensepsis t.g.v. infuus T80.2 'Infecties na infusie, transfusie en therapeutische injectie' + Y84.8 'Overige gespecificeerde medische verrichtingen' + A41.2 'Sepsis door niet gespecificeerde stafylokokken'

- Laceratie maagwand door gastroscopie T81.2 'Onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting' + S36.30 'Letsel van maag' + Y60.4 'Onopzettelijke snee, punctie, perforatie of bloeding tijdens endoscopisch onderzoek'

**Let op:** Indien een aandoening of complicatie is ontstaan in de huidige opname, is het verplicht om de diagnosecode en de hoofdstuk XX code aan te duiden met 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname<sup>4</sup>.

*Bijvoorbeeld*

Bloeding na uterusextirpatie tijdens de opname waarbinnen de operatie heeft plaatsgevonden NAS T81.0 'Bloeding en hematoom als complicatie van medische verrichting NEC' + NAS Y83.6 'Verwijdering van overig orgaan'

**Voorbeelden**

- 1 Hematoom van obstetrische wond ten gevolge van sectio in huidige opname.

Code NAS O90.2 'Hematoom van obstetrische wond' + NAS Y83.8 'Overige gespecificeerde heelkundige verrichtingen'

Zoekpad:

Hematoom

- obstetrische operatiewond O90.2

- 2 Bestralingscystitis ten gevolge van bestraling in eerdere opname, zonder afwijkende gang van zaken.

Code N30.4 'Bestralingscystitis'

Zoekpad:

Cystitis

- door

- - bestraling N30.4

- 3 Pneumonie ten gevolge van CABG in huidige opname.

Code NAS J95.8 'Overige gespecificeerde respiratoire aandoeningen na medische verrichting' + NAS Y83.2 'operatie met anastomose, bypass of implantaat' + aanvullend NAS J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd'

Zoekpad:

Pneumonie

- als gevolg van medisch handelen J95.8

Of

Pneumonitis (*zie ook* Pneumonie)

- postoperatief J95.8

- 4 Pneumonie na onderbeen amputatie in huidige opname.

Code NAS J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd' (pneumonie is wel ontstaan tijdens de opnameperiode maar er is geen relatie gelegd met de operatie)

Zoekpad:

Pneumonie J18.9/8

- 5 Urineretentie na heupvervangende in huidige opname.

Code NAS R33 'Retentie van urine' (urineretentie is wel ontstaan tijdens de opnameperiode maar er is geen relatie gelegd met de operatie)

Zoekpad:

<sup>4</sup> NAS

Een aandoening die tijdens het verblijf in het ziekenhuis is ontstaan, ongeacht de oorzaak, wordt binnen de LBZ aangeduid als 'Niet Aanwezig bij Start opname' (NAS) (*zie ook* advies 0-19).

Retentie  
- urine R33

6 Laceratie sacrale zenuw tijdens herniotomie.

Code NAS T81.2 'Onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting, NEC' + NAS S34.2 'Letsel van zenuwwortel van lumbale en sacrale wervelkolom' + NAS Y60.0 'Tijdens heelkundige ingreep'

Zoekpad:

Complicatie

- heelkundige ingreep

- - onopzettelijke punctie of laceratie T81.2

En

Letsel

- zenuw

- - spinaal

- - - wortel

- - - - sacraal S34.2

7 Pneumothorax ten gevolge van onbedoelde perforatie tijdens het aanbrengen van een centrale lijn in huidige opname.

Code NAS T81.2 'Onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting, NEC' + NAS S27.00 'Traumatische pneumothorax' + NAS Y60.8 'Tijdens overige gespecificeerde genees- en heelkundige behandeling'

Zoekpad:

Pneumothorax

- door operatief letsel van borstwand of long J95.8

- - onopzettelijke punctie of laceratie T81.2

En

Pneumothorax

- traumatisch S27.0

8 Opname voor urethrastrictuur ten gevolge van TURP in eerdere opname.

Code N99.1 'Urethrastrictuur na medische verrichting' + Y83.6 'Verwijdering van overig orgaan'

Zoekpad:

Strictuur

- urethra

- - na medische verrichting of postoperatief N99.1

9 Koorts postoperatief tijdens opname van de operatie.

- Koorts postoperatief zonder dat de relatie tot de ingreep is vermeld
  - Indien bekend codeer de oorzaak van de koorts (aangeduid met 'NAS' voor aandoening niet aanwezig bij start opname)
  - Indien geen oorzaak bekend, codeer NAS R50.9
- Koorts postoperatief met relatie tot de ingreep  
Code NAS T81.4 'Infectie na medische verrichting, niet elders geclassificeerd' + NAS Y-code + NAS R50.9 'Koorts, niet gespecificeerd'  
Zoekpad:  
koorts  
- postoperatief (door infectie) T81.4

Opmerking:

T81.4 lijkt een zware code hiervoor maar de classificatie dient te worden gevolgd. Alleen als je weet dat de postoperatieve koorts een andere oorzaak heeft dan de operatie, of de relatie onduidelijk is, codeer je de oorzaak van de koorts of koorts NNO (R50.9)

10 Delier postoperatief na operatie in huidige opname.

Code NAS F05.9 'delirium, niet-gespecificeerd' (delier is wel ontstaan tijdens de opnameperiode maar er is geen relatie gelegd met de operatie).

Zoekpad:

Delier

- - onbekende oorzaak F05.9

11 Naadlekkage ten gevolge van ileocoecalresectie in eerdere opname.

K91.8 'Overige gespecificeerde aandoeningen van spijsverteringsstelsel na medische verrichting, NEC' + Y83.2 'Operatie met anastomose, bypass of transplantaat'

Zoekpad:

Complicaties (door) (van)

- anastomose (en bypass) NEC T85.9

- - intestinaal (inwendig) NEC K91.8

12 Girdlestonesituatie heup (instabiliteit gewricht secundair aan verwijderen gewrichtsprothese), heup verwijderd in eerdere opname.

M96.8 'Overige gespecificeerde aandoeningen van botspierstelsel na medische verrichting' +

Y88.3 'Late gevolgen van geneeskundige- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting'

Zoekpad:

Instabiliteit

- gewricht (posttraumatisch)

- - secundair aan verwijderen van gewrichtsprothese M96.8

13 Aneurysma spurium / vals aneurysma arteria radialis t.g.v. een hartkatheterisatie in eerdere opname.

T81.7 'Vasculaire complicaties na medische verrichting, NEC' + Y84.0 'Hartkatheterisatie' + I72.1 'Aneurysma van arterie van bovenste extremiteit'

Zoekpad:

Bijvoorbeeld

Complicaties (door) (van)

- heelkundige ingreep

- - vasculair (perifeer) NEC T81.7

14 Delayed graft na een niertransplantatie in eerdere opname.

T83.8 'Overige gespecificeerde complicaties van urogenitale prothesen, implantaten en transplantaten' + Y83.0 'Operatie met transplantatie van volledig orgaan'

Zoekpad:

Complicaties (door) (van)

- transplantaat (bypass)(patch)(*zie ook* Mislukken, transplantatie) T85.9/8

- - urine-orgaan T83.9/.8

15 Fausse route urethra door letsel bij katheterisatie in huidige opname.

C T81.2 'Onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting, NEC' + NAS S37.30 'Letsel van urethra' + NAS Y60.6 'Tijdens aspiratie, punctie en overige katheterisatie'

Zoekpad:

Bijvoorbeeld

Laceratie

- onopzettelijk, complicatie van heelkundige ingreep T81.2

16 Fausse route urethra door verplaatsing (=mechanische complicatie) van katheter (bijvoorbeeld thuis, waarna heropname).

T83.0 'Mechanische complicatie van urine(verblijfs)katheter' + S37.30 'Letsel van urethra' + Y73.2 'Gastro-enterologische en urologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen'

Zoekpad:

Complicaties (door) (van)

- katheter

- - urine (verblijfskatheter) (suprapubisch) T83.9/8

- - - mechanisch T83.0

NB Met de term 'Fausse route van urethra' bij code N36.0 wordt geen letsel bedoeld dat is ontstaan is door een medische verrichting. Daarom wordt deze code niet gebruikt bij letsel van de urethra ontstaan door een katheter.

17 Radiatie oesofagitis twee maanden na laatste bestraling.

K20 'oesofagitis' + Y84.2 'radiologische verrichting en radiotherapie'

Zoekpad:

Complicatie (door) (van)

- radiotherapie NEC T66

Bij T66 'niet-gespecificeerde gevolgen van straling' staat een exclusie voor gespecificeerde ongewenste-gevolgen van straling. Dit geeft aan dat de specifieke aandoening die ontstaan is door de (be)straling gecodeerd moet worden.

Voor aandoeningen die ontstaan zijn na radiotherapie geldt dus:

- Volg de alfabetische index (bv. cystitis, door bestraling N30.4)
- Als de alfabetische index geen code geeft codeer dan de specifieke aandoening + Y84.2 bij ongewenste gevolgen van (be)straling (zie exclusie bij T66)

18 Plexus brachialis letsel door radiotherapie in het verleden.

G54.0 'aandoening van plexus brachialis' + Y84.2

Zie uitleg bij voorbeeld 17.

19 Persistierend duralek/liquorlekkage ten gevolge van hersenoperatie een jaar geleden.

In dit geval is de opening in de dura als onderdeel van de ingreep gemaakt dus is er geen sprake van een onbedoelde perforatie.

G97.8 'overige gespecificeerde aandoeningen van zenuwstelsel na medische verrichting' + Y83.8 + G96.0 'liquorlekkage'.

20 Duraletsel/liquorlekkage onbedoeld ontstaan door HNP operatie in huidige opname.

C T81.2 'Onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting, niet elders geclassificeerd' + NAS S19.8 'Overige gespecificeerde letsels van hals' òf NAS S29.8 'Overige gespecificeerde letsels van thorax' òf NAS S39.8 'Overige gespecificeerde letsels van buik, bekken en onderste deel van rug' (afhankelijk van de lokalisatie van de dura) + NAS Y60.0 'Tijdens heelkundige ingreep' + NAS G96.0 'liquorlekkage'.

21 Pneumothorax ten gevolge van pleuravocht drainage in eerdere opname.

In dit geval is er voor de drainage een bedoelde opening in de pleura gemaakt. Soms kan als gevolg hiervan een pneumothorax als complicatie optreden.

Code J95.8 'overige gespecificeerde respiratoire aandoening na medische verrichting' + Y84.4 'aspiratie van vloeistof' + J93.8 'overige gespecificeerde vormen van pneumothorax'

Zoekpad:

Pneumothorax

- door operatief letsel van borstwand of long J95.8

## 0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 4.3

### Vraag

Wat is de juiste codering voor een aandoening veroorzaakt door het gebruik van een geneesmiddel?

### Advies

1. Bijwerkingen en ongewenste gevolgen/reacties: code uit de reeks A00-R99 of T80-T88.8 + aanvullend Y40-Y59 voor specificatie van het geneesmiddel
2. Vergiftigingen door geneesmiddelen bij verkeerd of onbedoeld gebruik: code uit de reeks T36-T50 + X40-X49 voor specificatie van het geneesmiddel, en eventueel aanvullend belangrijke aandoeningen/symptomen ontstaan door de vergiftiging
3. Ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie: zie codeadvies 1-5
4. Zie codeadvies 3-6 voor anemie door cytostatica

### Toelichting

Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen zijn te onderscheiden in twee typen:

1. Bijwerkingen, ongewenste gevolgen/reacties op geneesmiddelen bij juist gebruik
2. Vergiftigingen door geneesmiddelen door verkeerd of onbedoeld gebruik

1. Bijwerkingen en ongewenste gevolgen/reacties worden afhankelijk van hun aard gecodeerd met een code uit de reeksen A00-R99 en T80-T88.8 + aanvullend Y40-Y59 'Geneesmiddelen en biologische stoffen leidend tot ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik'.

De alfabetische lijst is leidend voor de juiste code. Er is in een aantal gevallen een specifieke code voor een bijwerking of ongewenst gevolg/reactie. Als dat niet het geval is, wordt een algemene code voor de betreffende aandoening gecodeerd. Aanvullend wordt met een Y-code het geneesmiddel aangegeven.

Bijvoorbeeld

- Gastritis door ibuprofen  
K29.6 'Overige gespecificeerde gastritis' + Y45.2 'Propionzuurderivaten'
- Door prednison geïnduceerde diabetes  
E13.9 'Overige gespecificeerde vormen van diabetes mellitus' + Y42.0 'Glucocorticoden en synthetische analogen'
- Eczeem door antibiotica  
L27.0 'Gegeneraliseerde huidruptie door geneesmiddelen' + Y40.9 'Systemische antibioticum, niet gespecificeerd'
- Allergische reactie door clonidine  
T88.7 'Niet gespecificeerd ongewenst gevolg van geneesmiddel' + Y52.5 'Overige antihypertensiva, niet elders geclassificeerd'

2. Vergiftigingen door geneesmiddelen door verkeerd of accidenteel gebruik wordt gecodeerd met T36-T50 'Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen' + X40-X49 'Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan schadelijke stoffen'.

In dit geval is er sprake van niet opzettelijke overdosering, gebruik van een verkeerd geneesmiddel of onbedoeld gebruik van een geneesmiddel.

Bijvoorbeeld

- Slaapmiddelvergiftiging bij peuter door accidenteel innemen van geneesmiddel van oma. Peuter is hierdoor comateus.  
Codeer: T42.7 'Anti-epileptica, sedativa en hypnotica, niet gespecificeerd' + X41.-- 'Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddel en psychotrope geneesmiddelen, NEC' + R40.2 'Coma, niet gespecificeerd'
- Patiënt wordt onwel na inname van dopamine. Er blijkt door de apotheek per ongeluk een te hoge dosering van het geneesmiddel aan de patiënt verstrekt te zijn.  
Codeer: T44.9 'Overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen primair aangrijpend op autonoom zenuwstelsel'+ X43.--'Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige geneesmiddelen met werking op autonoom zenuwstelsel'

NB Let bij alle categorieën goed op de in- en exclusies!

## 0-14 Aanduiding 'NAS' bij O-codes en codes voor perinatale aandoeningen

mutatie

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-07-2018 & 01-01-2022

### Vraag

Bij perinatale aandoeningen en aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed (O-codes) is het vaak lastig om te bepalen of deze als niet aanwezig bij start van de opname (NAS) aangemerkt moet worden (bijvoorbeeld of foetale nood is ontstaan vóór of tijdens de opname). Moet de aanduiding 'NAS'<sup>5</sup> ook worden gebruikt bij deze opnames?

### Advies

Gebruik géén aanduiding 'NAS' voor aandoening niet aanwezig bij start opname, bij perinatale aandoeningen in de opnames aansluitend aan de geboorte (zowel ziekenhuis geboren, thuis geboren en bij overplaatsing naar een ander ziekenhuis). Gebruik wel aanduiding 'NAS' bij opnames niet aansluitend aan de geboorte.

Ook bij opnames voor zwangerschap en bevalling kan de diagnose elementen van complicaties bevatten. Bij opnames voor zwangerschap en bevalling wordt ook géén aanduiding 'NAS' voor aandoeningen niet aanwezig bij start opname, gebruikt. Complicaties verband houdend met het kraambed met codes uit het blok O85-O92 en aandoeningen/complicaties uit het blok O94-O99 die overduidelijk in het kraambed zijn ontstaan, worden wél met 'NAS' aangeduid.

Bij twijfel of de aandoening/complicatie als 'niet aanwezig bij start opname' beschouwd moet worden, wordt deze niet als 'NAS' aangeduid.

Het doorvoeren van de aanduiding 'niet aanwezig bij start opname' bij pasgeborenen en zwangerschap en bevalling zou, wanneer zich aandoeningen manifesteren, kunnen leiden tot een scala aan aanduidingen 'NAS'. Strikt genomen zou er een aanduiding 'NAS' moeten worden gebruikt, maar vanwege bovengenoemde redenen en in het kader van de uniformiteit van de codering is het advies om bij de meeste van deze opnames géén aanduiding 'NAS' te gebruiken (ook niet bij aanvullende coderingen uit andere hoofdstukken ter nadere specificatie van een P- of O-code).

Schema gebruik aanduiding 'NAS':

<sup>5</sup> NAS

Een aandoening die tijdens het verblijf in het ziekenhuis is ontstaan, ongeacht de oorzaak, wordt binnen de LBZ aangeduid als 'Niet Aanwezig bij Start opname' (NAS) (zie ook advies 0-19).

voor opnames bij perinatale aandoeningen aansluitend aan de geboorte	geen aanduiding NAS
voor opnames bij perinatale aandoeningen <b>niet</b> aansluitend aan de geboorte	wél aanduiding NAS
voor opnames bij zwangerschap en bevalling	geen aanduiding NAS
bij blok (O85-O92) 'Complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed' ontstaan tijdens de opname van de bevalling	wél aanduiding NAS
Bij blok O94-O99 waarbij de aandoening overduidelijk in het kraambed is ontstaan	wél aanduiding NAS

## 0-15 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-04-2017  
vervangt: CvZ aca 16.1

### Vraag

Hoe codeer je late gevolgen na een cerebrovasculaire ziekte?

### Advies

De resttoestand of aard van het late gevolg wordt als hoofdaandoening gecodeerd. Aanvullend wordt de oorzaak van het late gevolg gecodeerd met code I69.- 'Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten'.

### Toelichting

Het coderen van late gevolgen vereist in het algemeen twee codes:

1. de resttoestand of aard van het late gevolg
2. de oorzaak van het late gevolg

Code I69.- 'Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten' is te gebruiken om aandoeningen uit de codereeks I60-I67 'Cerebrovasculaire ziekten' aan te geven als oorzaak van late gevolgen die elders worden geclassificeerd.

Als een aantal verschillende late gevolgen aanwezig is en geen enkele daarvan als belangrijkste is aangemerkt, is het toegestaan I69.- als de hoofddiagnose vast te leggen.

De alfabetische lijst geeft via de ingang Accident, - cerebrovasculair, - - oud, code I69.4 'Late gevolgen van beroerte, niet gespecificeerd als bloeding of infarct'. Deze code kan alleen gebruikt worden als er sprake is van restafwijkingen. Gebruik anders code Z86.7 'Persoonlijke anamnese met ziekten van hart vaatstelsel' als aanvullende code om een CVA in de anamnese, zonder actuele restafwijkingen, aan te geven.

NB 'Late gevolgen' omvatten aandoeningen, gespecificeerd als resttoestand of als late gevolgen, of aandoeningen die 1 jaar of langer na het begin van de oorzakelijke ziekte nog aanwezig zijn. Als een aandoening als resttoestand of laat gevolg omschreven is, is er dus geen sprake van een minimum tijdsinterval.

### Voorbeelden

1. Hemiparese na cerebraal infarct  
G81.9 'Hemiplegie, niet gespecificeerd' + I69.3 'Late gevolgen van cerebraal infarct'
2. Slikstoornis na CVA  
R13 'Dysfagie' + I69.4 'late gevolgen van beroerte, niet gespecificeerd als bloeding of infarct'

### 3. Recidief CVA NNO

I64 'Beroerte, niet gespecificeerd als bloeding of infarct' + Z86.7 'Persoonlijke anamnese met ziekten van hartvaatstelsel'

## 0-16 Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ advies nieuwsbrief december 2004

### Vraag

Hoe wordt bepaald of de etiologie (onderliggende ziekte) of de manifestatie (uiting) als hoofddiagnose vastgelegd moet worden?

### Codeadvies

Als de classificatie geen uitsluitel geeft aan de hand van de dagger († etiologie) en asterisk (\* manifestatie) systematiek of andere codeerregels/codeadviezen, codeer dan de aandoening die de reden van opname is, als hoofddiagnose.

Let op:

- voor het coderen van symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit geldt zie codeadvies 2-9
- voor het coderen van de hoofddiagnose bij OHCA geldt codeadvies 9-19
- voor het coderen van de hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie geldt codeadvies 10-6
- voor het coderen van de hoofddiagnose van een bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening geldt codeadvies 11-13

### Toelichting

Voor bepaalde aandoeningen is het belangrijk zowel de ten grondslag liggende ziekte (etiologie) als de manifestatie (uiting) van de ziekte te registreren. Soms is het moeilijk om hierbij te bepalen wat de volgorde van coderen is. Met het oog op het registreren van de juiste hoofddiagnose is het van belang hier zo uniform mogelijk mee om te gaan.

Uitgangspunt is dat de definitie van de hoofddiagnose, zoals deze bij de LBZ gehanteerd wordt, leidend is:

*De diagnose die achteraf (dus bij ontslag) wordt beschouwd als belangrijkste reden voor de opname in het ziekenhuis.*

Binnen de ICD-10 zijn een aantal afspraken en codeerregels die de volgorde van coderen voorschrijven;

Op de eerste plaats is de classificatie leidend voor de juiste codering/keuze van hoofddiagnose.

- In een aantal gevallen zijn etiologie en manifestatie in één code gevat.

*Bijvoorbeeld*

N13.2 'Hydronefrose met obstructie door nier- en uretersteen'

I12.0 'Hypertensieve nierziekte met nierinsufficiëntie'

- Soms schrijft de classificatie de volgorde van registreren voor door middel van een dagger (etiologie) en asterisk (manifestatie) combinatie.

*Bijvoorbeeld*

Polyneuropathie bij diabetes mellitus 2; E11.4† en G63.2\*.

Daarnaast zijn codeerregels bepalend bij de keuze van hoofddiagnose:

- Indien een symptoom of een probleem als de hoofdaandoening is vastgelegd en dit duidelijk een symptoom of probleem van een gediagnosticeerde aandoening betreft waarvoor zorg werd gegeven, dan dient de gediagnosticeerde aandoening als hoofddiagnose te worden geselecteerd.

*Bijvoorbeeld*

Buikpijn bij appendicitis; appendicitis is de hoofddiagnose

- Als de hoofdaandoening is vastgelegd als zowel acuut (of subacut) als chronisch dan moet de code voor de acute aandoening als de hoofddiagnose worden geselecteerd.

*Bijvoorbeeld*

Acute prostatitis bij chronische prostatitis. Acute prostatitis is de hoofddiagnose en aanvullend wordt de chronische prostatitis gecodeerd.

- De ICD-10 voorziet in een aantal categorieën getiteld '*Late gevolgen van*'<sup>6</sup> die gebruikt kunnen worden om aandoeningen die niet meer aanwezig zijn aan te duiden als de oorzaak van een actueel probleem waarvoor behandeling of onderzoek wordt ondergaan. De voorkeurscode voor de hoofdaandoening is de code voor de aard van het late gevolg zelf, waaraan de code voor *Late gevolgen van ....* als (facultatieve) aanvullende code kan worden toegevoegd.

*Bijvoorbeeld*

Hemiplegie door herseninfarct in de anamnese.

Hemiplegie is de hoofddiagnose en het herseninfarct in de anamnese wordt aanvullend gecodeerd met een code uit de reeks 'late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten'.

Als de classificatie of één van bovenstaande codeerregels geen uitsluitel geeft, wordt de te coderen hoofddiagnose geselecteerd op basis van de LBZ-definitie (zie eerder).

De reden van opname zal veelal de te behandelen aandoening zijn. Met andere woorden waar is de behandeling op gericht? Het behandelen van de onderliggende aandoening of de manifestatie?

Is de behandeling gericht op de **onderliggende ziekte** → codeer de onderliggende ziekte als hoofddiagnose

*Voorbeelden*

- Bloedverlies door tubulair adenoom  
Hoofddiagnose is het tubulair adenoom. Door behandeling van het adenoom is het bloedverlies verholpen.
- Opname voor diagnostische ascitesdrainage. Er blijkt sprake van een bacteriële peritonitis  
Hoofddiagnose is de bacteriële peritonitis. De drainage heeft als doel de oorzaak van de ascites te achterhalen en daarom is de gediagnosticeerde ziekte de hoofddiagnose.
- Opname voor TUR-prostaat bij urineretentie bij prostaathypertrofie  
Hoofddiagnose is de prostaathypertrofie. De behandeling is gericht op de prostaathypertrofie.

Is de behandeling gericht op de **manifestatie** → codeer de manifestatie als hoofddiagnose

*Voorbeelden*

- Dagopname voor bloedtransfusie voor ijzergebreksanemie door gastro-intestinaal bloedverlies bij angiodysplasie van het colon  
Hoofddiagnose is de ijzergebreksanemie.

<sup>6</sup> 'late gevolgen' omvatten aandoeningen, gespecificeerd als resttoestanden of als late gevolgen, of aandoeningen die 1 jaar of langer na het begin van de oorzakelijke ziekte nog aanwezig zijn.

- Opname voor ascitesdrainage bij levercirrose  
Hoofddiagnose is de ascites. De drainage heeft als doel de ascites te verminderen maar daarmee wordt niet primair de levercirrose behandeld.
- Opname voor katheterisatie van urineretentie bij prostaathypertrofie  
Hoofddiagnose is de urineretentie. De katheterisatie heeft als doel de retentie te verminderen maar daarmee wordt niet primair de prostaathypertrofie behandeld

Opmerking 1: Een symptoom kan hoofddiagnose zijn als de onderliggende ziekte op zich geen reden tot opname is.

*Bijvoorbeeld*

Koortsstuip bij acute otitis.

Over het algemeen is een otitis geen reden tot opname maar is de koortsstuip waarvoor opname geïndiceerd is.

Opmerking 2: Houd rekening met het opnamespecialisme.

*Bijvoorbeeld*

Slikklachten bij ALS

- Opname voor de MDL-arts voor het plaatsen van een PEG sonde. De MDL arts behandelt niet de ALS maar plaatst de PEG sonde i.v.m. de slikklachten → hoofddiagnose slikklachten.
- Opname voor neurologie. De slikklachten worden verklaart door de ALS. De behandeling door de neuroloog is niet specifiek gericht op de slikklachten maar op het gehele ziektebeeld → hoofddiagnose ALS.

NB Bovenstaande systematiek geldt ook voor het bepalen van de volgorde van nevendiagnosen indien er al een andere hoofddiagnose is vastgelegd.

## 0-17 Onderzoek vanwege positieve iFOBT-test bij darmkankerscreening

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-10-2015

### Vraag

Wat wordt er gecodeerd wanneer een patiënt na een positieve darmkankerscreening (iFOBT-test) als vervolgonderzoek een coloscopie ondergaat?

### Advies

Indien de iFOBT-test positief is en patiënt komt voor vervolgonderzoek, codeer dan

- Indien carcinoom geconstateerd: het carcinoom coderen
- Indien (premaligne) poliepen worden geconstateerd: de poliepen coderen
- Indien andere verklaring voor de positieve test: de betreffende aandoening coderen
- Indien geen verklaring voor de positieve test is geconstateerd: codeer de positieve iFOBT met R19.5 'Overige afwijkingen van feces' en aanvullend Z03.1 "Observatie in verband met verdenking op maligne neoplasma"

Opmerking:

Aanvullend wordt de observatie op een maligne neoplasma vastgelegd met Z03.1.

Een screeningscode (Z12.-) is in dit geval niet van toepassing omdat er immers al sprake is van een afwijking van de feces.

Een code voor screeningsonderzoek wordt alleen gebruikt als er sprake is van een onderzoek bij (een individu uit) een groep, zonder dat er bij de leden van die groep voorafgaande aan het onderzoek een verdenking bestaat op een ziekte of zonder dat er een afwijking bestaat waarop dat onderzoek gericht is.

### **Toelichting**

Bij het bevolkingsonderzoek voor screening op darmkanker wordt gebruik gemaakt van de iFOBT-test. Dit staat voor "immunologische fecale occult bloedtest". Met deze test kunnen hele kleine hoeveelheden bloed, die niet met het oog waarneembaar zijn, in de ontlasting worden opgespoord.

## 0-18 Plastische (reconstructieve) chirurgie

---

ingangsdatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder  
Vervangt: CvZ aca 2.4

### **Vraag**

Hoe codeer je (na)behandeling met plastische chirurgie?

### **Advies**

Codeer de aandoening die behandeld wordt.

### **Toelichting**

De codes Z41.1 'Overige plastische chirurgie voor cosmetisch niet acceptabel uiterlijk' en Z42.- 'Nabehandeling met plastische chirurgie' geven weinig informatie. Bovendien omschrijven deze codes geen diagnose maar een uitgevoerde behandeling. Zie ook codeadvies 21-12 'Z-codes voor verrichtingen in de LBZ' waarin geadviseerd wordt een Z-code voor een behandeling niet vast te leggen als er een verrichtingencode uit de zorgactiviteitentabel (ZA-code) met een zelfde betekenis is vastgelegd.

### **Voorbeelden**

Mammareductie bij mammahypertrofie  
N62 'Hypertrofie van mamma'

Verbeteren van litteken na brandwond

L90.5 'Littekens en fibrose van huid' + T95.9 'Late gevolgen van niet gespecificeerde brandwond, etsing en bevrozing' + Y89.9 'Late gevolgen van niet gespecificeerde uitwendige oorzaak'

Mammareconstructie na mastectomie vanwege mammacarcinoom

Z90.1 'Verworven afwezigheid van mamma(e)' + Z85.3 'Persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van mamma'

Een voorbeeld waarbij Z42.- wel van toepassing is, is het losmaken van een transpositielap als afwerking van een eerdere operatie. In dit geval is er geen te coderen aandoening meer aanwezig en geeft Z42.- het beste de situatie weer.

## 0-19 De aanduiding 'NAS' voor aandoeningen niet aanwezig bij start opname

---

ingangsdatum: 01-10-2016 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-04-2019 & 01-10-2020 & 01-01-2022

### **Inleiding**

*mutatie*

Met de aanduiding 'NAS' (Niet aanwezig bij Start opname<sup>7</sup>) wordt in de LBZ aangegeven dat een aandoening tijdens het verblijf in het ziekenhuis is ontstaan, ongeacht de oorzaak.

Om inzicht te krijgen in aandoeningen die tijdens een opname ontstaan worden deze aandoeningen binnen de LBZ, aangeduid als Niet Aanwezig bij Start opname (NAS). Dit geldt voor aandoeningen die ontstaan als gevolg van medisch handelen (complicaties), en voor aandoeningen die zich ontwikkelen zonder relatie tot medisch handelen.

Aandoeningen die ontstaan tijdens de opname worden aangeduid met 'NAS' (Niet Aanwezig bij Start opname). De aanvullende codering bij de betreffende aandoening (zoals bijvoorbeeld voor het infectieuze agens of uitwendige oorzaak) wordt ook aangeduid met 'NAS'.

Indien niet duidelijk is of een aandoening al bij opname aanwezig was, dan registreer je deze niet met de aanduiding 'NAS'.

Een aandoening/complicatie die reeds aanwezig is op het moment van ziekenhuisopname wordt uiteraard niet aangeduid met 'NAS' bij de ICD-10 code.

In de LBZ is de aanlevering van de aanduiding 'NAS', indien van toepassing, verplicht bij een klinische opname, dagopname en langdurige observatie. De vastlegging van aandoeningen/complicaties die tijdens het ziekenhuisverblijf ontstaan, is vooral van belang in het kader van bewaking van de kwaliteit c.q. het aanleveren van gegevens met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren zoals de HSMR.

Alleen primaire diagnoses die geen hoofddiagnose zijn en nevendiaagnosen kunnen worden aangeduid met 'NAS'. Een aandoening/complicatie die ontstaat tijdens de ziekenhuisopname kan immers nooit de reden van opname zijn.

Zie voor de registratie van aanduiding 'NAS' bij O-codes en codes voor perinatale aandoeningen codeadvies 0-14.

Hieronder volgen een aantal registratieregels en voorbeelden ter verduidelijking.

### **Wel 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname / complicatie registreren**

- Een aandoening/complicatie die tijdens het ziekenhuisverblijf ontstaat, wordt aangeduid met 'NAS' bij de ICD-10 code.  
Aanwijzing: Indien niet duidelijk is of een aandoening/complicatie al bij opname aanwezig is, dan registreer je deze **niet** als een complicatie met de aanduiding 'NAS'.
- Een aandoening die is ontstaan tijdens de opname dient gedurende de hele opname met 'NAS' in de LBZ te worden geregistreerd, ook als een ander specialisme daarvoor in medebehandeling komt of bij overname door een ander specialisme. Bij medebehandeling of overname is het immers nog steeds een aandoening die bij opname niet aanwezig was en daarom met 'NAS' aangeduid moet worden.

#### *Voorbeeld*

Patiënt ontwikkelt een urineweginfectie door E-coli tijdens een opname voor een myocardinfarct en wordt overgeplaatst naar inwendige geneeskunde.

Codering: NAS N39.0 + NAS B96.2

<sup>7</sup> De NAS aanduiding binnen de LBZ-module gebeurt op dezelfde wijze als dat tot nu toe het geval was bij de C aanduiding van complicatie. Mogelijk is de LBZ-module al aangepast en is de registratie van NAS daarbinnen herkenbaar aangegeven. Als dat (nog) niet het geval is, dan wordt NAS aangegeven als complicatie zoals eerder. Neem bij vragen contact op via de Servicedesk.

Zowel voor de cardioloog als voor de internist wordt de urineweginfectie door E-coli aangeduid met 'NAS'.

- Indien een bestaande aandoening verergert of ontregelt, codeer dan alleen de verergering/ontregeling met de aanduiding 'NAS'. Leg alleen een verergering/ontregeling vast met de aanduiding 'NAS' als je die kan weergeven met een aparte ICD-10 code.

*Voorbeelden*

Bij een diabetes type 2 patiënt treedt een hyperglykemische ontregeling op tijdens de postoperatieve fase.

Codering E11.9 + NAS R73.9

Alleen de hyperglykemie wordt als 'NAS' aangeduid, de diabetes niet, want deze was al bij opname aanwezig.

Een COPD patiënt ontwikkelt tijdens de opname een exacerbatie o.b.v. een pneumonie. Codeer de COPD zonder exacerbatie met J44.99, om aan te geven dat bij opname de COPD aanwezig was, en aanvullend de COPD met exacerbatie o.b.v. een pneumonie als een complicatie met NAS J44.09 + NAS J18.9

Indien je een verergering/ontregeling niet kan weergeven met een aparte ICD-10 code leg je die niet vast met de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname.

*Voorbeeld*

Opname van patiënt met Crohn en tijdens de opname treedt een exacerbatie op.

Codering K50.9

- Externe oorzaken  
Als een aandoening/complicatie ontstaat tijdens een opname waarbij een aanvullende code voor de uitwendige oorzaak (hoofdstuk 20) wordt geregistreerd, krijgt de code uit hoofdstuk 20 ook 'NAS' aanduiding.

*Voorbeeld*

Tijdens de opname voor een appendectomie ontstaat een postoperatieve infectie.

Codering: NAS T81.4 + NAS Y83.6

Patiënt valt tijdens de opname uit bed en heeft als gevolg daarvan een commotio cerebri

Codering: NAS S06.00 + NAS W06.29

**Geen 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname / complicatie registreren**

- Een aandoening/complicatie die reeds aanwezig is op het moment van ziekenhuisopname wordt niet aangeduid met 'NAS' bij de ICD-10 code.
- Indien niet duidelijk is of een aandoening/complicatie al bij opname aanwezig is, dan registreer je deze niet als een aandoening niet aanwezig bij start opname met 'NAS'.
- Aandoeningen waarvan in het algemeen kan worden aangenomen dat ze bij opname reeds aanwezig waren (bijvoorbeeld chronische aandoeningen en nieuwvormingen), worden niet gecodeerd met de aanduiding 'NAS'.

*Voorbeeld*

Tijdens opname voor de behandeling van een heupfractuur wordt een diabetes type 2 geconstateerd.

De DM wordt als nevendiagnose geregistreerd en niet met 'NAS' aangeduid, hoewel de DM bij opname nog niet gediagnosticeerd was, was deze wel al aanwezig.

- Een complicatie van medisch handelen die al aanwezig is op het moment van opname

Als er een (her)opname plaatsvindt vanwege een reeds aanwezige complicatie, wordt de complicatie niet met 'NAS' aangeduid. Binnen de definitie van de LBZ betreft het namelijk geen aandoening niet aanwezig bij start opname 'NAS' als deze al aanwezig is bij opname.

#### *Voorbeeld*

Opname i.v.m. infectie van een in eerdere opname geplaatste heupprothese.

De infectie was al bij opname aanwezig en wordt daarom niet met 'NAS' aangeduid.

## 0-20 Hoofddiagnose bij postoperatieve overname vanuit een ander ziekenhuis

ingangsdatum: 01-01-2017

vervangt deels: CvZ aca 3.12 Status na, Nazorg, Reconvalescentie, Follow-up

### **Vraag**

Wat is de hoofddiagnose als een patiënt postoperatief vanuit een ander ziekenhuis wordt overgenomen?

### **Advies**

De hoofddiagnose is afhankelijk van de reden van opname:

1. de overplaatsing vindt plaats vanwege een postoperatieve complicatie → de postoperatieve complicatie is de hoofddiagnose.
2. er wordt doorbehandeld op de oorspronkelijke (geopereerde) aandoening → de oorspronkelijke aandoening is de hoofddiagnose en aanvullend wordt, indien mogelijk, de postoperatieve status gecodeerd.
3. de zorg na overplaatsing is gericht op postoperatieve nazorg → de hoofddiagnose is Z48.8 'overige chirurgische nabehandeling' en aanvullend wordt, indien mogelijk, de postoperatieve status gecodeerd.

Let op: Voor overdracht na een operatieve behandeling in verband met een maligniteit geldt codeadvies 2-4 'Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit'.

Zie ook advies 9-20 'Hoofddiagnose bij behandeling en nazorg acuut myocardinfarct met coronairsclerose' en codeadvies 9-21 'Doorgemaakt CVA' voor de codering bij overplaatsing na operatieve behandeling van een CVA.

### **NB**

- nazorg voor niet-operatieve ingrepen valt onder Z51.- 'overige gespecificeerde medische zorg' (alfabetische index: nazorg, - zie nabehandeling)
- dit advies is ook van toepassing op de keuze van de primaire diagnose bij interne overname door een ander specialisme

#### Voorbeeld opnamereden 1:

Overname i.v.m. geïnfecteerde knieprothese na plaatsing in ZBC

T84.5 'infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendige gewrichtsprothese' + Y83.1 'operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel'

#### Voorbeeld opnamereden 2:

Overname na stentplaatsing stent elders vanwege acute cholangitis

K83.0 'cholangitis' + Z96.8 'aanwezigheid van overige gespecificeerde functionele implantaten'

#### Voorbeeld opnamereden 3:

Overname na hartklepvervangning

Z48.8 'overige chirurgische nabehandeling' + Z95.4 'aanwezigheid van overige hartklepvervanging'

### **Toelichting**

In het verleden werd voor postoperatieve overdracht code Z54 geadviseerd. Code Z54 'reconvalescentie' is echter bedoeld voor herstel na ziekte en/of behandeling. Als een patiënt na een operatieve ingreep in het ziekenhuis moet verblijven is dat voor postoperatieve nazorg, dat omvat meer dan alleen herstel. Postoperatieve nazorg komt beter tot uiting in code Z48.8 'overige gespecificeerde vormen van chirurgische nabehandeling' en daarom wordt Z54.0 niet meer gebruikt binnen de ziekenhuiszorg. Code Z54 is van toepassing op bijvoorbeeld herstel in revalidatie instellingen of verpleeghuizen.

## **0-21 Hiërarchie van exclusies**

---

ingangsdatum: 01-01-2018 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Wat is de hiërarchie als er bij een code meerdere exclusies gelden?

### **Advies**

Exclusies op codeniveau bij drie-/viertekencategorieën gaan voor op exclusies op blok- of hoofdstukniveau.

### **Toelichting**

In de ICD-10 zijn op verschillende niveaus exclusies opgenomen:

- Op hoofdstukniveau (aan het begin van een hoofdstuk)
- Op blokniveau (aan het begin van een blok van drie-tekencategorieën)
- Op codeniveau bij drie-tekencategorieën
- Op codeniveau bij vier-tekencategorieën

Exclusies bij vier-tekencategorieën zijn het meest specifiek en gaan daarom voor op hoger gelegen exclusies. Zo ook exclusies bij drie-tekencategorieën etc..

Bijvoorbeeld:

Candidastomatitis bij pasgeborene ontstaan 1 week na de geboorte.

Voor het blok 'infecties specifiek voor perinatale periode (P35-P39)' geldt een exclusie voor infectieziekten verworven na geboorte (A00-B99, J09-J11).

Op basis van deze exclusie moeten infecties uit de reeksen A00-B99, J09-J11, die na de geboorte zijn ontstaan, vastgelegd worden binnen één van deze genoemde reeksen.

Candidastomatitis zou dan gecodeerd worden met B37.0. Echter, voor de drie-tekencategorie B37 geldt een exclusie voor neonatale candidiasis (P37.5). Omdat de exclusie bij B37 op een dieper niveau staat (drie-teken) dan de exclusie bij blok P35-P39 moet de exclusie bij B37 worden gevolgd.

Conclusie: Candidastomatitis bij pasgeborene ontstaan 1 week na de geboorte, wordt dus gecodeerd met P37.5 'neonatale candidiasis'. Aanvullend wordt B37.0 gecodeerd om de lokalisatie van de candidiasis aan te geven (de exclusies in de ICD-10 zijn er namelijk voor het bepalen van de voorkeurscode. Als je via de exclusie in een klasse uitkomt waar de term minder specifiek is beschreven, codeer je aanvullend als daarmee het ziektebeeld beter beschreven wordt).

## 0-22 Dagger-asteriskcombinaties

---

ingangsdatum: 01-04-2019 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Welke combinaties van dagger- en asteriskcodes zijn toegestaan?

### Advies

Er mag alleen een dagger-asteriskcombinatie worden geregistreerd waarvoor in deel 1 (Systematische lijst) en/of deel 3 (Alfabetische lijst) een suggestie wordt gegeven.

### Voorbeelden

1. Levercirrose met slokdarmvarices  
K74.6 'overige gespecificeerde en niet-gespecificeerde levercirrose' + I98.2\* 'slokdarmvarices zonder bloeding bij elders geclassificeerde ziekten'.  
Zowel deel 1 als deel 3 geeft deze dagger-asteriskcombinatie aan.
2. Auto-immuunhepatitis met slokdarmvarices  
K75.4 'auto-immuunhepatitis' + I85.9 'slokdarmvarices zonder bloeding'.  
I98.2\* is hier niet toegestaan omdat K75.4 niet in deel 1 is genoemd bij code I98.2\* en deel 3 geen suggestie voor deze combinatie geeft.  
De volgorde van de codering is afhankelijk van de reden van opname (zie codeadvies 0-16 'Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie').
3. Anemie door chronische nierinsufficiëntie NNO  
N18.9 'chronische nierziekte, niet-gespecificeerd' + D63.8\* 'anemie in kader van elders geclassificeerde overige chronische ziekten'  
Hoewel N18.9 niet binnen de codes valt die in deel 1 bij code D63.8\* genoemd zijn, geeft deel 3 een suggestie voor deze codering.  
anemie  
- bij  
- - chronische nierziekte  
- - - niet-gespecificeerd
4. Anemie bij reumatoïde artritis  
M06.90 'reumatoïde artritis, niet-gespecificeerd' + D64.9 'anemie, niet-gespecificeerd'  
D63.8\* is hier niet toegestaan omdat M06.90 niet in deel 1 is genoemd bij de code D63.8\* en deel 3 geen suggestie voor deze combinatie geeft.  
De volgorde van de codering is afhankelijk van de reden van opname (zie codeadvies 0-16 'Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie').
5. Pneumonie met pleuravocht  
J18.9 'pneumonie, niet gespecificeerd' + J91\* 'vochtophoping bij elders geclassificeerde aandoeningen'.  
Hoewel deel 1 en deel 3 geen expliciete combinatie voorstellen voor J18.9 + J91\*, is dit wel de juiste codering. De uitwerking van J91\* in deel 3 geeft aan dat J91\* bij iedere onderliggende aandoening is te gebruiken.  
vochtophoping  
- pleuraholte NEC  
- - bij elders geclassificeerde ziekten J91\*

NB J91\* is samen met I39.4\* een uitzondering op de andere asteriskcodes en mogen bij iedere onderliggende aandoening aanvullend gecodeerd worden.

## 0-23 Neutropene koorts door chemotherapie

---

ingangsdatum: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt neutropene koorts door chemotherapie gecodeerd?

### Advies

Neutropene koorts door chemotherapie wordt gecodeerd met D70 'agranulocytose' + Y43.3 ongewenst gevolg overige antineoplastische-geneesmiddelen' + R50.8 'overige gespecificeerde vormen van koorts'.

NB. R50.2 'koorts door geneesmiddelen' is hier niet van toepassing omdat de koorts ontstaat door de neutropenie en niet primair door de chemotherapie.

Als niet vermeld is dat de neutropene koorts door de chemotherapie komt adviseren wij D70 + R50.8.

## 0-24 Hoofddiagnose bij opname voor orgaantransplantatie

---

ingangsdatum: 01-04-2021 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Wat is de hoofddiagnose bij een opname voor orgaantransplantatie?

### Advies

Codeer het orgaanfalen, waarvoor de transplantatie noodzakelijk is, als hoofddiagnose. Codeer aanvullend de onderliggende ziekte, tenzij de ICD-10 en/of een codeadvies een andere volgorde van de codering aangeeft.

### Voorbeelden

1. harttransplantatie wegens terminaal hartfalen bij dilaterende cardiomyopathie: I50.9 + I42.0
2. chronische terminale nierinsufficiëntie o.b.v. multicystische nierziekte: N18.5 + Q61.4
3. chronische terminale nierinsufficiëntie o.b.v. diabetische nefropathie: E14.2† + N08.3\* + N18.5 (alfabetische index: insufficiëntie, - nier, - - diabetisch (acuut)(elk stadium)(chronisch)
4. chronische terminale nierinsufficiëntie o.b.v. hypertensie: I12.0 + N18.5 (alfabetische index: insufficiëntie, - nier, - - chronisch, - - - hypertensief)
5. chronische respiratoire insufficiëntie o.b.v. COPD GOLD klasse IV: J44.94 + J96.19 (codeadvies 10-6 Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie)

## 0-25 Primaire diagnose bij interne overname

---

**NIEUW**

ingangsdatum: 01-01-2022 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Wat is de primaire diagnose als een patiënt intern wordt overgenomen door een ander specialisme?

## Advies

De primaire diagnose voor het overnemend specialisme is afhankelijk van de reden van overname:

1. de overplaatsing vindt plaats vanwege een (postoperatieve) complicatie → de (postoperatieve) complicatie is de primaire diagnose.
2. er wordt doorbehandeld op de oorspronkelijke (geopereerde) aandoening → de oorspronkelijke aandoening is de primaire diagnose.
3. de zorg na overplaatsing is alleen gericht op postoperatieve nazorg → de primaire diagnose is Z48.8 'overige chirurgische nabehandeling'
4. er is comorbiditeit waarvoor patiënt wordt overgeplaatst → de belangrijkste comorbiditeit is de primaire diagnose
5. de zorgvraag bij opname past beter bij een ander specialisme → de betreffende zorgvraag is de primaire diagnose

Als de reden van overdracht niet duidelijk uit de documentatie blijkt dan is het advies om te coderen volgens optie 2.

## Toelichting

Binnen de LBZ wordt per specialisme gecodeerd. Per (mee)behandelend specialisme wordt minimaal een primaire diagnose vastgelegd, eventueel aangevuld met nevendiaagnosen.

Als een patiënt gedurende een opname wordt overgedragen aan een ander specialisme, kan het overnemend specialisme al voor de overdracht als medebehandelaar bij de patiënt zijn betrokken. Daarom codeer je per specialisme en niet per periode.

Bij een opname is er altijd maar één hoofddiagnose en deze komt overeen met één van de primaire diagnosen die tijdens de opname zijn vastgelegd. Als er meerdere specialismen bij de opname zijn betrokken, wordt de hoofddiagnose toegekend aan het specialisme dat het grootste aandeel heeft gehad in de behandeling van de diagnose die de reden van opname was.

Voorbeelden:

1. De overplaatsing vindt plaats vanwege een (postoperatieve) complicatie
  - 1.a Patiënt is opgenomen voor de MDL-arts voor een coloscopie vanwege een darmpoliep, bij de ingreep ontstaat een perforatie waarvoor de patiënt wordt overgedragen aan de chirurg voor een hemicolectomie
    - primaire diagnose MDL: darmpoliep
    - primaire diagnose chirurg: de perforatie
    - hoofddiagnose: darmpoliep bij de MDL-arts (de poliep was de reden van opname en bovendien kan een complicatie die ontstaat tijdens een opname nooit de hoofddiagnose zijn)
  - 1.b Patiënt is opgenomen voor de longarts vanwege een exacerbatie COPD en wordt gedurende de opname respiratoir insufficiënt en wordt overgedragen aan de intensivist
    - primaire diagnose longarts: exacerbatie COPD
    - primaire diagnose intensivist: respiratoire insufficiëntie
    - hoofddiagnose: exacerbatie COPD voor de longarts
2. Er wordt doorbehandeld op de oorspronkelijke (geopereerde) aandoening
  - 2.a Patiënt wordt opgenomen bij de MDL-arts met buikklachten en blijkt een coloncarcinoom te hebben, en wordt na 1 dag voor operatieve behandeling overgedragen aan de chirurg
    - primaire diagnose MDL: coloncarcinoom
    - primaire diagnose chirurg: coloncarcinoom
    - hoofddiagnose: coloncarcinoom voor de chirurg (de chirurg heeft het grootste aandeel in de behandeling)

3. De zorg na overplaatsing is alleen gericht op postoperatieve nazorg
  - 3.a Patiënt wordt opgenomen bij de chirurg met een aneurysma van de abdominale aorta, volgens protocol worden patiënten na een grote buikoperatie postoperatief gemonitord op de IC
    - primaire diagnose chirurgie: aneurysma abdominale aorta
    - primaire diagnose intensivist: postoperatieve nazorg (Z48.8)
    - hoofddiagnose: aneurysma abdominale aorta voor de chirurg
  - 3.b Patiënt met ernstig slaapapneu wordt opgenomen voor een acute appendectomie bij de chirurg en moet vanwege de slaapapneu postoperatief gemonitord worden op de IC
    - primaire diagnose chirurgie: appendicitis
    - primaire diagnose intensivist: slaapapneu
    - hoofddiagnose: appendicitis voor de chirurg
  
4. Er is comorbiditeit waarvoor patiënt wordt overgeplaatst → de belangrijkste comorbiditeit is de primaire diagnose
  - 4.a Patiënt wordt bij de uroloog opgenomen met een urineweginfectie en ontregelde diabetes. Nadat behandeling voor de UWI is ingezet wordt patiënt overgedragen aan de internist voor reguleren van de diabetes.
    - primaire diagnose uroloog: UWI
    - primaire diagnose internist: ontregelde diabetes
    - hoofddiagnose: UWI voor de uroloog
  - 4.b 90-jarige patiënt wordt opgenomen voor de orthopeed met een collumfractuur en vanwege de hoge leeftijd is de geriater betrokken als medebehandelaar. Nadat de voornaamste postoperatieve fase is afgerond wordt patiënt als kwetsbare oudere overgedragen aan de geriater.
    - primaire diagnose orthopeed: collumfractuur
    - primaire diagnose geriater: kwetsbare oudere (R54)
    - hoofddiagnose: collumfractuur voor de orthopeed
  
5. De zorgvraag bij opname past beter bij een ander specialisme
  - 5.a Patiënt wordt opgenomen bij de cardioloog met verdenking op hartfalen vanwege benauwdheid. Het blijkt echter om een pneumonie te gaan waarvoor de patiënt wordt overdragen aan de longarts.
    - primaire diagnose cardioloog: pneumonie
    - primaire diagnose longarts: pneumonie
    - hoofddiagnose: pneumonie voor longarts
  - 5.b Patiënt wordt opgenomen bij de internist met buikpijn. De internist komt niet tot een diagnose en draagt patiënt over aan de MDL-arts. De MDL-arts stelt de diagnose cholangitis.
    - primaire diagnose internist: buikpijn
    - primaire diagnose MDL-arts: cholangitis
    - hoofddiagnose: cholangitis voor de MDL-arts

## 1-1 Diarree NNO

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
 mutatedatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Wat is de NNO code voor diarree / colitis / gastro-enteritis?

### **Advies**

In de 2014 versie van de ICD-10 valt diarree/colitis/gastro-enteritis NNO onder A09.9.

Let op : diarree, colitis en gastro-enteritis gespecificeerd als niet infectieus valt wel onder K52.9.

## 1-3 Bacteriëmie

---

ingangsdatum: 01-04-2019 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je een bacteriëmie?

### **Advies**

Een bacteriëmie wordt gecodeerd met A49.- 'bacteriële infectie van niet-gespecificeerde lokalisatie'. Indien de bacterie nader gespecificeerd kan worden codeer je B95.- of B96.- aanvullend.

Let op de bij A49 genoemde exclusies.

### **Voorbeelden:**

1. Bacteriëmie met streptokok A  
A49.1 'streptokokkeninfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd' + B95.0 'Streptococcus groep A, als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken'
2. Bacteriëmie met stafylokok  
A49.0 'stafylokokkeninfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd' (in dit geval wordt B95.8 'niet-gespecificeerde Staphylococcus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken' niet aanvullend gecodeerd omdat dit geen extra informatie toevoegt aan A49.0, zie codeadvies 0-4 Aanvullend coderen)
3. Urineweginfectie op basis van E. coli , met een E. coli in de diverse bloedkweken.  
N39.0 'UWI, lokalisatie niet gespecificeerd'  
B96.2 'E. coli'  
A49.8 'overige gespecificeerde bacteriële infecties, lokalisatie niet-gespecificeerd'  
B96.2 'E. coli'
4. Bacteriëmie NNO  
A49.9 ' bacteriële infectie, niet-gespecificeerd'

### **Toelichting**

Bij een bacteriëmie is er sprake van bacteriën in de bloedbaan. Bacteriën in de bloedbaan leiden niet altijd tot een sepsis. Als dat wel het geval is geldt codeadvies 1-4.

## 1-4 Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie

---

ingangsdatum: 1-4-2019 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Wat is de volgorde van coderen bij een sepsis, waarvan de onderliggende lokale infectie bekend is?

## Advies

Codeer als eerste de lokale infectie en aanvullend de sepsis.

## Voorbeelden

Bij al deze voorbeelden gaan we er vanuit dat uit de documentatie van de arts blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een sepsis, ongeacht de aanwezigheid van een infectieus agens in de bloedbaan.

1. Opname vanwege cholangiosepsis  
K83.0 'cholangitis' + A41.9 'sepsis, niet-gespecificeerd'
2. Opname vanwege een sepsis waarbij na onderzoek blijkt dat er sprake is van een urosepsis.  
N39.0 'urine­weginfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd' + A41.9 'sepsis, niet-gespecificeerd'
3. Opname abdominale sepsis<sup>8</sup>NNO  
K65.0 'acute peritonitis' + A41.9 'sepsis, niet-gespecificeerd'
4. Sepsis ontstaan uit erysipelas door Staphylococcus aureus  
A46 'erysipelas' + B95.6 'Staphylococcus aureus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken' + A41.0 'sepsis door Staphylococcus aureus', niet-gespecificeerd'

NB als de lokale infectie niet bekend is dan wordt de sepsis als eerste code geregistreerd.

Zie voor het gebruik van terminologie bij ontsteking i.c.m. sepsis ook codeadviezen 10-4 Pneumosepsis, 14-2 Urosepsis en 19-8 Lijnsepsis.

## 1-5 COVID-19

AANVULLING

ingangsdatum: 01-01-2020  
update: 01-05-2020 & 01-06-2020 & 01-10-2020 & 01-01-2021 & 01-04-2021 & 01-07-2021 & 01-01-2022  
NB codes U08.9, U09.9, U10.9 en U12.9 zijn pas geldig vanaf registratiejaar 2021

## Vraag

Hoe codeer je COVID-19?

## Advies

Voor de codering is het belangrijk om aan de hand van de ontslagbrief en de laboratoriumtesten vast te stellen of

<sup>8</sup> Als het orgaan bekend is van waaruit de abdominale sepsis is ontstaan codeer de ontsteking van het betreffende orgaan als eerste (bijvoorbeeld galblaas of appendix).

Als de sepsis van het peritoneum uitgaat, of de lokalisatie niet bekend is, dan codeer je K65.0 (zoekpad: peritonitis, -septisch K65.0).

- het virus is geïdentificeerd
- COVID-19 is uitgesloten
- COVID-19 / verdenking op COVID-19 de hoofdreden van opname was of een nevendiagnose
- er manifestaties van de infectie zijn en zo ja welke
- er complicaties tijdens de opname zijn en zo ja welke

Net als bij alle andere opnames is het van belang om alle relevante nevendiaagnosen en risicofactoren (o.a. roken en overgewicht) juist te coderen (zie codeadvies 0-2).

**NB Bij laboratoriumtesten houden we in dit advies de PCR-testen aan.**

#### **U07.1 COVID-19, virus geïdentificeerd**

- gebruik deze code alleen als
  - COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest bij een patiënt met symptomen
  - COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest bij een patiënt zonder symptomen
  - COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve antigeen sneltest bij een patiënt met symptomen
- eventuele manifestaties worden aanvullend vastgelegd

#### **U07.2 COVID-19, virus niet geïdentificeerd**

- gebruik deze code alleen als er sprake is van
  - COVID-19 NNO (indien niet duidelijk is of er een laboratoriumtest is uitgevoerd of als de testuitslag (nog) niet bekend is)
  - verdenking op of vermoedelijk COVID-19 maar (nog) niet bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest
  - een CT-scan en/of klinisch beeld dat wijst op COVID-19 maar (nog) niet is bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest (zie voorbeeld 5)
- eventuele manifestaties worden aanvullend vastgelegd

Let op: gebruik U07.2 **niet** indien er een verdenking was maar COVID-19 uiteindelijk is uitgesloten (zie hieronder)

NB De interpretatie van eventueel genoemde CO-RADS-scores wordt overgelaten aan de medisch specialist.

#### **COVID-19 uitgesloten**

- Als een verdenking op COVID-19 na een negatieve laboratoriumtest en/of op basis van een CT-scan en/of het klinische beeld is uitgesloten, codeer dan de gediagnosticeerde aandoening of het symptoom en aanvullend Z03.8 om aan te geven dat de patiënt op de verdenking is getest
- Als er (procedureel) wordt getest zonder dat er sprake is van een verdenking op COVID-19, dan wordt Z03.8 niet vastgelegd

#### **Isolatie**

- Codeer isolatie bij (verdachte) COVID-19 patiënten aanvullend met Z29.0 'isolatie'

#### **Complicaties**

- Codeer alle manifestaties/aandoeningen en complicaties die tijdens het ziekenhuisverblijf ontstaan met de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij

start opname bij de ICD-10 code (volgens codeadvies 0-19 'De aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname)

### **Niet registreren**

- De codes B34.2 en B97.2 worden niet (aanvullend) geregistreerd bij gebruik van U07.1 en U07.2. Deze codes zijn alleen van toepassing op de overige (niet COVID-19) corona infecties

### **Hoofddiagnose / nevensdiagnose**

- Indien (verdenking op) COVID-19 de hoofdreden van opname is: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose
- Indien COVID-19 niet de hoofdreden van opname is: codeer U07.1/2 als nevensdiagnose
- COPD (met én zonder exacerbatie) in combinatie met COVID-19: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose (let op: wijkt af van de bestaande COPD-codeadviezen)
- Respiratoire insufficiëntie en COVID-19: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose, en primaire diagnose, ook als er sprake is van een overdracht en/of medebehandeling vanwege de respiratoire insufficiëntie (let op: afwijkend van advies 10-6)
- Zwangerschap, bevalling en kraambed: indien (verdenking op) COVID-19 de hoofdreden van opname is, codeer dan U07.1/2 als hoofddiagnose  
Let op: wijkt af van de gebruikelijke codeervolgorde waarbij over het algemeen een O-code de hoofddiagnose is

NB Voor alle bovengenoemde situaties geldt de volgende uitzondering: indien na (laboratorium) onderzoek geen COVID-19 maar een andere aandoening is vastgesteld; codeer dan de vastgestelde aandoening op de gebruikelijke wijze. In dat geval is U07.1/2 niet van toepassing, zie ook voorgaande tekst over 'COVID-19 uitgesloten'.

### **Naslaan laboratoriumtesten**

- Indien de arts als diagnose COVID-19 aangeeft, maar in de ontslagbrief geen laboratoriumtest op COVID-19 is vermeld, adviseren we specifiek voor deze situatie het EPD te raadplegen op positieve- dan wel negatieve laboratoriumtesten op COVID-19

### **Overplaatsing van en naar ander ziekenhuis**

- Bij overplaatsing van een COVID-19 patiënt is de hoofddiagnose afhankelijk van de reden van overplaatsing:
  - de overplaatsing vindt plaats vanwege het voortzetten van de COVID-19 behandeling en/of herstel van COVID-19 → U07.1/2 is de hoofddiagnose
  - de overplaatsing vindt plaats vanwege een complicatie van COVID-19 of een andere (nieuw ontstane) aandoening → de complicatie of andere aandoening is de hoofddiagnose en U07.1/2 de nevensdiagnose.

Let op: Als een patiënt aansluitend aan een opname met COVID-19 wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, wordt dit voor de codering van U07.1/2 (hoofd- of nevensdiagnose) als één COVID-19 opname gezien, ongeacht of patiënt bij overname nog positief is (zie voorbeeld 12).

### **Restverschijnselen / late gevolgen na doorgemaakte COVID-19**

- Code U09.9 'Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd' is van toepassing voor aandoeningen/symptomen die het gevolg zijn van een eerder doorgemaakte COVID-19 infectie. Codeer het restverschijnsel / late gevolg na doorgemaakte COVID-19 en aanvullend U09.9. Deze code mag niet worden gebruikt bij opnamen waarbij U07.1/2 is geregistreerd, tenzij de restverschijnselen / late gevolgen betrekking hebben op een eerdere COVID-19 infectie.

Zie voor nadere uitleg voor het coderen van restverschijnselen/late gevolgen deel 2 van de ICD-10, paragraaf 4.5.2 onder het kopje 'Het coderen van late gevolgen van bepaalde aandoeningen'.

NB; in deel 1 staat bij code U09.9 de aanwijzing 'Deze code moet niet gebruikt worden in gevallen waar COVID-19 nog steeds aanwezig is'. Deze aanwijzing geldt niet voor een recidief COVID-19 infectie. Als er sprake is van een actuele COVID-19 episode en tevens een eerder doorgemaakte COVID-19 infectie met restverschijnselen / late gevolgen, dan mag U09.9 geregistreerd worden bij een opname waarbij U07.1/2 is geregistreerd.

### **Status na COVID-19 zonder restverschijnselen**

- Gebruik code U08.9 'Persoonlijke anamnese van COVID-19, niet-gespecificeerd' als het in de ontslagbrief wordt genoemd of als je in één oogopslag ziet dat door de medisch codeur eerder U07.1/2 en/of U08.9 is geregistreerd, ook zonder relatie tot de huidige opname (dit is een uitzondering op punt A van de uitwerking van het advies 0-2).

NB; in deel 1 staat bij code U08.9 de aanwijzing 'Deze optionele code kan worden gebruikt om een eerdere (bevestigde of waarschijnlijke) episode van COVID-19 vast te leggen indien deze van invloed is op de huidige gezondheidsstatus en de persoon niet langer lijdt aan COVID-19. Deze aanwijzing geldt niet voor een recidief COVID-19 infectie. Als er sprake is van een actuele COVID-19 episode en tevens een eerder doorgemaakte COVID-19 infectie zonder restverschijnselen dan mag U08.9 geregistreerd worden bij een opname waarbij U07.1/2 is geregistreerd.

### **Multisystem inflammatory syndrome (MIS-A (in Adults) of MIS-C (in Children)) gerelateerd aan COVID-19**

- Bij het Multisystem inflammatory syndrome (MIS) gerelateerd aan COVID-19, kunnen we onderstaande situaties onderscheiden.

Opnamereden is:

1. MIS na eerder doorgemaakte COVID-19: U10.9
2. MIS met tegelijkertijd COVID-19: U10.9 + U07.1/2
3. COVID-19, gedurende de opname ontwikkeling van MIS U07.1/2 & NAS U10.9

Eventueel orgaanfalen of andere uitingen bij MIS, worden aanvullend aan U10.9 gecodeerd.

### **Ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie (U12.9)**

- Als een COVID-19 vaccinatie een ongewenste reactie tot gevolg heeft, volg je de alfabetische lijst. Achter sommige ziektes staat een inspring voor de gevolgen van een vaccinatie, bijvoorbeeld - 'na vaccinatie' of 'als gevolg van vaccinatie'. Is deze inspring niet te vinden, raadpleeg dan het alfabetisch zoekpad; complicaties, - vaccinatie. Aanvullend codeer je Y59.0 'Ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van virusvaccins' + U12.9 'Ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie'. Als je de aandoening niet kan vinden bij één van de ingangen voor vaccinatie-complicaties, adviseren we T88.1 + Y59.0 + U12.9 en aanvullend de nadere specificatie van de ziektemanifestatie(s).
- Als zich na een vaccinatie een aandoening manifesteert die misschien een ongewenst gevolg van het vaccin betreft, zonder dat de specialist de relatie aangeeft, is het advies hierover uitsluitend bij de specialist te vragen. Als navraag niet mogelijk is, wordt de betreffende aandoening niet als ongewenst gevolg van het vaccin aangemerkt, maar op de gebruikelijke manier geregistreerd, tenzij in de ontslagbrief is opgenomen dat de

specialist de aandoening als mogelijk ongewenst gevolg heeft gemeld bij Lareb (alleen indien genoemd in de ontslagbief, niet dossier hierop doorzoeken).

NB: Code U12.9 'Ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie' is beschikbaar per 1 juli 2021. Omdat de code met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 kan worden gebruikt, adviseren we eerdere opnames voor ongewenste reacties t.g.v. COVID-19 vaccinatie aan te passen volgens bovenstaand advies met code U12.9. In het LBZ-portaal kunt u t.z.t. een overzicht raadplegen met de eerder geregistreerde opnames met Y59.0

### **Niet-gevaccineerd met COVID-19 vaccin (Z28.-)**

- Als iemand, opgenomen met COVID-19, niet gevaccineerd is kan dat geregistreerd worden met Z28.- 'immunisatie niet uitgevoerd' (alleen indien genoemd in de ontslagbief, niet dossier hierop doorzoeken).

### **Voorbeelden**

- Indien (verdenking op) COVID-19 de hoofdreden van opname is
  1. COVID-19 bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest, met viruspneumonie: U07.1 + J12.8
  2. COVID-19 NNO met viruspneumonie bij patiënt die rookt en overgewicht heeft: U07.2 + J12.8 + F17.1 + E66.9
  3. COVID-19 bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest, met virale gastro-enteritis: U07.1 + A08.3
  4. COVID-19 bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest, met viruspneumonie en acute respiratoire insufficiëntie.
    - a. Patiënt ligt drie weken opgenomen bij de internist: U07.1 (hoofddiagnose) + J12.8 + J96.09
    - b. Tijdens het verblijf wordt patiënt kort overgenomen door de intensivist vanwege de respiratoire insufficiënte: U07.1 (primaire diagnose) + J12.8 + J96.09
  5. COVID-19 met pneumonie op basis van aanhoudend klinisch beeld en CT-scan van de longen, geen bevestiging d.m.v. laboratoriumtest: U07.2 + J18.9
- Indien COVID-19 niet de hoofdreden van opname is, codeer U07.1/2 dan als nevendiagnose
  6. Opname vanwege een acuut transmuraal voorwand myocardinfarct, tevens blijkt uit genomen test patiënt COVID-19 positief: I21.0 + U07.1
- Indien COVID-19 is uitgesloten
  7. COVID-19 verdenking met pneumonie, na laboratoriumtest blijkt geen COVID-19 maar een adenoviruspneumonie: J12.0 + Z03.8
- COPD (met én zonder exacerbatie) in combinatie met COVID-19
  8. exacerbatie van COPD o.b.v. een pneumonie en COVID-19 bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest: U07.1 + J44.0- + J12.8
  9. verdenking COVID-19 met COPD NNO: U07.2 + J44.99
- Complicaties

10. COVID-19 bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest met viruspneumonie, in verloop van de opname ontwikkelt patiënt een acute respiratoire insufficiëntie en acute nierinsufficiëntie: U07.1 + J12.8 + NAS J96.09 + NAS N17.9
- Overplaatsing van en naar ander ziekenhuis
    11. Bevestigde COVID-19 met viruspneumonie behandeld in ziekenhuis A, waarna patiënt wordt overgenomen voor revalidatie in ziekenhuis B.  
Ziekenhuis A: U07.1 + J12.8  
Ziekenhuis B: U07.1 + indien de pneumonie nog actueel is J12.8 aanvullend
    12. Patiënt wordt na een bevestigde COVID-19 overgenomen door ziekenhuis B vanwege ernstige 'critical illness'-polyneuropathie, bij overname is patiënt niet meer positief voor COVID-19  
Ziekenhuis B: G62.9 + U07.1
  - Restverschijnselen / late gevolgen
    13. Longfibrose na doorgemaakte COVID-19: J84.1 + U09.9 'Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd'
    14. Een maand eerder opgenomen met een doorgemaakte COVID-19. Nu heropname met dyspnoe en thoracale pijnklachten als restverschijnselen van COVID-19. Patiënt nu niet meer positief getest op COVID-19: R06.0 + R07.4 + U09.9 'Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd'
    15. Opname vanwege een recidief COVID-19 infectie, vastgesteld a.d.h.v. een PCR-test, verder is er na een eerdere COVID-19 infectie nog steeds sprake van een Vermoeidheidssyndroom: U07.1 + G93.3 'vermoeidheidssyndroom na virusinfectie' + U09.9 'Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd'
    16. Kind, heeft drie maanden geleden COVID-19 gehad.  
Nu opgenomen met Post-COVID Associated Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) met conjunctivitis: U10.9 'Multisystem inflammatory syndrome gerelateerd aan COVID-19, niet-gespecificeerd' + B30.8† 'Overige gespecificeerde virale conjunctivitis' + H13.1\* 'Conjunctivitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen'
    17. Patiënt wordt twee weken na een COVID-19 infectie opgenomen voor behandeling van een longembolie. PCR-test is nog positief maar patiënt is asymptomatisch en hoeft niet meer in isolatie: I26.9 + U07.1 (de reden van opname is de longembolie, deze is het gevolg van de eerdere COVID-19 infectie, U07.1 is van toepassing omdat patiënt nog positief is (zie de uitleg bij code U07.1) en niet code U09.9).
  - Bevallingen
    18. Gravida opgenomen voor behandeling COVID-19 (bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest), in deze opname spontane bevalling van een gezonde zuigeling zonder bijzonderheden: U07.1 & O98.5 & Z37.0  
Let op: afwijkend van de gebruikelijke codevolgorde bij bevallingen
  - Ongewenste gevolgen na COVID-19 vaccinatie
    19. Koorts en malaise als reactie op COVID vaccinatie: T88.1 + Y59.0 + U12.9 + R50.2 + R53
    20. Allergische reactie op het COVID-19 vaccin: T88.1+ Y59.0 + U12.9

21. Acute perimyocarditis ontstaan na COVID-19 vaccinatie, de specialist meldt dit bij Lareb als een mogelijke ongewenst gevolg van het vaccin: T88.1 + Y59.0 + U12.9 + I30.9 + I40.9

## 2-1 Maligne neoplasma van onafhankelijke multipele lokalisaties C97

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-04-2018

### Vraag

Hoe wordt code C97 gebruikt?

### Advies

C97 wordt alleen gebruikt bij meerdere primaire maligniteiten van gelijke zwaarte in verschillende organen. C97 mag alleen als primaire diagnose en hoofddiagnose worden gebruikt.

C97 wordt **niet** gebruikt bij:

- Meerdere tumoren in één orgaan (één drie-tekencategorie)(zie codeadvies 2-10).
- Dubbelzijdige tumoren in extremiteiten en dubbelzijdige organen (zie codeadvies 2-10).

C97 wordt zonder M-code gebruikt.

Als gebruik gemaakt wordt van de M-code, dan wordt een primaire tumor (behalve C97) altijd gevolgd door een M-code, ook als het dezelfde morfologie betreft (zie ook pagina 165 deel 2)

Voorbeeld:

Patiënt met plaveiselcelcarcinoom van de linker longhilus en intestinaal carcinoom van het colon: C97 + C34.0 + M8070/3 + C18.9 + M8144/3

## 2-4 Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit

---

AANVULLING

ingangsdatum: 01-01-2015  
mutatiedatum: 01-08-2015 & 01-01-2020  
vervangt: CvZ aca 20.5 en 5.1

### Vraag

Wat is de hoofddiagnose bij de behandeling van een maligniteit?

### Advies

Codeer de maligniteit waar de behandeling op gericht is als hoofddiagnose. Dit zal veelal de primaire tumor zijn, maar kan ook een metastase zijn. Ook als een maligniteit verwijderd is, wordt gedurende het gehele behandeltraject de oorspronkelijke maligniteit geregistreerd. De medisch specialist beschouwt de maligniteit gedurende de hele behandeling namelijk als de hoofddiagnose, ongeacht of dat voor of na de operatie is.

NB Dit advies is ook van toepassing als er sprake is van een in situ maligniteit.

### Toelichting

De behandeling van een maligniteit is gericht op de primaire tumor en/of eventuele metastasen. Voor de juiste selectie van de hoofddiagnose is het belangrijk om de LBZ definitie van de hoofddiagnose te hanteren: de diagnose die achteraf, dus bij ontslag, wordt beschouwd als de reden van de opname in het ziekenhuis.

Als de behandeling gericht is op de primaire tumor, dan is de primaire tumor dus de hoofddiagnose. Is de behandeling echter gericht op een metastase, dan is de metastase de hoofddiagnose (ook als de primaire tumor nog aanwezig is).

Voor de aanvullende behandeling van een verwijderde maligniteit wordt tijdens het behandeltraject de oorspronkelijke maligniteit geregistreerd. Hoewel de maligniteit is verwijderd, staat de behandeling namelijk nog steeds in het teken van de verwijderde maligniteit.

Pas als het gehele behandeltraject is afgerond en de maligniteit niet meer aanwezig is (de follow-up is gestart), kan code Z85.- worden geregistreerd om een maligniteit in de anamnese vast te leggen.

#### Opmerkingen

- Voor dit codeadvies vallen onder het behandeltraject operaties, radiotherapie, chemotherapie en immunotherapie. Hormoonbehandelingen vallen hier buiten. Als de aanvullende behandeling van een verwijderde maligniteit alleen uit een hormoonbehandeling bestaat, dan wordt niet meer de oorspronkelijke maligniteit gecodeerd maar een maligniteit in de anamnese.
- Als niet duidelijk is of de behandeling op de primaire tumor of op de metastase gericht is, dan is de primaire tumor hoofddiagnose.
- Een opname voor een preventieve verrichting wegens belaste familie- anamnese en/of persoonlijke anamnese wordt gecodeerd met hoofddiagnose Z40.0 'Preventieve chirurgie voor risicofactoren verband houdend met maligne neoplasma'. Aanvullend wordt de familie- anamnese en/of persoonlijke anamnese vastgelegd (zie ook codeadvies 21-14).

#### Voorbeeld 1

Opname voor leverbiopsie bij een nog niet behandeld coloncarcinoom. PA-verslag: biopt bevat metastase van het eerder gediagnosticeerde coloncarcinoom.

Hoofddiagnose C78.7 'Secundair maligne neoplasma van lever'

Neveniagnose C18.- 'Maligne neoplasma van colon'

→ De opname is in het kader van diagnostiek van de leveraandoening en niet voor de behandeling van het coloncarcinoom.

#### Voorbeeld 2

Opname voor re-excisie na poliklinisch verwijderd melanoom, waarbij getwijfeld werd aan de radicaliteit. PA-verslag: er wordt geen melanoom meer aangetroffen.

Hoofddiagnose C43.- 'Maligne melanoom van huid'

→ De opname staat in het teken van een verdere behandeling van het gediagnosticeerde melanoom.

#### Voorbeeld 3

Opname voor okselkliertoilet, nadat in dagopname volledige verwijdering van een mammacarcinoom heeft plaatsgevonden. Bij de definitieve PA-uitslag blijkt er een micrometastase in de schildwachtkliert te zijn. Vandaar dat in tweede instantie een okselkliertoilet wordt uitgevoerd. PA-verslag okselkliertoilet: geen metastatisch tumorweefsel meer aanwezig.

Hoofddiagnose C77.3 'Secundair maligne neoplasma van lymflieren van oksel en bovenste extremiteit'

Neveniagnose C50.- 'Maligne neoplasma van mamma'

→ De opname staat in het teken van de verdere behandeling van de eerder geconstateerde micrometastase van het verwijderde mammacarcinoom.

#### Voorbeeld 4

Opname voor cytostatica na mastectomie met lymfkliertoilet vanwege mammacarcinoom met okselkliermetastasen

Hoofddiagnose C50.- 'Maligne neoplasma van mamma'

Nevendiaagnose C77.3 'Lymfklieren van oksel en bovenste extremiteit'

→ Omdat hier niet duidelijk blijkt of de chemotherapie met name gericht is op het nabehandelen van het mammacarcinoom of op de metastasen is de primaire tumor de hoofddiagnose.

#### Voorbeeld 5

Opname voor cytostatica aanvullend op resectie rectumcarcinoom met levermetastasen

Hoofddiagnose C20 'Maligne neoplasma van rectum'

Nevendiaagnose C78.7 'Secundair maligne neoplasma van lever'

→ Omdat hier niet duidelijk blijkt of de chemotherapie met name gericht is op het nabehandelen van het rectumcarcinoom of op de levermetastasen is de primaire tumor de hoofddiagnose.

#### Voorbeeld 6

Opname voor APD-infuus bij botmetastasen 3 jaar na radicale prostatectomie wegens prostaatacarcinoom.

Hoofddiagnose C79.5 'Secundair maligne neoplasma van bot en beenmerg'

Nevendiaagnose Z85.4 'Persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van geslachtsorganen'

→ De behandeling van het prostaatacarcinoom was geheel afgerond toen na 3 jaar botmetastasen ontstonden. Vandaar dat de primaire tumor niet meer wordt vastgelegd.

#### Voorbeeld 7

Opname voor lixexcisie nadat uit een excisiebiopt van de cervix een carcinoom bleek.

Hoofddiagnose C53.- 'Maligne neoplasma van cervix uteri'.

→ Ongeacht of bij de lixexcisie nog maligne weefsel aanwezig is, wordt een cervixcarcinoom vastgelegd. De lixexcisie is immers een verdere behandeling van het gediagnostiseerde cervixcarcinoom.

#### Voorbeeld 8

Opname voor cystoscopie met biopt in verband met onderzoek na blaascarcinoom. 3 jaar eerder is dit behandeld met lokale excisie en blaasspoelingen. Er wordt geen recidief gevonden.

Hoofddiagnose Z08.7 'Vervolgonderzoek na gecombineerde behandeling van maligne neoplasma'

Nevendiaagnose Z85.5 'Persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van nier en urinewegen'.

→ Z-codes omdat de behandeling is afgerond. Opname staat in het kader van controle na een maligniteit.

#### Voorbeeld 9

Tijdens de periode dat patiënte nabehandeld wordt voor een verwijderd mammacarcinoom (patiënte zit dus nog niet in de follow-up), wordt patiënte voor de orthopeed opgenomen met een enkelfractuur (niet pathologisch). Vanwege de behandeling van het mammacarcinoom komt de internist in medebehandeling.

Hoofddiagnose voor de orthopeed is de enkelfractuur.

Primaire diagnose voor de medebehandeling van de internist C50.- 'Maligne neoplasma van mamma'

→ Omdat de behandeling van het mammacarcinoom nog niet is afgerond wordt de primaire tumor gecodeerd. De internist beschouwt de maligniteit gedurende de hele behandeling namelijk als de hoofddiagnose, ongeacht of dat voor of na de operatie is.

#### Voorbeeld 10

Opname voor plastische chirurg voor mammareconstructie, na amputatie vanwege mammacarcinoom.

Hoofddiagnose Z90.1 'Verworven afwezigheid mamma'

Nevendiagnose Z85.3 'Persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van mamma'

→ Deze codering geldt ongeacht de termijn waarbinnen de reconstructie plaatsvindt. De reconstructie op zich is immers geen onderdeel van de behandeling van het carcinoom, want deze verandert niets aan het verloop van de ziekte.

Als de reconstructie in dezelfde operatiesessie plaatsvindt als de amputatie door de chirurg, is Z90.1 de primaire diagnose voor de plastisch chirurg. Z85.3 is in dat geval als nevendiagnose niet van toepassing omdat voor de chirurg het mammacarcinoom met code C50.- vastgelegd wordt.

Z42 'Nabehandeling met plastische chirurgie' is hier niet van toepassing omdat deze code een verrichting omschrijft die vastgelegd wordt met een verrichtingencode uit de zorgactiviteitentabel (zie codeadvies 21-12).

#### Voorbeeld 11

Opname voor BCG-spoeling vanwege een in situ carcinoom van de blaas, aanvullend op een transurethrale resectie van de tumor

Hoofddiagnose D09.0 'Carcinoma in situ van blaas'

→ Ongeacht of na de TUR-blaas nog in situ weefsel aanwezig is, wordt het in situ carcinoom vastgelegd. De BCG-spoeling is immers een verdere behandeling van het gediagnostiseerde in situ carcinoom.

#### Voorbeeld 12

Opname voor verwijderen verblijfskatheter na radicale prostatectomie i.v.m. prostaatcarcinoom

Hoofddiagnose C61 'prostaatcarcinoom'

→ Omdat het verwijderen van de katheter plaatsvindt in het behandelingstraject van het prostaatcarcinoom wordt het carcinoom als hoofddiagnose geregistreerd. Bovendien geldt voor verrichtingen zoals het verwijderen van een katheter, codeadvies 21-12 'Z-codes voor verrichtingen in de LBZ'.

NB Z51.- (voor bijvoorbeeld chemotherapie) hoeft niet als aanvullende code vastgelegd te worden als er ook een verrichtingencode uit de zorgactiviteitentabel (ZA-code) met dezelfde betekenis is vastgelegd (zie codeadvies 21-12).

Z90.- is beschikbaar om desgewenst de verworven afwezigheid van een orgaan aanvullend vast te leggen.

## 2-5 Doorgroei van maligne neoplasma

---

ingangsdatum: 01-01-2015

vervangt: CvZ aca 20.4

### Vraag

Hoe wordt de doorgroei/ingroei van een tumor in aangrenzende organen en weefsels gecodeerd?

### Advies

Codeer doorgroei als secundaire lokalisatie met een code uit de range C76-C79.

### Toelichting

Wanneer een tumor doorgroeit (ingroeit) in een aangrenzend orgaan of weefsel wordt dit binnen de ICD-10 als secundaire lokalisatie van de primaire tumor beschouwd.

Een secundaire lokalisatie kan hematogeen, lymfogeen of 'per continuitatem' (invasie, infiltratie, doorgroei) tot stand komen; voor de codering maakt dit geen verschil.

In de alfabetische lijst (hoofdingang Neoplasma) omvat de term 'Metastatisch' in de kolom 'Maligne' zowel metastasen op afstand als secundaire lokalisaties.

Zie ook de aanwijzing in deel 1 bij blok C76-C79; Secundair omvat metastase en doorgroei.

### Voorbeeld

Doorgroei van uteruscarcinoom in de blaas  
C55 + C79.1 (+ eventueel M8010/3)

## 2-6 Marginale zone lymfoom

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Met welke code wordt een marginale zone lymfoom vastgelegd?

### Advies

Er zijn 3 belangrijke soorten marginale zone lymfomen

1. MALT lymfoom

Codeer dit lymfoom met C88.4 & eventueel M9699/3

Toelichting: MALT "Mucosa associated lymphoid tissue" (MALT) of extranodale marginale zone B-cel lymfomen, beginnen op andere plaatsen dan de lymfeklieren.

Lokalisaties zijn maag, longen, huid, schildklier, speekselklieren, en weefsels rond het oog. Dit lymfoom wordt gecodeerd met code C88.4 'Extranodaal B-cellymfoom, van marginale zone, van slijmvliesgeassocieerd lymfoïd weefsel [MALT-lymfoom]' + als het ziekenhuis de morfologiecode registreert, aanvullend M9699/3 'Marginale zone B-cellymfoom, NNO'

2. Nodaal marginale zone B-cel lymfoom

Codeer dit lymfoom met C83.0 & eventueel M9699/3

Toelichting: Bij dit type lymfoom zijn vooral de lymfeklieren betrokken. Lymfoomcellen worden echter soms ook gevonden in het beenmerg. Dit lymfoom wordt gecodeerd met code C83.0 'Kleincellig B-cel-lymfoom' + als het ziekenhuis de morfologiecode registreert, aanvullend M9699/3 'Marginale zone lymfoom NNO'.

3. Milt-marginale zone B-cel lymfoom

Codeer dit lymfoom met C83.0 & eventueel M9689/3

Toelichting: Dit lymfoom wordt gecodeerd met code C83.0 'Kleincellig B-cel-lymfoom' + als het ziekenhuis de morfologiecode registreert, aanvullend M9689/3 'Splenisch marginale zone B-cellymfoom' (zoekpad ICD-O-3: Lymfoom, marginale zone, splenisch).

## 2-7 Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie

---

ingangsdatum: 01-01-2016 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-01-2022

vervangt: CvZ aca 16.3

### Vraag

Welke aandoeningen worden als carcinoom in situ gecodeerd?

### Advies

Codeer de volgende aandoeningen als carcinoma in situ, naar lokalisatie (codes D00 t/m D09, & eventueel morfologiecode uit de ICD-O-3):

- carcinoma in situ
- niet-infiltrerend carcinoom
- niet-invasief carcinoom
- carcinoom zonder infiltratie
- intraepitheliaal carcinoom
- intraepidermaal carcinoom
- hooggradige dysplasie

### Voorbeeld

Hooggradige dysplasie van de prostaat  
D07.5 'Carcinoma in situ van prostaat'  
& eventueel  
M8010/2 'Carcinoma in situ, NNO'

### Toelichting

Het PA-verslag zal uitsluitsel geven over het al dan niet infiltrerend/invasief zijn van de tumor. Als de tumor één van de omschrijvingen uit het advies bevat, wordt dit gecodeerd als carcinoom in situ.

Let speciaal op bij:

- Darm-adenoom/poliep: als het een hooggradige dysplasie betreft moet dit als een carcinoom in situ gecodeerd worden.

NB Blaascarcinomen: de specialist omschrijft dit doorgaans als blaascarcinoom terwijl uit de PA-uitslag kan blijken dat het om een niet-invasieve tumor gaat en die moet worden gecodeerd als een carcinoom in situ. Raadpleeg voor de codering van het tumorgedrag bij blaastumoren advies 2-15

## 2-8 Lymfangitis-, peritonitis- en pleuritis carcinomatosa

---

ingangsdatum: 01-01-2016 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 1.4, 1.5 en 7.1

### Vraag

Hoe worden lymfangitis-, peritonitis-, en pleuritis carcinomatosa gecodeerd?

### Advies

Lymfangitis carcinomatosa

C79.8 'Secundaire maligne neoplasma van overige gespecificeerde lokalisaties'  
&

C77.9 'Secundair en niet gespecificeerde maligne neoplasma van lymfeklier, niet gespecificeerd' (indien lokalisatie gespecificeerd C77.0-C77.8)

Peritonitis carcinomatosa

C78.6 'Secundair maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum'

Pleuritis carcinomatosa

C78.2 'Secundair maligne neoplasma van pleura'

Codeer bovenstaande ziektebeelden eventueel aanvullend met de desbetreffende morfologie van de primaire tumor.

### **Toelichting**

Lymfangitis carcinomatosa is een zwelling van de lymfevaten door uitzaaiing van kankercellen, deze cellen kunnen de lymfevaten ook verstoppen. Men mag echter aannemen dat ook de lymfklieren zijn aangedaan.

Alfabetische lijst:

Neoplasma, maligne, metastatisch

Lymfe, vat C79.8

Lymfe, klier C77.9

De diagnose 'peritonitis carcinomatosa' houdt in: carcinoommetastasen in het peritoneum. Het betreft hier eigenlijk geen ontsteking van het peritoneum, maar de term peritonitis wordt nu eenmaal in dit verband gebruikt.

Alfabetische lijst:

Carcinomatose, peritoneum C78.6

De diagnose 'pleuritis carcinomatosa' impliceert carcinoommetastasen in de pleura. Het betreft hier eigenlijk geen ontsteking in de pleura, maar de term pleuritis wordt nu eenmaal in dit verband gebruikt.

Alfabetische lijst:

Neoplasma, maligne, metastatisch

Pleura C78.2

NB 1 Bovenstaande systematiek wordt ook toegepast bij de codering van meningitis- en pericarditis carcinomatosa.

NB 2 Secundaire lokalisaties van maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel worden niet gecodeerd (zie codeadvies 2-12)

NB 3 Zie codeadvies 2-14 voor mastitis carcinomatosa.

## **2-9 Symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit**

---

ingangsdatum: 01-04-2016 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Codeer je symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit?

### **Advies**

Als het symptoom of de aandoening wordt vermeld als reden van behandeling of onderzoek kan deze aanvullend worden gecodeerd. De maligniteit is de oorzaak van het optredende symptoom of aandoening, en derhalve hoofddiagnose. Symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit mogen dus alleen als nevendiagnose worden vastgelegd.

### **Toelichting**

Symptomen (R00-R69) die deel uit maken van een ziekteproces worden niet gecodeerd als nevendiagnose, tenzij het symptoom op zich zelf extra zorg behoeft.

Voorbeelden:

1. Buikpijn bij peritonitis carcinomatosa.

- Codeer C78.6 'secundair maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum'
- 2. Ascitespunctie bij peritonitis carcinomatosa  
Codeer C78.6 'secundair maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum' + R18 'ascites' (maligne ascites is weliswaar inclusief bij C78.6 maar door R18 toe te voegen maak je onderscheid tussen C78.6 met en C78.6 zonder ascites)
- 3. Algehele malaise bij maagcarcinoom  
Codeer C16.9 'maligne neoplasma van maag, niet-gespecificeerd'
- 4. Braken bij oesofaguscarcinoom waarvoor plaatsen voedingssonde  
Codeer C15.9 'maligne neoplasma van oesofagus, niet-gespecificeerd' + R11 'misselijkheid en braken'
- 5. Dyspnoe bij longmetastase  
Codeer C78.0 'secundair maligne neoplasma van long'

Aandoeningen die deel uit maken van een ziekteproces worden veelal wel als nevendiagnosen gecodeerd omdat zij over het algemeen extra zorg behoeven.

Voorbeelden:

- 6. Epileptisch insult door hersenmetastase  
Codeer C79.3 'secundair maligne neoplasma van hersenen en hersenvliezen' + G40.9 'epilepsie, niet-gespecificeerd'
- 7. Ileus op basis van obstruerend ovarium carcinoom  
Codeer C56 'maligne neoplasma van ovarium' + K56.6 'overige en niet-gespecificeerde darmobstructie'
- 8. Dwarvlaesie op basis van wervelmetastase  
Codeer C79.5 'secundair maligne neoplasma van bot en beenmerg' + G99.2\* 'myelopathie bij elders geclassificeerde ziekten'

NB Als het symptoom/aandoening niet een direct gevolg is van de maligniteit maar van de oncologische behandeling, kan het symptoom wel hoofddiagnose zijn.

Voorbeelden:

- 9. Misselijkheid en braken door cytostatica vanwege Hodgkin lymfoom  
Codeer R11 misselijkheid en braken' + Y43.3 'ongewenst gevolg antineoplastisch-geneesmiddel' + C81.9 'Hodgkin-lymfoom, niet-gespecificeerd' (+ evt. M-code).
- 10. Obstipatie door morfine als pijnstilling bij pancreascarcinoom  
Codeer K59.0 'constipatie' + Y45.0 'ongewenst gevolg opioïde en verwante analgetica' + C25.9 'maligne neoplasma pancreas, niet-gespecificeerd'

Let op: Zie voor het coderen van de volgorde etiologie en manifestatie, bij overige aandoeningen codeadvies 0-16.

## 2-10 Meerdere onafhankelijk gelokaliseerde primaire maligne tumoren in één orgaan

---

ingangsdatum: 01-04-2018 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je meerdere onafhankelijk gelokaliseerde primaire maligne tumoren in één orgaan (één drie-tekencategorie binnen C00-C76)?

### Advies

Codeer de overheersende/meest zware tumor als primaire diagnose. Indien deze onbekend is, selecteer dan de eerstgenoemde tumor als primaire diagnose.

Indien er maar één code is om alle lokalisaties te beschrijven, beperk je dan tot het éénmalig registreren van deze code. Uitzondering hierbij geldt voor dubbelzijdige tumoren in extremiteiten en dubbelzijdige organen; registreer dan altijd tweemaal dezelfde code.

Code C97 'Maligne neoplasmata van onafhankelijke multipole (primaire) lokalisatie' wordt niet gebruikt bij meerdere tumoren in één (dubbelzijdig) orgaan (zie ook advies 2-1).

### **Voorbeelden**

Kleincellig longcarcinoom, onafhankelijk in de bovenkwab en de onderkwab van de rechter long die beide bestraald worden:

C34.1 + C34.3 + evt. M8041/3

Twee onafhankelijke maligne tumoren in het buitenste bovenkwadrant van de rechter mamma: C50.4 + evt. M-code (als de tumoren een verschillende morfologie hebben, wordt C50.4 evt. gevolgd door twee M-codes)

Melanoom van linker en rechter ooglid: C43.1 + C43.1 + evt. M8720/3

Multifocaal mammacarcinoom in linker boven en linker onderkwadrant van de linker borst: C50.4 + C50.5 + evt. M-code

NB Multifocale en multicentrische tumoren coderen we in de ICD-10 als onafhankelijk gelokaliseerde primaire maligne tumoren

## **2-11 Gebruik van code C77.8**

---

ingangsdatum: 01-07-2018 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Wanneer is code C77.8 'secundaire maligne neoplasmata van lymfeklieren verspreid over meer regio's' van toepassing?

### **Advies**

Code C77.8 gebruik je alleen in onderstaande situaties:

- 1) wanneer de verschillende regio's niet zijn gespecificeerd, of
- 2) als hoofddiagnose bij lymfekliermetastasen in meerdere regio's waarbij niet vaststaat welke lymfekliermetastase overheerst, codeer dan C77.8 als hoofddiagnose en aanvullend de metastasen in de afzonderlijke regio's.

## **2-12 Secundaire lokalisatie van maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (C81-C96)**

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Codeer je een secundaire lokalisatie van een maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel?

### **Advies**

Secundaire lokalisaties van maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel worden niet gecodeerd.

### **Toelichting**

Het is onlogisch en ongebruikelijk om bij hematologische maligniteiten (C81-C96) metastasen te coderen, omdat deze maligne cellen vrij circuleren in het lichaam. Dat in tegenstelling tot de solide tumoren, waarbij de maligne cellen vastzitten in weefsel. Deze maligne cellen kunnen zich losmaken van het weefsel en zich vervolgens via bloed of lymfe door het lichaam verspreiden; dan spreekt men van metastasen.

### **Voorbeelden**

1. Leptomeningeale metastasen bij multipel myeloom: C90.0 (+ evt. M9732/3)
2. Pleuritis carcinomatosa bij maligne lymfoom: C85.9 (+ evt. M-code) + J91\* 'vochtophoping in pleuraholte bij elders geclassificeerde aandoeningen'

## **2-13 Recidief carcinoom**

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 9.2

### **Vraag**

Hoe codeer je een recidief carcinoom?

### **Advies**

Ga bij de term 'recidief carcinoom' na of het:

1. een nieuw primair carcinoom van de oorspronkelijke lokalisatie betreft: codeer dan de primaire carcinoomlokalisatie opnieuw en aanvullend een code uit Z85.- om de tumor uit de anamnese aan te geven.  
of
2. er sprake is van een metastase van de eerdere primaire tumor: codeer dan de metastase en aanvullend een code uit Z85.- om de tumor uit de anamnese aan te geven.

Een recidief carcinoom (NNO) waarvan niet te achterhalen is of het een nieuwe primaire tumor of een metastase betreft codeer je als 1: de primaire carcinoomlokalisatie opnieuw en aanvullend een code uit Z85.

### **Voorbeelden**

1. Recidief prostaatcarcinoom in de wervelkolom na prostatectomie: codeer C79.5 (+ eventueel morfologiecode) + Z85.4
2. Recidief niercelcarcinoom in de nierloge na nefrectomie. De specialist geeft hierbij aan dat het een metastase in de nierloge betreft. De nierloge ligt in de retroperitonele ruimte: codeer C78.6 (+ eventueel M8312/3) + Z85.5
3. Recidief niercelcarcinoom NNO in de nierloge na nefrectomie: codeer C64 (+eventueel M8312/3) + Z85.5
4. Recidief ovariumcarcinoom NNO: codeer C56 (+ eventueel morfologiecode) + Z85.4

## 2-14 Mastitis carcinomatosa

---

ingangsdatum: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt mastitis carcinomatosa gecodeerd?

### Advies

Mastitis carcinomatosa wordt gecodeerd met C50.- 'maligne neoplasmata van mamma'.

### Toelichting

Mastitis carcinomatosa is een zeer snel groeiend mammacarcinoom met vooral uitbreiding in de huid, waardoor deze verdikt en rood verkleurt; lijkt daardoor op een acute mastitis. (bron Pinkhof)

NB. Het betreft hier een primaire tumor, en geen secundaire maligniteit zoals beschreven wordt in codeadvies 2-8 Lymfangitis-, peritonitis-, en pleuritis carcinomatosa.

**NIEUW**

## 2-15 Codering tumorgedrag bij blaastumoren

---

ingangsdatum: 01-01-2022 of zo mogelijk eerder

### Vraag:

Wanneer codeer je een niet-invasief/in situ blaascarcinoom (D09.0 + eventueel M----/2) en wanneer codeer je een invasief blaascarcinoom (C67.- + eventueel M----/3)?

### Advies:

Naast de conclusie in de ontslagbrief kan je de voor de codering van het tumorgedrag o.a. de T uit de TNM-indeling gebruiken. Hieronder wordt duidelijk gemaakt wanneer je een blaastumor als in situ of als invasief codeert.

#### Ta en Tis

Codeer als niet-invasief/in situ met D09.0 + eventueel M----/2

#### Inclusies:

- oppervlakkige tumor, groeit alleen in het slijmvliesoppervlak (urotheel)
- geen invasie/binnendringen/doorgroei in basaalmembraan/subepitheliaal bindweefsel

#### T1 t/m T4

Codeer als invasief met C67.- + eventueel M----/3

#### Inclusies:

Invadering/binnendringen/doorgroei in één of meer van de volgende lagen/weefsels

- basaalmembraan
- lamina propria
- subepitheliale bindweefsel (submucosa)
- musculus detrusor / spierweefsel (spierinvasief)
- perivesicaal vetweefsel
- aangrenzende organen en weefsels buiten de blaas, zoals prostaat, uterus, vagina, bekkenwand, buikwand (als secundaire lokalisatie aanvullend aan C67.- coderen)

Op [deze website](#) vindt u een afbeelding van de blaas met de verschillende tumorstadia.

### 3-1 Postoperatieve afwezigheid milt

---

ingangsdatum: 01-03-2013

#### Vraag

Hoe wordt een postoperatief afwezige milt gecodeerd?

#### Advies

Codeer D73.0 Hyposplenie (Asplenie, na operatie) + Z90.8 (Verworven afwezigheid van overige organen).

### 3-3 Doorgeschoten antistolling

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-01-2015

vervangt: CvZ aca 9.1

#### Vraag

Hoe wordt doorgeschoten antistolling (met en zonder bloeding) gecodeerd?

#### Advies

Codeer doorgeschoten antistolling:

- zonder bloeding met D68.8 'Overige gespecificeerde stollingsstoornissen' + Y44.2 'Ongewenst gevolg Anticoagulantia'
- met bloeding NNO met D68.3 'Hemorragische aandoening door circulerende anticoagulantia' (waaronder een bloeding tijdens langdurig gebruik van anticoagulantia valt) + Y44.2 'Ongewenst gevolg Anticoagulantia'
- met een gespecificeerde bloeding met D68.3 'Hemorragische aandoening door circulerende anticoagulantia' (waaronder een bloeding tijdens langdurig gebruik van anticoagulantia valt) + Y44.2 'Ongewenst gevolg Anticoagulantia' + aanvullend de bloeding.

*Bijvoorbeeld*

Hematurie door doorgeschoten antistolling: D68.3 + Y44.2 + R31

Codeer hematoom bij antistolling zonder dat er een relatie is gelegd tussen het hematoom en de antistolling met R58 'Bloeding, niet elders geclassificeerd' + Z92.1 'Persoonlijke anamnese met langdurig (actueel) gebruik van anticoagulantia'

### 3-4 Macrocytaire anemie zonder foliumzuurdeficiëntie

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

#### Vraag

Hoe codeer je macrocytaire anemie zonder dat er sprake is van foliumzuurdeficiëntie?

#### Advies

Macrocytaire anemie zonder dat er sprake is van foliumzuurdeficiëntie codeer je met D64.8 'overige gespecificeerde anemieën'.

Macrocytaire anemie NNO wordt gecodeerd met D52.9 'anemie door foliumzuurdeficiëntie, niet gespecificeerd'.

### 3-5 Trombocytose/trombocytemie NNO

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

#### **Vraag**

Hoe codeer je trombocytose/trombocytemie NNO?

#### **Advies**

Trombocytose/trombocytemie NNO wordt gecodeerd met D69.8 'overige gespecificeerde hemorragische aandoeningen'.

D47.3 'essentiële (hemorragische-) trombocytemie' wordt alleen vastgelegd indien er sprake is van een essentiële trombocytose/trombocytemie.

### 3-6 Anemie door cytostatica

---

ingangsdatum: 01-10-2021 of zo mogelijk eerder

#### **Vraag**

Hoe wordt anemie door cytostatica gecodeerd?

#### **Advies**

Codeer het type anemie zo specifiek mogelijk met aanvullend code Y43.1, Y43.2 of Y43.3 om het ongewenste effect van een antineoplastisch middel aan te geven.

Codeer anemie NNO door cytostatica met code D61.1 'door geneesmiddelen geïnduceerde aplastische anemie' + Y43.3.

#### **Toelichting**

Bij voorkeur wordt het type anemie zo specifiek mogelijk vastgelegd maar als dat niet is gegeven dan codeer je het als een aplastische anemie. Een anemie door cytostatica is namelijk meestal aplastisch omdat cytostatica de groei van cellen (tijdelijk) remt/tegengaat.

#### **Voorbeeld**

Hemolytische anemie door chemotherapie: D59.2 'door geneesmiddelen geïnduceerde niet-auto-immune hemolytische anemie' + Y43.3

### 3-7 Anemie bij neoplasma (C00-D48)

---

ingangsdatum: 01-04-2021 of zo mogelijk eerder

#### **Vraag**

Hoe wordt anemie bij een neoplasma gecodeerd?

#### **Advies**

Anemie bij een neoplasma wordt gecodeerd met code D63.0\* 'anemie in kader van neoplasma (C00-D48)' aanvullend op de code voor het neoplasma. Indien bekend kan het type anemie aanvullend worden gecodeerd.

Exclusie: Anemie door cytostatica, zie advies 3-6

### **Toelichting**

Anemie komt bij oncologische patiënten veel voor. Oorzaken kunnen zijn: remming van het beenmerg door chemo- of radiotherapie, verdringing door tumorcellen of bloedverlies bij tumoren in het maag-darmkanaal. Ook op andere manieren kan een ziekte als kanker leiden tot bloedarmoede (bron NTvG).

Een anemie bij een maligniteit, waarbij geen andere aandoeningen zijn vermeld en/of een relatie tot de chemotherapie wordt verondersteld, beschouwen we voor de codering als een anemie in het kader van een neoplasma.

### **Voorbeelden**

1. acute anemie door gastro-intestinale bloeding bij een maagcarcinoom: C16.9 + D63.0\* + D62 + K92.2
2. anemie door hematurie door een blaascarcinoom: C67.9 + D63.0\* + D50.0 + R31
3. anemie bij ziekte van Kahler: C90.0 + D63.0\*
4. aplastische anemie bij coloncarcinoom: C18.9 + D63.0\* + D61.9 aplastische anemie', niet-gespecificeerd'

## **4-1 Ontregelde diabetes**

---

ingangsdatum: 01-03-2013

mutatiedatum: 01-04-2016

vervangt: CvZ aca 9.1

### **Vraag**

Hoe wordt ontregelde diabetes mellitus gecodeerd?

### **Advies**

1. Codeer een ontregelde DM NNO (zonder complicaties) met E10-E14 en vierde teken .9 (zonder complicaties')
2. Codeer een hyperglykemische ontregelde DM NNO (zonder complicaties) met E10-E14 en vierde teken .9 'zonder complicaties'+ aanvullend R73.9 'hyperglykemie, niet gespecificeerd'
3. Codeer een hypoglykemische ontregelde DM NNO (zonder complicaties) met E16.0, E16.1 of E16.2 'hypoglykemie ..... ' + aanvullend E10-E14 en vierde teken .9 'zonder complicaties'

### **Toelichting**

Bij de vierde tekens gaat het om orgaanschade. Bij ontregeling van de diabetes is daarvan nog geen sprake, daarom .9.

Als er naast de ontregeling sprake is van een complicatie wordt het vierde teken van de betreffende complicatie vastgelegd. De ontregeling is, net als bij een ongecompliceerde DM, ook hier niet specifiek vast te leggen.

### **Voorbeelden**

1. Hyperglykemie bij DM type 1  
E10.9 + R73.9
2. Hypoglykemie bij DM type 2 door het per ongeluk innemen van een te hoge dosering insuline  
T38.3 + X44.- - + E16.0 + E11.9

Zoekpad: Hypoglykemie  
-door  
- -insuline  
- -therapeutisch ongeluk T38.3

3. Ontregelde DM type 2 met diabetische nefropathie  
E11.2† + N08.3\*

## 4-2 Diabetische voet

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Vraag

Hoe wordt een diabetische voet gecodeerd?

### Advies

Hier is niet één advies over te geven. Ga na per casus of er bijvoorbeeld sprake is van een ulcus, van vaatlijden of van osteomyelitis. Diabetes is het onderliggend lijden, codeer de diabetes daarom als de hoofddiagnose.

## 4-3 Mitochondriële encefalopathie

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe wordt mitochondriële encefalopathie gecodeerd?

### Advies

Mitochondriële encefalopathie is een stofwisselingsstoornis. Codeer deze aandoening met E88.9 "Stofwisselingsstoornis niet gespecificeerd" + G93.4 "Encefalopathie, niet gespecificeerd" + evt. Q04.9 "Congenitale misvorming van hersenen, niet gespecificeerd"

## 4-4 Refeeding syndroom

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe wordt het refeeding syndroom gecodeerd?

### Advies

Codeer bij het refeeding syndroom de hypofosfatemie indien mogelijk als hoofd/primaire diagnose. Codeer aanvullend de overige klinische verschijnselen en de oorzaak (bijv. de ondervoeding).

### Toelichting

Refeeding syndroom

Hiermee wordt bedoeld het brede scala aan complicaties dat kan ontstaan als gevolg van metabole en functionele veranderingen door start van dieetinterventie bij patiënten met klinische depletie / ernstig ondervoeding. Klinische verschijnselen, met name: hypofosfatemie,

hypokaliëmie en hypomagnesiëmie, glucose-intolerantie, manifest worden van thiamine (B1)deficiëntie, verminderde orgaanfunctie en overvulling.  
Voor de behandeling van het refeeding syndroom zal in de praktijk meestal de hypofosfatemie het grootste probleem zijn.

## 4-5 Type 2-diabetes met insulinebehandeling

---

ingangsdatum: 01-04-2016 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt een type 2-diabetes met insulinebehandeling gecodeerd?

### Advies

Codeer type 2-diabetes met insulinebehandeling met code E11.- 'type 2-diabetes'

### Toelichting

Patiënten met type 2-diabetes worden wel eens met insuline behandeld. Soms worden ze dan ook insuline-afhankelijk genoemd maar hebben toch een type 2-diabetes (NIDDM).  
Voor insulinebehandeling kan worden gekozen als orale medicatie en dieet onvoldoende zijn. Insulinebehandeling bij type 2 wordt o.a. toegepast ter voorkoming van complicaties.

Verschillen tussen DM type 1 en DM type 2.

- DM type 1 :  
insuline-afhankelijk (afgekort IDDM = insulin dependent diabetes mellitus), de alvleesklier kan slechts weinig insuline produceren: er is een absoluut gebrek aan insuline. Type 1 treft vooral jonge mensen, maar kan ook pas op hogere leeftijd ontstaan. Coderen met E10.-

- DM type 2:  
niet-insuline-afhankelijk (afgekort NIDDM = non-insulin dependent diabetes mellitus). De alvleesklier kan wel insuline produceren, maar reageert onvoldoende op een hoge bloedsuiker waardoor te weinig insuline geproduceerd wordt om aan de vraag te voldoen: er is een relatief tekort aan insuline. Deze vorm komt veel frequenter voor en ontstaat meestal na het 40e levensjaar. Het ontstaan van deze vorm wijkt af van type 1.  
Patiënten met type 2 worden wel eens met insuline behandeld. Soms worden ze dan ook insuline-afhankelijk genoemd maar hebben toch een type 2-diabetes (NIDDM).  
Coderen met E11.-

## 4-6 Hyperosmolaire hyperglykemische ontregelde diabetes mellitus

---

ingangsdatum: 01-07-2018 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een hyperosmolaire hyperglykemische ontregelde diabetes mellitus?

### Advies

Een hyperosmolaire hyperglykemische ontregelde diabetes mellitus codeer je met een code uit de reeks E10-E14 met als vierde teken .9 als er geen sprake van coma is, en .0 als er wel sprake van coma is. Aanvullend codeer je E87.0 voor de hyperosmolariteit en R73.9 voor de hyperglykaemie.

## 5-1 Acute alcoholintoxicatie/ comazuipen

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Vraag

Hoe wordt een acute alcoholintoxicatie of 'comazuipen' gecodeerd?

Informatie:

De exclusies bij code T51.0 (Toxisch gevolg van alcohol, Ethanol) zijn hierbij leidend:

Exclusies: acute alcoholintoxicatie of 'kater' (F10.0)  
dronkenschap (F10.0)  
pathologische alcoholintoxicatie (F10.0)

### Advies

Codeer voor acute alcoholintoxicatie F10.0 (Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van alcohol, acute intoxicatie).

Codeer aanvullend evt. R40.2 (Coma, niet gespecificeerd).

Codeer aanvullend evt. R68.0 (Hypothermie, niet verband houdend met lage omgevingstemperatuur).

## 5-3 Roken

---

ingangsdatum: 01-09-2014

### Vraag

Hoe wordt roken vastgelegd?

### Advies

Er zijn 2 codes die relevant zijn om vast te leggen in de LBZ: F17.1 en F17.2.

Als roken vermeld wordt bij de te behandelen aandoening: F17.1 "Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak, schadelijk gebruik". Tabaksgebruik is immers altijd schadelijk voor jezelf en anderen.

Als de behandeling in het kader van de verslaving staat: F17.2 "Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak, afhankelijkheidssyndroom"

Een voorbeeld hiervan is de "stoppen met roken poli". Deze behandeling zal in de ziekenhuizen niet klinisch of in dagverpleging plaatsvinden, maar is wél relevant voor het vastleggen van de ambulante patiënten binnen de LBZ.

## 5-4 Psychomotore retardatie

---

ingangsdatum: 01-01-2015

### Vraag

Hoe codeer je psychomotore retardatie?

### Advies

Psychomotore retardatie is een achtergebleven ontwikkeling van zowel de geestelijke als van de motorische vermogens. Codeer psychomotore retardatie NNO met code F83 "Gemengde specifieke ontwikkelingsstoornissen".

MUTATIE

## 5-5 GHB-intoxicatie

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-01-2022 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt een GHB-intoxicatie gecodeerd?

### Advies

Codeer een intoxicatie met de (party)drug GHB afhankelijk van de situatie:

- Door eigen toedoen: code F19.0 'Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door meervoudig-druggebruik en gebruik van andere psychoactieve middelen; Acute intoxicatie'
- Door toedoen van een andere persoon waardoor iemand bewust is gedrogeerd: code F19.0 en aanvullend X89.-- 'Geweldpleging door overige gespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen'

GHB wordt ook als geneesmiddel (gammahydroxyboterzuur) tegen narcolepsie voorgeschreven. Codeer daarom een intoxicatie met GHB gebruikt als geneesmiddel met code T41.2 en aanvullend X44.-- bij een onopzettelijke intoxicatie, of X64.-- bij een opzettelijke intoxicatie.

## 5-6 Schadelijke gevolgen van lachgas (recreatief gebruik)

---

ingangsdatum: 01-10-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe worden de schadelijke gevolgen van lachgas gecodeerd?

### Advies

Schadelijke gevolgen van lachgas worden als volgt gecodeerd:

- codeer de betreffende aandoening(en) en aanvullend X44. - - 'onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen' en F19.1 voor het schadelijke gebruik van een psychoactief middel
- als de inname van lachgas tot een ongeval heeft geleid, codeer dan F19.0 aanvullend aan het letsel en de code voor de uitwendige oorzaak  
Het vierde teken '0' bij code F19, geeft aan dat door de acute intoxicatie van het lachgas een trauma is ontstaan
- codeer bij een verslaving code F19.2 'psychische stoornissen en gedragsstoornissen door meervoudig-druggebruik en gebruik van andere psychoactieve-middelen, afhankelijkheidssyndroom'

Voorbeelden:

1. Dwarslaesie door vitamine B12-deficiëntie door gebruik van lachgas  
G95.8 'overige gespecificeerde ziekten van ruggenmerg' + E53.8 'deficiëntie van overige gespecificeerde vitaminen van B-groep' + X44.99 'onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen' + F19.1
2. Zygomafractuur na val van de fiets na gebruik van lachgas.  
S02.40 'fractuur van os zygomaticum en maxilla' + V18.49 'wielrijder gewond bij vervoersongeval zonder botsing' + F19.0

## 6-2 Occipitalis neuralgie

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe codeer je nervus occipitalis neuralgie?

### Advies

Codeer nervus occipitalis neuralgie met G58.8 "Overig gespecificeerde mononeuropathieën"

Zoekpad:

Neuralgie M79.2: Exclusie: mononeuropathieën (G56-G58)

G58.8 "Overig gespecificeerde mononeuropathieën"

## 6-4 ICU acquired weakness

---

ingangsdatum: 01-04-2018

### Vraag

Hoe codeer je ICU acquired weakness?

### Advies

Codeer ICU acquired weakness als polyneuropathie en polymyopathie. Codeer aanvullend Y95 'Door verblijf in ziekenhuis veroorzaakte aandoening'.

### Voorbeeld

ICU acquired weakness niet nader omschreven:

G62.9 'Polyneuropathie, niet gespecificeerd'

G72.9 'Myopathie, niet gespecificeerd'

Y95 'Door verblijf in ziekenhuis veroorzaakte aandoening'

### Toelichting

ICU acquired weakness (ICU-AW) is een gevolg van langdurige immobiliteit en diepe sedatie die veel ernstig zieke intensievezorgpatiënten meemaken. Een andere benaming voor ICU-AW is critical illness polyneuromyopathie.

NB Omdat ICU-AW meestal gedurende de ziekenhuisopname ontstaat registreer je de diagnosecodes met de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname.

## 6-5 Rib-tip syndroom

---

ingangsdatum: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt het rib-tip syndroom gecodeerd?

### Advies

Het rib-tip syndroom is een inklemming van de intercostale zenuw en wordt gecodeerd met code G58.0 'Intercostale neuropathie'.

## 6-6 Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)

---

ingangsdatum: 01-07-2020 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-10-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) gecodeerd?

### Advies

ACNES wordt gecodeerd met G58.0 'intercostale neuropathie'.

### Toelichting

ACNES is de afkorting van Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Dit is de benaming voor buikpijn, of eigenlijk buikwandpijnsyndroom, dat ontstaat door beknelling (entrapment) van de huid (cutane) takjes van de voorste (anterieure) tussenribzenuwuiteinden, welke door de buikspieren heen naar de huid gaan.

## 7-1 Seniel cataract

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Vraag

Zijn er internationale richtlijnen voor leeftijdsgrenzen zoals bijvoorbeeld bij seniel cataract?

### Advies

Er zijn geen internationale richtlijnen. Codeer alleen als de specialist dit aangeeft.

## 9-1 Postoperatief atriumfibrilleren

---

ingangsdatum: 01-03-2013

mutatiedatum: 01-08-2015

### Vraag

Hoe wordt de diagnose 'Postoperatief atriumfibrilleren' gecodeerd?

### Advies

Zie codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling!

Codeer postoperatief atriumfibrilleren alleen als complicatie van de operatie als er een direct oorzaak en gevolg relatie met de operatie is.

- Codeer na een hartoperatie I97.1 'Overige functionele stoornissen na hartchirurgie' + Y83.- 'Operatie en overige heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting' + I48.- 'Atriumfibrillatie en - flutter'
- Codeer na een operatie van iets anders dan het hart I97.8 'Overige gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichting, niet elders geassocieerd' + Y83.- + I48.-
- Als de oorzaak-gevolg relatie tussen het atriumfibrilleren en de operatie niet is gelegd of niet duidelijk is, codeer dan alleen I48.-.

Als het atriumfibrilleren tijdens de opname ontstaat worden I97.- en I48.- vooraf gegaan door de aanduiding 'NAS' voor aandoening niet aanwezig bij start opname.

### 9-3 Rechtsdecompensatie en cardiomyopathie

---

ingangsdatum: 01-03-2013

#### **Vraag**

Een patiënt heeft cardiomyopathie en rechtsdecompensatie. Moeten cardiomyopathie en rechtsdecompensatie beide worden gecodeerd?

#### **Advies**

Ja, codeer I42.0 + I50.0 (Cardiomyopathie met hartdilatatie + Rechtsdecompensatie).  
Zie voor het coderen van de volgorde codeadvies 0-16 'Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie'.

### 9-4 Idiopathische pulmonale hypertensie

---

ingangsdatum: 01-03-2013

#### **Vraag**

Hoe wordt idiopathische pulmonale hypertensie gecodeerd?

#### **Advies**

Codeer I27.0 (Primaire pulmonale hypertensie).

### 9-5 STEMI/non-STEMI

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
vervangt: CvZ advies nieuwsbrief 5-1998

#### **Vraag**

Hoe wordt een ST segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) en hoe wordt een non-STEMI gecodeerd?

#### **Advies**

Codeer een STEMI als een acuut transmuraal myocardinfarct met een code uit de reeks I21.0 – I21.3.

Codeer een non-STEMI als een acuut subendocardiaal myocardinfarct met code I21.4.

### 9-6 Hemorragisch herseninfarct

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-04-2017 of zo mogelijk eerder

#### **Vraag**

Hoe wordt een hemorragisch infarct van de hersenen gecodeerd?

### **Advies**

Een hemorragisch herseninfarct is een type infarct, te coderen met I63.-. Indien er geen informatie is gegeven over de aard van de afsluiting (te specificeren met I63.0 t/m I63.8) codeer dan I63.9.

### **Toelichting**

Een herseninfarct kan worden ingedeeld in een ischemisch (niet-bloedig, wit) en een hemorragisch (bloedig, rood) infarct. Bij een ischemisch infarct is de bloedtoevoer naar het achterliggende hersenweefsel volledig afgesloten door bijvoorbeeld een trombus. Bij een hemorragisch infarct is de bloedtoevoer ook afgesloten, maar kan er nog bloed doorsijpelen naar het achterliggende hersenweefsel, door bijvoorbeeld reperfusie via collaterale vaten of door het oplossen van het embolus.

## 9-7 AV geleidingsstoornis

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### **Vraag**

Hoe wordt een AV-geleidingsstoornis gecodeerd?

### **Advies**

Gebruik 'Dissociatie' als ingang voor het zoekpad.  
Codeer een AV-geleidingsstoornis met I45.8 (Overige gespecificeerde geleidingsstoornissen).

### **Toelichting**

Er is geen direct zoekpad in deel drie voor AV-geleidingsstoornis.

## 9-10 Acut coronair syndroom

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Hoe wordt het acut coronair syndroom gecodeerd?

### **Advies**

Het acut coronair syndroom is een klinisch beeld met pijn op de borst waarbij sterke verdenking bestaat op angina pectoris (instabiel) of (dreigend) myocardinfarct. Geef de specialist een acut coronair syndroom aan, kijk dan in de ontslagdocumentatie of het gaat om één van de bovenstaande aandoeningen.

Indien de ontslagdocumentatie geen uitsluitsel geeft kan worden uitgeweken naar I24.9 (Acute ischemische hartziekte, niet gespecificeerd).

Zoekpad: Syndroom, coronair, acut NEC I24.9

## 9-11 Recidief myocardinfarct

---

ingangsdatum: 15-01-2014

**Vraag**

Tot welke termijn na een acuut myocardinfarct mag je een recidief myocardinfarct coderen?

**Advies**

Codeer alleen een recidief infarct (alle lokalisaties) als dit infarct binnen 4 weken (28 dagen) na het 1e acute infarct plaatsvindt.

Voorbeelden:

1. Patiënt wordt opgenomen met een acuut myocardinfarct en krijgt in dezelfde opname na 3 weken een recidief myocardinfarct: codeer I21.- "Acuut myocardinfarct" als hoofddiagnose en NAS I22.- "Recidief myocardinfarct" als nevensdiagnose.
2. Na behandeling van een acuut myocardinfarct wordt de patiënt na een week ontslagen. Binnen 28 dagen na het ontstaan van het 1e acute myocardinfarct wordt de patiënt weer opgenomen voor een recidief myocardinfarct. Codeer I22.- "Recidief myocardinfarct" als hoofddiagnose.
3. Patiënt is 3 jaar geleden behandeld voor een acuut myocardinfarct. Patiënt heeft nu opnieuw een acuut myocardinfarct. Codeer als hoofddiagnose I21.- "Acuut myocardinfarct" en als nevensdiagnose I25.2 "Vroeger myocardinfarct".

## 9-12 CADASIL

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-01-2017

**Vraag**

Hoe wordt Cerebraal Autosomaal Dominante Arteriopathie met Subcorticale Infarcten en Leukoencefalopathie (CADASIL) gecodeerd?

**Advies**

Dit is een erfelijke aandoening. Codeer I67.3 "progressieve vasculaire leuko-encefalopathie". Als zich dementie heeft ontwikkeld, wordt F01.2 "subcorticale vasculaire dementie" aanvullend gecodeerd.

## 9-13 Minor stroke

---

ingangsdatum: 15-01-2014

**Vraag**

Hoe wordt een minor stroke gecodeerd?

**Advies**

Een minor stroke is een lichte beroerte. Om een minor stroke juist te coderen zal de ontslagdocumentatie moeten worden geraadpleegd. Blijkt uit de documentatie dat er sprake was van een infarct, codeer dan I63.- "Cerebraal infarct". Zijn er geen gegevens te achterhalen uit het EPD, dossier of via de behandelende arts, codeer dan de minor stroke met I64 "beroerte niet gespecificeerd als bloeding of infarct".

## 9-14 Stenose arterie

---

ingangsdatum: 01-09-2014

### **Vraag**

De diagnose stenose arterie femoralis of stenose arterie iliaca komt veel voor. De alfabetische lijst verwijst dan niet verder dan I77.1 "Structuur van arterie". Dit is een algemene code, waarbij de arteriën niet verder gespecificeerd kunnen worden.

### **Advies**

Code I77.1 "Structuur van arterie" is heel verleidelijk in dergelijke gevallen, maar is meestal niet correct. In de praktijk blijkt vaak dat termen als 'claudicatio, perifeer vaatlijden, (niet acute) afsluiting, stenose' gebruikt worden, terwijl een (afsluitende) vorm van arteriosclerose wordt bedoeld. Maak daarom duidelijke afspraken met de specialist omtrent het terminologiegebruik. Verder geeft een radiologieverslag hierin ook vaak uitsluitel. Bij arteriosclerose verwijst de alfabetische lijst naar code I70.- "Atherosclerose". Een acute vaatafsluiting kan optreden wanneer er een trombus ontstaat, de alfabetische lijst verwijst daarbij naar code I74.3 "Embolie en trombose van arteriën van onderste extremiteiten".

## 9-15 Multipele klepaandoeningen

---

ingangsdatum: 01-01-2015

### **Vraag**

Hoe worden verworven afwijkingen van meerdere hartkleppen gecodeerd?

### **Advies**

Verworven aandoeningen van meerdere hartkleppen worden gecodeerd met I08.- 'Multipele klepaandoeningen'.

De afzonderlijke klepaandoeningen kunnen aanvullend gecodeerd worden voor nadere specificatie.

### **Toelichting**

De alfabetische index leidt voor aandoeningen aan meerdere kleppen naar code I08.- 'Multiple klepaandoeningen'.

Bijvoorbeeld:

Aandoening

- klep, valvulair I38
- - multipel (oorzaak niet gespecificeerd) I08.9/8

Hoewel I08 binnen de range I05-I09 'Chronische reumatische hartziekten' valt is code I08 inclusief klepaandoeningen waarvan de oorzaak niet gespecificeerd is.

Alleen bij een gespecificeerde oorzaak van de hartklepaandoening, anders dan reumatisch, wordt verwezen naar I34-I38.

### *Bijvoorbeeld*

Aortaklepinsufficiëntie met mitralisprolaps

I08.0 + I35.1 + I34.1

### *Opmerking*

Als de oorzaak van het kleplijden niet gespecificeerd is vallen deze aandoeningen veelal onder de reumatische klepaandoeningen, bijvoorbeeld mitralisinsufficiëntie met stenose, en tricuspidaalinsufficiëntie. Omdat dit niet altijd terecht zal zijn is het raadzaam om de specialist te vragen aan te geven wat de oorzaak van de hartklepaandoening is. Informeer de specialist

daarbij dat (multipel) kleplijden zonder gespecificeerde oorzaak, binnen de ICD-10 veelal in het blok 'Chronische reumatische hartziekten' valt.

## 9-16 Claudicatio intermittens / Fontaine / PAOD

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 12.4  
mutatiedatum: 01-04-2021

### Vraag

Hoe codeer je perifere arterieel vaatlijden dat wordt aangeduid of ingedeeld als claudicatio intermittens / Fontaine / PAOD?

### Advies

Codeer bij voorkeur de oorzaak van het perifere arterieel vaatlijden:

- door arteriosclerose I70.- 'atherosclerose'
- door trombose I74.- 'arteriële embolie en trombose'
- oorzaak onbekend I73.9 'perifere vaatziekte, niet gespecificeerd'

### Toelichting

Claudicatio intermittens (letterlijk intermitterend hinken) is het gevolg van ischemie van de beenspieren. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door arteriosclerotische vernauwing (in meer dan 90% van de gevallen) of trombotische afsluiting van een beenarterie. Claudicatio intermittens is één van de kenmerkendste symptomen passend bij de diagnose perifere arterieel vaatlijden en dat komt tot uiting in de codering: I73.9 'Perifere vaatziekte, niet gespecificeerd'. Wanneer de oorzaak van de claudicatio bekend is, bijvoorbeeld door arteriografisch onderzoek of P.A.-uitslag bij de operatie aan het bloedvat, wordt de oorzaak gecodeerd. Code I73.9 is dus alleen van toepassing als de oorzaak niet te achterhalen is.

Bij PAOD - peripheral arterial occlusive disease – is er sprake van een afsluiting of vernauwing van een perifere (been)arterie.

### Fontaine

Claudicatio intermittens heeft een indeling in 4 stadia volgens Fontaine, ook vaak als PAOD - peripheral arterial occlusive disease - aangeduid:

- I. asymptomatisch
- II. IIa: maximale loopafstand 100 meter en meer; IIb: maximale loopafstand minder dan 100 meter
- III. ischemische klachten in rust en/of trofische stoornissen
- IV. ulcera of necrose of gangreen

### Voorbeelden

1. Claudicatio intermittens (Fontaine III) op basis van arteriosclerose in linker been: I70.20
2. Claudicatio intermittens (PAOD IV) op basis van arteriosclerose in rechter been met bijkomend gangreen: I70.21
3. Perifere vaatlijden obv PAOD NNO: I73.9
4. Fontaine NNO: I73.9

## 9-18 Stenose van een coronaire stent en van een coronaire bypass (CABG)

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-04-2016

### Vraag

Hoe codeer je stenose van een coronaire stent en van een coronaire bypass (CABG)?

### Advies

1. Stenose van een coronaire stent (in-stent stenose):
  - Stenose ontstaan **binnen** een jaar na het plaatsen van de stent: T82.8 'Overige gespecificeerde complicaties van cardiale en vasculaire prothesen, implantaten en transplantaten' + Y83.1 'Operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel' + I25.1 'Atherosclerotische hartziekte'
  - Stenose ontstaan **na** één jaar na het plaatsen van de stent: I25.1 'Atherosclerotische hartziekte' + Z95.5 'Aanwezigheid van implantaat en transplantaat voor coronaire vaatplastiek'
2. Stenose van een coronaire bypass
  - Stenose ontstaan **binnen** een jaar na de CABG: T82.8 'Overige gespecificeerde complicaties van cardiale en vasculaire prothesen, implantaten en transplantaten' + Y83.2 'Operatie met anastomose, bypass of transplantaat' + I25.1 'Atherosclerotische hartziekte'
  - Stenose ontstaan **na** één jaar na de CABG: I25.1 'Atherosclerotische hartziekte' + Z95.1 'Aanwezigheid van transplantaat voor aortacoronaire bypass'

### Toelichting

Na de plaatsing van een stent of CABG, is het mogelijk dat er opnieuw een vernauwing van de kransslagader optreedt, deze keer in de stent of coronaire bypass. Bij de codering van een (re)stenose wordt onderscheid gemaakt in het ontstaan van stenose **binnen** een jaar na de ingreep en **na** een jaar na de ingreep.

Binnen een jaar na de ingreep wordt het beschouwd als een ongebruikelijke reactie op de stent of de bypass. Na een jaar wordt het beschouwd als het voortzetten van het ziekteproces (de atherosclerose). Deze termijnen zullen niet in alle gevallen opgaan, maar omdat de exacte oorzaak van een stenose vaak moeilijk te achterhalen is, wordt voor dit advies de termijn van een jaar gehanteerd om tot een eenduidige codering te komen.

NB Deze wijze van registreren geldt ook voor andere (niet coronaire) stenose van stents en bypasses. Bijvoorbeeld stenose ontstaan **na** één jaar na het plaatsen van een stent in de arteria femoralis vanwege arteriosclerose: I70.2- 'atherosclerose van arteriën van extremiteiten' + Z95.8 'Aanwezigheid van overige gespecificeerde cardiale- en vasculaire-implantaten en transplantaten' (zie ook codeadvies 9-14 Stenose arterie).

## 9-19 Hoofddiagnose bij out of hospital cardiac arrest (OHCA)

---

ingangsdatum: 01-04-2016 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 06-12-2016 met terugwerkende kracht geldend voor registratiejaar 2016

### Vraag

Wat is de hoofddiagnose als iemand wordt opgenomen na een OHCA?

### Advies

Codeer de geslaagde reanimatie na een out of hospital cardiac arrest (I46.0) als hoofddiagnose (zie voor exclusies de toelichting op dit advies). Aanvullend wordt de aan de hartstilstand ten grondslag liggende aandoening gecodeerd.

### **Toelichting**

Een hartstilstand wordt vaak veroorzaakt door een aandoening van het hart en dan met name een myocardinfarct en/of ventrikelfibrilleren. Deze aandoening(en) wordt aanvullend aan de geslaagde reanimatie vastgelegd.

Met een geslaagde reanimatie wordt bedoeld dat de circulatie weer op gang is gekomen.

*Let op:*

Voor code I46 gelden exclusies:

1. op codeniveau, bijvoorbeeld de exclusie voor hartstilstand als complicatie van abortus,
2. op hoofdstukniveau, bijvoorbeeld de exclusie voor letsels, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken

Dit codeadvies heeft uiteraard alleen betrekking op de aandoeningen die niet bij deze code geëxcludeerd worden. Voor traumapatiënten geldt dus: bij een trauma dat gepaard gaat met een hartstilstand waarvoor succesvol is gereanimeerd, is het trauma de hoofddiagnose. I46.0 kan in dat geval wel aanvullend gecodeerd worden.

Bijvoorbeeld:

OHCA na ventrikelfibrilleren o.b.v. een myocardinfarct:

I46.0 'hartstilstand met geslaagde reanimatie'

+

I21.9 'acuut myocardinfarct, niet gespecificeerd'

+

I49.0 'ventrikelfibrillatie en -flutter'

## 9-20 Hoofddiagnose bij behandeling en nazorg acuut myocardinfarct met coronairsclerose

---

ingangdatum: 01-01-2017 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Patiënten met een acuut myocardinfarct én coronairsclerose ondergaan vaak een PCI of CABG. Meestal vinden er rondom de behandeling overnames en/of heropnames plaats; binnen het eigen ziekenhuis en/of tussen algemene ziekenhuizen en hartcentra. Bij deze op- en overnames is het de vraag welke aandoening als hoofd/primaire- en welke als neventdiagnose moeten worden gecodeerd.

### Advies

De hoofd/primaire diagnose is de reden van opname en kan hier gezien worden als de aandoening waar de behandeling op gericht is:

1. Het acute infarct en/of voorkomen van uitbreiding van het infarct: codeer het acute infarct als hoofddiagnose en de coronairsclerose als neventdiagnose
2. De coronairsclerose: codeer de coronairsclerose als hoofddiagnose en het infarct als neventdiagnose met I21.- (indien nog acuut of met vermelde duur van 28 dagen of minder vanaf begin) of I25.2(indien oud)
3. Overplaatsing voor nazorg na CABG: codeer de nabehandeling als hoofddiagnose (Z48.8) aanvullend de status na CABG met Z95.1 en het infarct met I21.- (indien nog acuut of met vermelde duur van 28 dagen of minder vanaf begin) of I25.2 (indien oud)
4. Overplaatsing na PCI:
  - a. Overplaatsing aansluitend op een PCI die is uitgevoerd bij een acuut infarct: Codeer het acute infarct als hoofddiagnose en aanvullend de status na PCI met Z95.5 (met stent) of Z92.8 (zonder stent)
  - b. Overplaatsing aansluitend op een PCI die is uitgevoerd in een niet acute fase: Codeer de nabehandeling als hoofddiagnose (Z51.8) en aanvullend Z95.5 (met stent) of Z92.8 (zonder stent) en het infarct met I21.- (indien nog acuut of met vermelde duur van 28 dagen of minder vanaf begin) of I25.2 (indien oud)

Behandelde coronairsclerose wordt na overname niet meer aanvullend gecodeerd, behalve als er sprake is van reststenose.

Een myocardinfarct wordt na overname gecodeerd als acuut indien het niet ouder is dan 28 dagen vanaf het begin, ook al heeft behandeling van het infarct plaatsgevonden.

### Voorbeelden

(Alle voorbeelden gaan over patiënten met een acuut myocardinfarct én coronairsclerose)

- a) Een patiënt is voor de acute afsluiting van een coronairvat direct behandeld (acute opname) met een PCI of CABG.  
Hoofddiagnose: acuut myocardinfarct  
Neventdiagnose: coronairsclerose
- b) Een patiënt is bij de eerste opname succesvol behandeld met trombolysen en naar huis ontslagen.  
Een tweede (niet acute) opname volgt een week later, waarbij een PCI of CABG wordt uitgevoerd.  
eerste opname:  
Hoofddiagnose: acuut myocardinfarct  
Neventdiagnose: coronairsclerose

tweede opname:

Hoofddiagnose: coronairsclerose

Nevendiagnose: acuut myocardinfarct (code I21.- want infarct is niet ouder is dan 28 dagen vanaf het begin)

- c) Een patiënt heeft in een hartcentrum met spoed een PCI met stentplaatsing ondergaan en is direct overgedragen naar een algemeen ziekenhuis. Er is na behandeling in het hartcentrum geen reststenose meer aanwezig.

Hartcentrum:

Hoofddiagnose: acuut myocardinfarct

Nevendiagnose: coronairsclerose

Algemeen ziekenhuis

Hoofddiagnose: acuut myocardinfarct (code I21.- want infarct is niet ouder is dan 28 dagen vanaf het begin)

Nevendiagnose: status na PCI & stent met Z95.5

NB, een patiënt die alleen behandeld is voor coronairsclerose (zonder myocardinfarct), codeer je bij overname voor nazorg, vanuit een andere instelling, na percutane interventie (PCI) met Z51.8 & Z95.5 (met stent) of Z92.8 (zonder stent) en na operatie (CABG) met Z48.8 & Z95.1.

## 9-21 Doorgemaakt CVA (uit de reeks I60-I64)

---

ingangsdatum: 01-04-2017 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een doorgemaakt CVA?

### Advies

Voor een patiënt die een CVA heeft doorgemaakt gelden vijf situaties:

1. acuut CVA --> codeer het acute CVA met een code uit de reeks I60-I64
2. acuut CVA met overplaatsing naar ander ziekenhuis --> codeer bij een overplaatsing aansluitend aan het CVA in beide ziekenhuizen het acute CVA (ook als er in het ziekenhuis van herkomst een (operatieve) ingreep voor heeft plaatsgevonden).
3. doorgemaakt CVA waarvan niet duidelijk is of het CVA nog als I60-I64 geregistreerd dient te worden --> uit de verslaglegging of navraag bij de specialist moet blijken of het CVA zich nog in de acute situatie bevindt of als 'status na'/'laat gevolg van' geregistreerd dient te worden.
4. status na CVA zonder restverschijnselen --> codeer Z86.7 'persoonlijke anamnese met ziekten van hart vaatstelsel'
5. status na CVA met restverschijnselen --> codeer de restverschijnselen + aanvullend I69.- 'late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten', zie codeadvies 0-15 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten

Voorbeelden (corresponderen qua nummering met de bovenstaande 5 situaties):

1. Patiënt wordt opgenomen met een subarachnoïdale bloeding op basis van een cerebraal aneurysma nno.  
Codeer I60.9 'subarachnoïdale bloeding, niet-gespecificeerd'.
2. Patiënt wordt vanuit een buitenlands ziekenhuis overgeplaatst na een intracerebrale bloeding tijdens een vakantie.  
Codeer I61.9 'intracerebrale bloeding, niet-gespecificeerd'.

3. Patiënt wordt opgenomen vanwege een enkelfractuur en heeft 4 weken eerder een CVA doorgemaakt. Als uit de verslaglegging niet blijkt wat de status van het CVA is moet bij de specialist nagevraagd worden of het CVA een rol speelt bij de huidige opname. Codeer de enkelfractuur als hoofddiagnose en afhankelijk van de reactie van de specialist, als nevendiagnose:
  - I60-I64 als het infarct nog als acuut beschouwd moet worden
  - de restverschijnselen en laat gevolg (I69.-) als het CVA niet meer als acuut beschouwd moet worden maar er wel restverschijnselen zijn
  - status na CVA (Z86.7) als het CVA niet meer als acuut beschouwd moet worden en er geen restverschijnselen zijn
  - niets, als het CVA restloos genezen is en geen enkele rol speelt bij de huidige opname.
4. Patiënt wordt opgenomen vanwege een trombosebeen en heeft 2 jaar geleden een niet-traumatische intracerebrale bloeding gehad (geen aanvullende informatie over eventuele restverschijnselen bekend). Codeer het trombosebeen als hoofddiagnose en aanvullend de status na de intracerebrale bloeding met Z86.7 'persoonlijke anamnese met ziekten van hartvaatstelsel'
5. Patiënt wordt opgenomen met coxartrose en heeft nog last van een hemiparese door een herseninfarct in het verleden. Codeer de coxartrose als hoofddiagnose en aanvullend de status na herseninfarct met G81.9 'hemiplegie, niet-gespecificeerd' + I69.3 'late gevolgen van cerebraal infarct'

**Opmerking:**

Manifestaties van een CVA kunnen ook in de acute fase aanvullend gecodeerd worden, ongeacht of deze bij ontslag nog aanwezig zijn. Hanteer hierbij codeadvies 0-2 'Coderen van nevendiagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ'; codeer alleen die manifestaties die van invloed zijn op de opname.

Bijvoorbeeld een hemiplegie of slikklachten waarvoor logopedie mee behandelt of een PEG sonde geplaatst wordt.

## 9-22 Asystolie niet resulterend in reanimatie en/of overlijden

---

ingangsdatum: 01-01-2018 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Hoe wordt een asystolie waarbij er geen hartstilstand optreedt gecodeerd?

**Advies**

Als een asystolie niet resulteert in reanimatie of overlijden, maar als bevinding wordt vermeld, codeer de onderliggende ritmestoornis of geleidingsstoornis. Als de onderliggende aandoening niet is gegeven, dan codeer je de tijdelijke asystolie als een afwijkend ECG met code R94.3 'afwijkende uitslagen van cardiovasculair functieonderzoek'.

**Toelichting**

De alfabetische index geeft voor asystolie code I46 'hartstilstand'. Dit is niet in alle gevallen terecht. Een asystolie kan ook een bevinding van een ECG, ritmechip of het uitlezen van een ICD zijn. In dat geval is code I46 niet van toepassing.

## 9-23 Slechte, matige, of verminderde ventrikelfunctie

---

ingangsdatum: 01-07-2018 of zo mogelijk eerder  
 mutatedatum: 01-01-2019 & 01-01-2022

### Vraag

Hoe codeer je een slechte, matige of verminderde ventrikelfunctie?

### Advies

Een slechte of matige linkerventrikelfunctie codeer je met I50.1 'linkerventrikeldecompensatie'. Een slechte of matige rechterventrikelfunctie codeer je met I50.0 'hartdecompensatie met stuwing'.

Een verminderde ventrikelfunctie wordt gecodeerd met code R94.3 'afwijkende uitslagen van cardiovasculair functieonderzoek'.

### Toelichting

Een slechte of matige ventrikelfunctie is een functiestoornis, oftewel een insufficiëntie van het ventrikel. In de alfabetische index word je via insufficiëntie, - ventrikel verwezen naar insufficiëntie, - myocard I50.9. Bij controle in de systematische lijst blijkt duidelijk dat voor het linkerventrikel I50.1 de passende code is en voor het rechterventrikel I50.0.

## 9-24 Links- en rechts decompensatio cordis

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Wat codeer je als er sprake is van zowel links- als rechts decompensatio cordis?

### Advies

Bij zowel links- als rechts decompensatio cordis codeer je als eerste I50.0 'hartdecompensatie met stuwing' omdat deze code inclusief rechtsdecompensatie secundair aan linksdecompensatie is. Omdat rechtsdecompensatie niet in alle gevallen samen gaat met linksdecompensatie codeer je I50.1 'linkerventrikeldecompensatie' aanvullend om nader te specificeren dat het zowel rechts- als linksdecompensatie betreft.

## 9-25 Arteriële wandonregelmatigheden en niet-significante arteriosclerose

---

ingangsdatum: 01-04-2019

### Vraag

Hoe worden arteriële wandonregelmatigheden en niet-significante arteriosclerose gecodeerd?

### Advies

Codeer arteriële wandonregelmatigheden en niet-significante arteriosclerose als zijnde arteriosclerose.

### Voorbeelden

Wandonregelmatigheid in arteria femoralis I70.2-  
 Niet-significante coronairsclerose I25.1

## 9-26 Aborted myocardinfarct

---

ingangsdatum: 01-10-2019 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een aborted myocardinfarct?

### Advies

Codeer een aborted myocardinfarct met I24.0 'Coronaire trombose niet leidend tot myocardinfarct'

### Toelichting

Een aborted myocardinfarct is een verijdeld infarct - dus (nog) geen infarct -. Hierbij volgen we de inclusies die bij I24.0 gelden:

embolie occlusie trombo-embolie		coronair (arterie) (vene) niet leidend tot myocardinfarct
---------------------------------------	--	---

## 9-27 MINOCA

---

ingangsdatum: 01-10-2019 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een MINOCA (myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries)?

### Advies

Een MINOCA codeer je als een acuut myocardinfarct.

### Toelichting

Als er sprake is van een hartinfarct waarbij géén obstructief coronairlijden aanwezig is, wordt dit ook wel MINOCA genoemd (myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries).

Als mogelijke coronaire oorzaken van MINOCA worden coronairspasme, microvasculair coronairlijden, thrombo-embolie, coronaire dissectie en coronaire inflammatie genoemd. Als myocardiale oorzaken komen voor: myocarditis, takotsubocardiomyopathie. Tenslotte als niet-cardiale oorzaken: onder andere longembolie, stollingsziekten, sikkelcelziekte, thalassemie en renale insufficiëntie.

Codeer de oorzaak aanvullend indien deze is genoemd.

### Voorbeelden

MINOCA	I21.9
op basis van microvasculair coronairlijden	I25.1

MINOCA apicolateraal transmuraal	I21.2
op basis van takotsubocardiomyopathie	I42.8

## 9-28 Longembolie met rechtsbelasting

---

ingangsdatum: 01-07-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een longembolie met rechtsbelasting?

### Advies

Een longembolie met rechtsbelasting wordt gecodeerd met I26.9 'longembolie zonder vermelding van acuut cor pulmonale + I27.2 'pulmonale hypertensie, overige secundaire'.

## 10-1 Exacerbatie van COPD o.b.v. een pneumonie

---

ingangsdatum: 01-03-2013

vervangt: CvZ aca 19.1

### Vraag

Hoe wordt een exacerbatie van COPD o.b.v. een pneumonie gecodeerd?

### Advies

Codeer J44.0- + J18.9 (Chronische obstructieve longaandoening met acute infectie van de onderste luchtwegen + Pneumonie, niet gespecificeerd).

### Toelichting

J44.0- is in bovenstaande casus de hoofddiagnose. De verergering / exacerbatie wordt in de tekst bij code J44.0- immers weergegeven (met acute infectie...). Daarom wijkt dit advies af van het oude CvZ'80 advies 19.1-2, waarbij de gespecificeerde acute aandoening als hoofddiagnose werd gecodeerd.

## 10-2 Exacerbatie chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (J40-J47)

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-10-2017

vervangt: CvZ aca 19.1

### Exacerbatie chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen

Soms treedt bij een chronische longaandoening een exacerbatie (verergering) op. Dit betreft vaak een samengaan van factoren welke moeilijk te benoemen zijn door de specialist.

Let op:

In tegenstelling tot het algemene codeadvies dat gold voor de CvZ80, wordt eerst de chronische longaandoening gecodeerd en aanvullend de aard van de exacerbatie.

### Advies

Exacerbatie chronische obstructieve longaandoeningen (COPD)

a. Exacerbatie van COPD met specificatie van de oorzaak van de exacerbatie:

- J44.0- "Chronische obstructieve longaandoening met acute infectie van onderste

luchtwegen" voor exacerbatie door pneumonie of bronchi(oli)tis

NB

- Let op de exclusie die bij J44.0 staat voor acute infectie van de onderste luchtwegen met influenza (J09-J11)
  - Omdat in de omschrijving van J44.0 'exacerbatie' niet is genoemd, is deze code te gebruiken voor COPD met acute infectie van de onderste luchtwegen, zowel met als zonder de vermelding van exacerbatie
- J44.1- "Chronische obstructieve longaandoening met acute exacerbatie, niet gespecificeerd" voor exacerbatie door overige luchtweginfecties of zonder gespecificeerde oorzaak

De oorzaak van de exacerbatie (bv. pneumonie) wordt aanvullend gecodeerd.

b. Exacerbatie van COPD zonder specificatie van de exacerbatie

- J44.1- "Chronische obstructieve longaandoening met acute exacerbatie, niet gespecificeerd"

Wanneer de oorzaak van de exacerbatie niet is benoemd, wordt deze dus niet aanvullend gecodeerd.

Exacerbatie overige chronische, niet obstructieve longaandoeningen

c. Exacerbatie chronische, niet obstructieve longaandoening met specificatie van de exacerbatie:

- een code uit de reeks J40 t/m J43 of J45 t/m J47

De aard van de exacerbatie (bv. pneumonie) wordt aanvullend gecodeerd.

d. Exacerbatie chronische, niet obstructieve longaandoening, zonder specificatie van de exacerbatie

- een code uit de reeks J40 t/m J43 of J45 t/m J47

Wanneer de oorzaak van de exacerbatie niet is benoemd, wordt deze dus niet aanvullend gecodeerd.

### Opmerking

Code J46 "Status asthmaticus" wordt alleen gecodeerd indien de astma als zodanig omschreven is en dus niet standaard voor een exacerbatie.

## 10-3 Bronchiale hyperreactiviteit

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Vraag

Hoe wordt bronchiale hyperreactiviteit gecodeerd?

Informatie:

Bronchiale hyperreactiviteit betekent het overmatig reageren van de bronchiale luchtwegen op prikkels door samentrekking. Het kan een voorteken zijn van astma.

### Advies

Zolang geen astma bewezen is codeer J98.0 (Spasme bronchus).

## 10-4 Pneumosepsis

---

ingangsdatum: 01-01-2015

mutatiedatum: 01-07-2016 & 01-01-2021

## Vraag

Hoe wordt een pneumosepsis gecodeerd?

## Advies

- De pneumonie wordt via de hoofdingang Pneumonie in de alfabetische lijst gecodeerd
- Codeer alleen aanvullend een sepsis als uit de documentatie van de arts blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een sepsis (meestal te coderen met A41.-)

## Toelichting

Een pneumosepsis is een sepsis die voortkomt uit een pneumonie. In de praktijk blijkt echter dat deze term niet altijd zuiver wordt gebruikt. Ook wanneer er geen sprake is van een sepsis wordt een pneumonie soms aangeduid als 'pneumosepsis'. Het is daarom belangrijk om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een sepsis naast de pneumonie.

Zie codeadvies 1-4 'Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie' voor de volgorde van de codering.

## 10-5 Tonsillitis en hypertrofie van de tonsillen bij tonsillectomie

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 8.1

## Vraag

Hoe codeer je tonsillitis en hypertrofie van de tonsillen als patiënt wordt opgenomen voor tonsillectomie?

## Advies

Bij een opname voor tonsillectomie moet een diagnosecode uit J35.- gecodeerd worden.

- Tonsillitis NNO J35.0
- Chronische tonsillitis J35.0
- Recidiverende tonsillitis J35.0
- Hypertrofie van tonsillen J35.1
- Hypertrofische tonsillitis J35.0

## Toelichting

Bij een opname voor tonsillectomie zal de diagnose meestal vergroting (hypertrofie) of chronische ontsteking zijn. In dat geval is er bij het coderen geen probleem (code J35.1 respectievelijk J35.0). Een probleem ontstaat wel, wanneer de specialist de term 'recidiverende tonsillitis' gebruikt, en vooral als men dit opvat als een recidiverende acute tonsillitis. Een patiënt wordt namelijk niet in een acute fase opgenomen voor een tonsillectomie. De indicatie is dus de chronische toestand met herhaalde ontstekingen.

Een opname voor tonsillectomie bij een tonsillitis NNO wordt dus gecodeerd als chronische tonsillitis (J35.0) en niet als acute tonsillitis (J03.9) waar de alfabetische lijst naar verwijst.

## 10-6 Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie

---

ingangsdatum: 01-07-2016 of zo mogelijk eerder

## Vraag

Wat is bij een opname voor respiratoire insufficiëntie, waarvan de onderliggende aandoening bekend is, de hoofddiagnose?

## Advies

Codeer de onderliggende aandoening altijd als hoofddiagnose.

Als er sprake is van een overdracht en/of medebehandeling mag de respiratoire insufficiëntie wel de primaire diagnose zijn (uitgezonderd: bij een opname voor COVID-19 is U07.1/2, bij respiratoire insufficiëntie altijd hoofd- en primaire diagnose).

## Voorbeelden

- Opname rechtstreeks voor de intensivist voor beademing vanwege acute respiratoire insufficiëntie bij een pneumonie. Na de opname voor de intensivist wordt patiënt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.  
Coderen intensivisme:  
**hoofddiagnose** J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd'  
nevendiagnose J96.0- 'Acute respiratoire-insufficiëntie'
- Opname voor longgeneeskunde voor pneumonie, overplaatsing naar intensivisme vanwege een bijkomende acute respiratoire insufficiëntie.  
Coderen longgeneeskunde:  
**hoofddiagnose** J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd'  
nevendiagnose NAS J96.0- 'Acute respiratoire-insufficiëntie' (NAS van aandoening ontstaan tijdens de opname, zie<sup>9</sup>)  
Coderen intensivisme:  
Primaire diagnose NAS J96.0- 'Acute respiratoire-insufficiëntie'  
Nevendiagnose J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd'
- Opname voor intensivisme met acute respiratoire insufficiëntie bij een pneumonie, na de behandeling van de respiratoire insufficiëntie overplaatsing naar longgeneeskunde voor verdere behandeling van de pneumonie.  
Coderen intensivisme:  
primaire diagnose J96.0- 'Acute respiratoire-insufficiëntie'  
nevendiagnose J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd'  
  
Coderen longgeneeskunde:  
**hoofddiagnose** J18.9 'Pneumonie, niet gespecificeerd'

Let op: Zie voor het coderen van de volgorde etiologie en manifestatie, bij overige aandoeningen codeadvies 0-16.

## 10-7 Influenza

---

ingangsdatum: 01-01-2017

### Vraag

Wanneer codeer je voor influenza J09 'Influenza door zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd-influenzavirus, J10.- 'Influenza door seizoensgebonden geïdentificeerd-influenzavirus' of J11.- 'influenza, virus niet geïdentificeerd'?

### Advies

<sup>9</sup> NAS

Een aandoening die tijdens het verblijf in het ziekenhuis is ontstaan, ongeacht de oorzaak, wordt binnen de LBZ aangeduid als 'Niet Aanwezig bij Start opname' (NAS) (zie ook advies 0-19).

De subtypen influenza A/H1N1 [varkensgriep] en A/H5N1 [vogelgriep] worden met code J09 vastgelegd. Alle andere geïdentificeerde vormen van influenza, voornamelijk influenza A en influenza B, worden met code J10.- vastgelegd.  
Als het influenzavirus niet geïdentificeerd is wordt code J11.- vastgelegd.

### **Toelichting**

Voor sommige subtypen van het influenza-A-virus bestaat (vrijwel) geen weerstand. Subtypen (H1N1 & H5N1) hebben daarom code J09 'Influenza door vaststaand geïdentificeerd influenzavirus' gekregen van de WHO.

NB Let goed op de exclusie bij J09, J10 en J11 voor aandoeningen door *Haemophilus influenzae*. Dit is een bacterie en geen virus en valt daarom niet binnen deze codes. Het is dus belangrijk om bij 'influenza' goed te kijken of het daadwerkelijk om het virus gaat of om de bacterie '*Haemophilus influenzae*'.

### **Voorbeelden**

Influenza A pneumonie	J10.0 'Influenza met pneumonie, door seizoensgebonden geïdentificeerd influenzavirus
Influenza B NNO	J10.1 'Influenza met overige manifestaties van luchtwegen, door seizoensgebonden geïdentificeerd influenzavirus '
Vogelgriep A/H5N1 Pneumonie	J09 'Influenza door zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd-influenzavirus' & J12.8 'overige gespecificeerde viruspneumonie'
H. influenzae pneumonie	J14 'Pneumonie door <i>Haemophilus influenzae</i> '
Influenza NNO	J11.1 'influenza met overige manifestaties van luchtwegen, virus niet geïdentificeerd'

## 10-8 Cryptogene organiserende pneumonie (COP / BOOP)

ingangsdatum: 01-07-2017 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je cryptogene organiserende pneumonitis (COP), ook wel 'idiopathische bronchiolitis obliterans met organiserende pneumonie' genoemd (BOOP)

### **Advies**

Codeer een cryptogene organiserende pneumonie (COP) / bronchiolitis obliterans organiserende pneumonie (BOOP) met code J84.8 'Overige gespecificeerde interstitiële longziekten'

## 10-9 Emfysemateus COPD

ingangsdatum: 01-10-2017 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe wordt emfysemateus COPD gecodeerd?

### **Advies**

Emfysemateus COPD wordt gecodeerd met code J43.- 'emfyseem'.

Tenzij:

- er naast emfyseem of emfysemateuze COPD sprake is van chronische bronchitis, dan wordt dit vastgelegd met J44.8 - 'overige gespecificeerde chronische obstructieve longaandoeningen'.  
J43.- wordt aanvullend gecodeerd ter specificatie van het type COPD.
- er bij emfyseem of emfysemateuze COPD sprake is van een acute onderste luchtweginfectie en/of exacerbatie, dan wordt J44.0 - 'chronische obstructieve longaandoening met acute infectie van onderste luchtwegen' of J44.1 - 'chronische obstructieve longaandoening met acute exacerbatie, niet-gespecificeerd' gecodeerd, aangevuld met de acute infectie of andere oorzaak van de exacerbatie.  
J43.- wordt aanvullend gecodeerd ter specificatie van het type COPD.

### **Toelichting**

Longemfyseem is een specifieke vorm van COPD (chronic obstructive pulmonary disease). COPD omvat twee groepen van aandoeningen, vaak in onderlinge samenhang voorkomend: chronische bronchitis (incl. bronchiolitis) en longemfyseem.

De alfabetische index is leidend voor de codering en heeft verschillende ingangen voor emfyseem/emfysemateus COPD:

1. Emfyseem (atrofisch)(chronisch)(.....)(obstructief) J43.9/.8
2. Aandoening, - long, - - obstructief, - - - met, - - - - emfyseem J43.-
3. Obstructie, obstructief, - luchtweg, - - met, - - - emfyseem J43.9

J44.8 - is alleen van toepassing als er naast emfyseem ook sprake is van chronische bronchitis. Het onderscheid tussen J43 en J44 is dus het chronische bronchitis aspect.

## 10-10 E-sigaret gerelateerde aandoeningen en gebruik van e-sigaret

ingangsdatum: 01-01-2020 of zo mogelijk eerder

mutatie: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### **Vraag 1**

Hoe codeer je een aandoening door het gebruik van een e-sigaret, ook wel een dampen- of vapengerelateerde aandoening genoemd?

### **Advies**

Indien een aandoening wordt gerelateerd aan het gebruik van een e-sigaret, codeer dan eerst code U07.0 'dampen [vapen] gerelateerde aandoening' en codeer aanvullend de manifestatie

### **Voorbeelden**

1. Bronchitis ten gevolge van gebruik e-sigaret  
U07.0 'dampen [vapen] gerelateerde aandoening' &  
J68.0 'Bronchitis en pneumonitis door chemische stoffen, gassen, rook en dampen' &
2. Eosinofiele pneumonie ten gevolge van gebruik e-sigaret  
U07.0 'dampen [vapen] gerelateerde aandoening' &  
J82 'Pulmonale eosinofilie, niet elders geclassificeerd'
3. Onbekende luchtwegaandoening ten gevolge van gebruik e-sigaret  
U07.0 'dampen [vapen] gerelateerde aandoening' &  
J68.9 'Niet gespecificeerde respiratoire aandoening door chemische stoffen, gassen, rook en dampen'

NB; vanwege de codeerregel dat bij dampen [vapen] gerelateerde aandoeningen de uitwendige oorzaak (U07.0) als eerste code geregistreerd dient te worden, vervalt bij deze aandoeningen de eventuele aanwijzing 'Gebruik desgewenst aanvullende code uit hoofdstuk XX om uitwendige oorzaak aan te geven'

## **Vraag 2**

Hoe codeer je het gebruik van een e-sigaret, ook wel dampen of vapen genoemd?

### **Advies**

Met een e-sigaret verdamp je vloeistof die meestal nicotine bevat. Twee codes zijn relevant om deze vorm van nicotinegebruik vast te leggen in de LBZ: F17.1 en F17.2.

Indien het nicotinegebruik vermeld wordt naast een te behandelen aandoening: F17.1 'Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak, schadelijk gebruik'.

Als de behandeling in het kader van de verslaving staat: F17.2 'Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak, afhankelijkheidssyndroom'

De behandeling in het kader van verslaving zal in de ziekenhuizen niet klinisch of in dagverpleging plaatsvinden, maar is wél relevant voor het vastleggen van de ambulante patiënten binnen de LBZ.

Indien vermeld staat dat de e-sigaret geen nicotine, maar bijvoorbeeld cannabisolie bevat, dan gebruik je F12.1 en F12.2 op dezelfde wijze als hierboven.

NNO: Voor het niet nader omschreven gebruik van een e-sigaret codeer je F17.1

## **10-11 Astma en COPD overlap syndroom (ACOS)**

---

ingangsdatum: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe wordt het astma en COPD overlap syndroom (ACOS) gecodeerd?

### **Advies**

Bij het astma en COPD overlap syndroom (ACOS) is er sprake van astma en COPD. Dit wordt gecodeerd door de codes van beide aandoeningen te registreren (J44.- + aanvullend J45.-).

## **10-12 Trapped lung**

---

ingangsdatum: 01-10-2020 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je een trapped lung

### **Advies**

Codeer een trapped lung met J94.1 'fibrothorax'.

## 10-13 Eosinofiel astma

---

ingangsdatum: 01-01-2022 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je eosinofiel astma?

### Advies

Codeer eosinofiel astma met code J82 'pulmonale eosinofilie, niet elders geassocieerd' en aanvullend J45.- ter specificatie van de astma<sup>10</sup>.

## 11-3 Short bowel syndrome

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe wordt het short bowel syndroom gecodeerd?

### Informatie:

Het short bowel syndroom is een kortedarmsyndroomziektecomplex met water- en elektrolytenverlies en malabsorptie na resectie van driekwart van de dunne darm. (Pinkhof)

### Advies

Codeer het short bowel syndroom met code K91.2 "Postoperatieve malabsorptie, niet elders geassocieerd".

Zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling.

## 11-6 Rectaal bloedverlies

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe wordt rectaal bloedverlies gecodeerd?

### Advies

Indien niet bekend is waar het bloedverlies door veroorzaakt wordt, gebruik dan code K92.2 'Gastro-intestinale bloeding, niet gespecificeerd'.

Code K62.5 'Bloeding van anus en rectum' alleen gebruiken als het een bloeding van de anus of rectum betreft.

<sup>10</sup> De exclusies in de ICD-10 zijn er voor het bepalen van de voorkeurscode. Als je via een exclusie uitkomt op een code waar de term minder specifiek is beschreven, codeer je aanvullend ter nadere specificatie.

## 11-7 Naadlekkage na ileocoecale resectie

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### **Vraag:**

Hoe wordt een naadlekkage na ileocoecale resectie gecodeerd?

### **Advies:**

Codeer K91.8 + Y83.2 (Overige gespecificeerde aandoeningen van spijsverteringsstelsel na medische verrichting, niet elders geclassificeerd + operatie met anastomose, bypass of transplantaat).

Zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling.

## 11-8 Watermeloenmaag / GAVE

---

ingangsdatum: 01-09-2014

### **Vraag**

Wat is de code voor een watermeloenmaag / GAVE?

### **Advies**

Codeer een watermeloenmaag met K31.8 "Overige gespecificeerde ziekten van maag en duodenum".

### **Toelichting**

Watermeloenmaag en GAVE zijn synoniemen. De watermeloen-maag, ofwel 'gastric antral vascular ectasia' is een betrekkelijk zeldzaam ziektebeeld. Het kan de oorzaak zijn van persisterend bloedverlies.

## 11-9 High output stoma (HOS)

---

ingangsdatum: 01-04-2016

### **Vraag**

Hoe wordt een high output stoma (HOS) gecodeerd?

### **Advies**

Codeer een high output stoma met K91.2 'postoperatieve malabsorptie'.  
Codeer aanvullend Y83.3 'operatie met aanleggen van uitwendig stoma' als externe oorzaak. Gevolgen van een HOS, zoals dehydratie en/of hypokaliëmie worden tevens vastgelegd. Volgorde van de codering is afhankelijk van de reden van opname, zie codeadvies 0-16 'Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie'.

### **Toelichting**

Bij een high output stoma is er sprake van een hoge stomaproductie, waarbij het overgebleven darmgedeelte, onvoldoende vocht en voedingsstoffen kan opnemen. Het stoma functioneert in feite goed. Door deze situatie kan bijvoorbeeld dehydratie ontstaan.

## 11-10 Overloopdiarree

---

ingangsdatum: 01-10-2016 of zo mogelijk eerder

### **Advies**

Codeer overloopdiarree met K59.0 'constipatie'

### **Toelichting**

Bij obstipatie kan overloopdiarree voorkomen. Doordat niet ingedikte feces rond de blokkade van geïmpacteerd feces stroomt is er sprake van een dunne defecatie. Dit gevolg van de obstipatie wordt niet aanvullend gecodeerd.

Codeer overloopdiarree als obstipatie met K59.0.

Overloopdiarree wordt ook wel paradoxale diarree genoemd.

## 11-11 Presacraal abces

---

ingangsdatum: 01-10-2019 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je een presacraal abces?

### **Advies**

Een presacraal abces wordt gecodeerd met code K65.0 'acute peritonitis'.

### **Toelichting**

Een presacraal abces bevindt zich in de retroperitoneale ruimte en valt daarmee buiten de bekkenholte. De exclusie bij code K65 voor peritonitis in het vrouwelijke bekken gaat hier dus niet op. Een presacraal abces is vaak een complicatie van een operatie in de buikholte.

### **Voorbeeld**

Presacraal abces na rectumextirpatie: T81.4 + Y83.6 + K65.0

## 11-12 Inwendige herniatie na een gastric bypass

---

ingangsdatum: 01-10-2020 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je een inwendige herniatie na een gastric bypass (ook wel Peterson/Petersen hernia genoemd)?

### **Advies**

Codeer een inwendige herniatie na een gastric bypass met K45.-

### **Voorbeelden**

- Peterson hernia met obstructie (zonder gangreen)  
K45.0 'Overige gespecificeerde buikwandbreuken, met obstructie, zonder gangreen'
- Buikhernia na gastric bypass NNO  
K45.8 'Overige gespecificeerde buikwandbreuken, zonder obstructie of gangreen'

NB: gebruik aanvullende Z-codering als in advies 21-5: Codeer “status na een gastric bypass” met Z98.0 “Aanwezigheid van bypass en anastomose van darm” + als een gedeelte van de maag verwijderd is, aanvullend Z90.3 “Verworven afwezigheid van maag (deel van maag)”.

## 11-13 Bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening

---

ingangsdatum: 01-07-2021 of zo mogelijk eerder

### Vraag:

Hoe wordt een bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening gecodeerd?

### Advies:

Codeer voor een bloeding door een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening, als eerste de onderliggende aandoening en aanvullend de bloeding (tenzij de bloeding tot uiting komt in de code voor de onderliggende aandoening).

### Voorbeelden:

1. Rectaal bloedverlies door hemorroïden: K64.9 ‘hemorroïden niet-gespecificeerd’+ K62.5 ‘bloeding van anus en rectum’
2. Rectaal bloedverlies door straling-proctitis: K62.7 ‘proctitis door straling’ + K62.5 ‘bloeding van anus en rectum’
3. Gastro-intestinaal bloedverlies bij angiodyplasie van het duodenum: K55.3 ‘angiodyplasie van dunne darm’ + K92.2 ‘gastro-intestinale bloeding, niet-gespecificeerd’
4. Divertikelbloeding: K57.9 ‘divertikelziekte van darm, deel niet-gespecificeerd, zonder perforatie of abces’+ K92.2 ‘gastro-intestinale bloeding, niet-gespecificeerd’
5. Gastro-intestinaal bloedverlies bij ulcus duodenum: K26.4 ‘ulcus duodeni, chronisch of niet gespecificeerd met bloeding’

Let op: Zie voor het coderen van de volgorde etiologie en manifestatie, bij overige aandoeningen codeadvies 0-16.

## 12-1 Neuroom in litteken

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Vraag

Hoe wordt de diagnose 'Neuroom in litteken' gecodeerd?

### Advies

Codeer L90.5 + D36.1 + M9570/0 (Littekens en fibrose van huid + Benigne neoplasma van perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel + Neuroom NNO).

## 12-2 Hand-voet-syndroom na chemotherapie

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe wordt het hand-voet-syndroom na chemotherapie gecodeerd?

**Advies**

Codeer het Hand-voet-syndroom na chemotherapie met L27.1 “Gelokaliseerde huideruptie door geneesmiddelen” en aanvullend Y43.3 “Overige antineoplastische geneesmiddelen” om de chemotherapie als oorzaak aan te geven.

**Toelichting**

Door de behandeling met chemotherapie kan een patiënte het hand-voet syndroom krijgen. Dit is een vorm van lokaal erytheem die over het hele lichaam kan voorkomen maar meestal enkel aan de handen en voeten optreedt.

Zie ook codeadvies 0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen

## 12-4 Sacrale dimple

---

ingangsdatum: 01-04-2017 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Hoe codeer je een sacrale dimple?

**Advies**

Een sacrale dimple wordt gecodeerd met L05.9 ‘sinus pilonidalis zonder abces’

**Toelichting**

Een sacrale dimple is een putje/deukje in de huid ter hoogte van het sacrum. Dit kan wijzen op een afwijking in het wervelkanaal. Als een sacrale dimple beperkt blijft tot de huid codeer je dit met L05.9 ‘sinus pilonidalis zonder abces’ (alfa: sinus (= holte), dermaal (congenitaal)). Als er wel een afwijking van het wervelkanaal blijkt, codeer je uiteraard de betreffende aandoening zoals spina bifida of spina bifida occulta.

## 12-5 Dog-ear

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

vervangt: CvZ advies nieuwsbrief 5-1999

mutatiedatum: 01-01-2021

**Vraag**

Hoe codeer je een dog-ear?

**Advies**

Codeer een dog-ear als huidoverschot met L98.7 ‘overmatige en overtollige huid en subcutis’ + Z-code voor postoperatieve status.

**Voorbeeld**

Dog-ears na buikwandcorrectie: L98.7 + Z98.8

**Toelichting**

Een dog-ear, (ook wel ezelsoor genaamd) is een huidoverschot aan één of beide uiteinden van een litteken na een wondsluiting.

## 13-1 Opsoclonus-myoclonussyndroom

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### **Vraag**

Hoe wordt het Opsoclonus-myoclonussyndroom gecodeerd?

### **Advies**

Codeer M35.9 + G96.9 + G25.3 + H55 (Auto-immuunziekte + Aandoening van het centraal zenuwstelsel, niet gespecificeerd + Myoclonus + Nystagmus en andere onregelmatige oogbewegingen).

## 13-2 Haglundse exostose

---

ingangsdatum: 01-03-2013

mutatiedatum: 01-01-2021

### **Vraag**

Hoe wordt een Haglundse exostose gecodeerd?

### **Advies**

Codeer M77.3 'calcaneusspoor' (via de alfabetische ingang: Haglund, -misvorming of ziekte (verworven)).

## 13-3 Niet traumatische labrumlesie van het heupgewricht

---

ingangsdatum: 01-03-2013

mutatiedatum: 01-01-2021

### **Vraag**

Hoe wordt een niet traumatische labrumlesie van het heupgewricht gecodeerd?

### **Advies**

Codeer M24.1 'overige aandoeningen van gewrichtskraakbeen' en gebruik lokalisatiecode 5 voor het heupgewricht.

### **Toelichting**

Labrum is kraakbeen.

## 13-4 Girdlestone situatie heup

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Hoe wordt een Girdlestone situatie van de heup gecodeerd?

### **Advies**

Codeer deze situatie met code M96.8 "Overige gespecificeerde aandoeningen van botspierstelsel na medische verrichting"

Zoekpad alfabetische index:

instabiliteit

- gewricht

- - secundair aan verwijderen gewrichtsprothese M96.8

Codeer aanvullend de uitwendige oorzaak van deze resttoestand: Y88.3

Zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling.

## 13-5 Chondropathie en niet traumatisch(e) chondraallesie/ kraakbeenletsel van de knie

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-09-2014

### Vraag

Hoe wordt chondropathie en niet traumatisch(e) chondraallesie/kraakbeenletsel van de knie gecodeerd?

### Advies

Codeer deze aandoening bij met code M23.8/9- "Dérangement interne van knie, overig / niet gespecificeerd"

Codeer chondropathie van de patella met code M22.3 "Overige vormen van dérangement van patella"

Zoekpad deel 3:

Aandoening

- kraakbeen

- - gewricht NEC M24.1

Exclusie in deel 1 bij M24.1: dérangement interne van de knie (M23.-)

Exclusie bij M23: aandoeningen van patella (M22.-)

## 13-7 Impingement van de enkel

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-09-2014

### Vraag

Wat is de code voor impingement van de enkel

### Advies

Codeer impingement van de enkel met M77.5 "Overige enthesopathie van voet".

## 13-8 Spondylodiscitis

---

ingangsdatum: 15-01-2014  
mutatiedatum: 01-01-2016 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Hoe wordt spondylodiscitis nno gecodeerd?

**Advies**

Spondylodiscitis nno is niet in één code te vatten en wordt daarom gecodeerd met M46.4- "Discitis, niet gespecificeerd" en M46.9- "Inflammatoire spondylopathie, niet gespecificeerd".

**Vraag**

Hoe wordt een spondylodiscitis door E-coli gecodeerd?

**Advies**

Codeer de spondylodiscitis door E-coli met M46.3- "Infectie van tussenwervelschijf (pyogeen)" en M46.5 'Overige infectieuze-spondylopathieën'. Codeer de E-coli aanvullend met B96.2 "Escheria coli [E. coli] als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken".

### 13-10 Pseudoradiculair syndroom

---

ingangsdatum: 15-01-2014

**Vraag**

Hoe wordt het pseudoradiculair syndroom gecodeerd?

**Advies**

Er is bij het pseudoradiculair syndroom (nog) geen sprake van een radiculair syndroom; codeer één of meerdere van de vastgelegde symptomen, bijvoorbeeld:

Lumbago NNO M54.59

Rugpijn NNO M54.99

Lumbago met uitstraling M54.49

Alleen uitstraling M54.39

### 13-11 Posttraumatische dystrofie

---

ingangsdatum: 01-03-2013

mutatiedatum: 01-01-2021

**Vraag**

Hoe wordt posttraumatische dystrofie gecodeerd?

**Advies**

Codeer G90.5 'Complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1)'

**Toelichting**

In deel drie is posttraumatische dystrofie niet te vinden.

Posttraumatische dystrofie is synoniem met CRPS-I, Sudecksdystrofie en sympathische reflexdystrofie.

## 13-12 Lage rugpijn

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### Vraag

Welk vijfde teken wordt gecodeerd bij lage rugpijn?

### Advies

Codeer bij M54.5 (Lage rugpijn) als vijfde teken .9 als geen specifieke lokalisatie is aangegeven.

## 13-13 Artrose primair / secundair

---

ingangsdatum: 01-01-2015

vervangt: CvZ aca 6.2

### Artrose primair / secundair

Voor artrose is in het blok M15-M19 onderscheid te maken tussen primaire artrose en secundaire artrose.

Primaire artrose is artrose zonder bekende oorzaak; bij secundaire artrose wordt wel een oorzaak aangenomen: hetzij een aangeboren of verworven morfologische afwijking, hetzij een stofwisselings- stoornis zoals diabetes.

Het onderscheid is overigens vaak moeilijk te maken.

### Advies

- Codeer in het blok M15-M19 artrose zonder nadere aanduiding als “niet gespecificeerd” met een .9 code.
- Codeer bij vermelding van de term 'primair' of 'idiopatisch' de primaire artrose.
- Codeer bij vermelding van een oorzaak (trauma, ziekte, afwijking) de artrose met de vermelde oorzaak of de overige secundaire artrose.

### Voorbeelden:

Coxartrose bij botziekte van Paget (heup)	M16.7 M88.85
Gonartrose linker knie door auto-ongeval 3 jaar geleden	M17.3 T93.9 & Y85.0
Coxartrose NNO	M16.9

## 13-14 Carpal boss

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Met welke code wordt carpal boss vastgelegd?

### Advies

Codeer de carpal boss als een osteofyt tussen de carpus en de metacarpale met M25.74 'Osteofyt, van hand'.

### **Toelichting**

Carpal boss is een aandoening waarbij er een benige verdikking is ontstaan over het CMC2 en/of CMC3 gewricht op de handrug. Dit wordt gecodeerd als een osteofyt.

Een osteofyt is een gewrichtsgebonden botwoekering, in tegenstelling tot een exostose welke een **niet** gewrichtsgebonden botwoekering is.

## 13-15 'Oud' versus 'vers' letsel van het bewegingsstelsel

---

ingangsdatum: 01-07-2016 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 27.1

### **Vraag**

Hoe bepaal je of een letsel van het bewegingsstelsel als oud of als vers letsel gecodeerd moet worden?

### **Advies**

Gebruik voor een letseldiagnose van het bewegingsstelsel, een code uit hoofdstuk XIX (letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken) indien aan beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. er is een 'luxerend moment', een voorval waar de aandoening een oorzakelijke relatie mee heeft, en
2. er zijn aanwijzingen waardoor duidelijk is dat de aandoening zich nog in de verse (herstel) fase bevindt. Bijvoorbeeld;
  - opname-indicatie acuut
  - opname via SEH
  - opname binnen 6 weken<sup>11</sup> na luxerend moment

Gebruik in alle andere gevallen van een letseldiagnose een code uit hoofdstuk XIII 'Ziekten van bot-spiersstelsel en bindweefsel'.

NB Voor 'late gevolgen van letsels' wordt de omschrijving genoemd op blz. XIX. 102, van het systematische deel van de ICD-10, gehanteerd:

*Categorieën T90-T98 dienen te worden gebruikt voor het aangeven van aandoeningen uit de codereeksen S00-S99 en T00-T88 als oorzaak van late gevolgen die zelf elders geclassificeerd zijn. De 'late gevolgen' omvatten die, welke als zodanig of als resttoestanden zijn gespecificeerd, of die welke een jaar of langer na het acute trauma nog aanwezig zijn.*

## 13-16 Klapvoet

---

ingangsdatum: 01-10-2016 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe wordt een klapvoet gecodeerd?

### **Advies**

Volg voor de codering van klapvoet het zoekpad dropping, - foot in de alfabetische lijst.

Code: M21.37 "dropping hand" en "dropping foot" (verworven), enkel en voet'

<sup>11</sup> De termijn van 6 weken is zowel arbitrair als in overeenstemming met de, in het algemeen, door de beroepsgroep van het bewegingsapparaat gehanteerde termijn.

## 13-17 Neurogene claudicatio

---

ingangsdatum: 01-01-2018 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 14.3

### Vraag

Hoe wordt neurogene claudicatio gecodeerd?

### Advies

- Codeer de oorzaak en aanvullend de compressie van de zenuw(wortel).
- Indien geen oorzaak aangegeven, codeer dan M48.09 'Spinale stenose van lokalisatie niet gespecificeerd' & G55.3\* 'Compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij overige dorsopathieën† (M45-M46†, M48.- †, M53-M54†)'

### Toelichting

Neurogene claudicatio berust op compressie van de cauda equina. De oorzaak ligt in de vernauwing van het wervelkanaal. Met compressie van de cauda equina wordt niet het cauda equinasyndroom bedoeld zoals de codesuggestie in de alfabetische lijst.

### Voorbeelden

Neurogene claudicatio tgv HNP L4-L5: M51.1† 'Aandoeningen van lumbale en andere tussenwervelschijven met radiculopathie (G55.1\*)' & G55.1\* 'Compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij aandoeningen van tussenwervelschijven (M50-M51+)'

Neurogene claudicatio tgv wervelkanaalstenose lumbosacraal: M48.07 'Spinale stenose van lumbosacraal gebied' & G55.3\* 'Compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij overige dorsopathieën† (M45-M46†, M48.- †, M53-M54†)'

## 13-18 ANCA-geassocieerde vasculitis

---

ingangsdatum: 01-10-2019 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een ANCA-geassocieerde vasculitis?

### Advies

ANCA (Anti Neutrophil Cystoplasmic Antibody) is een antistof die aantoonbaar is bij verschillende ziekten. Bij een ANCA-geassocieerde vasculitis (ANCA-geassocieerde vasculitiden, ANCA-positieve vasculitis) gaat het om één van de onderstaande varianten:

- Granulomatose met polyangiitis (GPA) (syn. ziekte van Wegener, wegengergranulomatose) M31.3
- Syndroom van Churg-Strauss (eosinofiele granulomateuze polyangiitis) M30.1
- Microscopische polyangiitis M31.7

Als niet bekend is welke van de bovenstaande vormen het is, adviseren we code M31.9 'Necrotiserende vaataandoening, niet gespecificeerd' (ANCA vasculitis is altijd necrotiserend).

## 14-1 Fausse route urethra door katheter

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-08-2013

### **Vraag**

Hoe wordt een fausse route van de urethra door het inbrengen van een katheter gecodeerd?

### **Advies**

Codeer bij urethra letsel door het inbrengen van een katheter: T81.2 'Onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting, niet elders geassocieerd' + S37.30 'Letsel van urethra' + Y60.6 'Onopzettelijke snee, punctie, perforatie of bloeding tijdens aspiratie, punctie en overige katheterisatie'

Codeer bij urethra letsel door verplaatsing van katheter T83.0 'Mechanische complicatie van urine(verblijfs)katheter' S37.30 + Y73.2 'Gastro-enterologische en urologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen'

### **Toelichting**

Met de term 'Fausse route van urethra' bij code N36.0 wordt geen letsel bedoeld dat is ontstaan is door een medische verrichting. Daarom wordt deze code niet gebruikt bij letsel van de urethra ontstaan door een katheter.

Zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling.

## 14-2 Urosepsis

---

ingangsdatum: 01-01-2015  
mutatiedatum: 01-07-2016  
vervangt: CvZ aca 7.3

### **Vraag**

Hoe wordt een urosepsis gecodeerd?

### **Advies**

- Codeer als eerste N39.0 (zoekpad alfa: urosepsis N39.0) (als de lokalisatie van de urineweginfectie gespecificeerd is wordt deze uiteraard specifiek gecodeerd )
- Codeer alleen aanvullend een sepsis als uit de documentatie van de arts blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een sepsis (meestal te coderen met A41.-)

### **Toelichting**

Een urosepsis is een sepsis die voortkomt uit een urineweginfectie. In de praktijk blijkt echter dat deze term niet altijd zuiver gebruikt wordt, ook wanneer er geen sprake is van een sepsis wordt een urineweginfectie soms aangeduid als 'urosepsis'. Het is daarom belangrijk om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een sepsis naast de urineweginfectie.

Zie codeadvies 1-4 'Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie' voor de volgorde van de codering.

## 14-3 Preterminale nierinsufficiëntie

---

ingangsdatum: 01-01-2015

**Vraag**

Met welke code wordt preterminale nierinsufficiëntie vastgelegd?

**Advies**

Preterminale nierinsufficiëntie wordt vastgelegd met code N18.5 'Chronische nierziekte, stadium 5'.

**Toelichting**

Bij chronische nierinsufficiëntie staat stadium 5 voor een klaring (GFR) van < 15 ml/min. Dialyse start bij een klaring (GFR) van <12 ml/min. In dat geval is er sprake van terminale nierinsufficiëntie.

Bij preterminale nierinsufficiëntie is er nog geen dialyse noodzakelijk maar is er wel al sprake van een stadium 5.

## 14-4 Astma renale

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Hoe codeer je astma renale?

**Advies:**

Bij astma renale is er sprake van ademhalingsproblemen ten gevolge van een nierfunctiestoornis.

Codeer:

- de nierfunctiestoornis als hoofdaandoening
- aanvullend de ademhalingsproblemen
- indien genoemd aanvullend:
  - overvulling met E87.7 'overmaat aan vocht'
  - vochtophoping (oedeem) in de longen met J81 'longoedeem'
  - decompensatio cordis met I50.- 'hartdecompensatie'
  - metabole acidose met E87.2 'acidose'

Codeer astma renale NNO met N19 'niet-gespecificeerde nierinsufficiëntie' & R06.8 'overige en niet-gespecificeerde afwijkingen van ademhaling'

## 14-5 Bacteriurie NNO

---

ingangsdatum: 01-10-2021 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Hoe wordt een bacteriurie gecodeerd?

**Advies**

Een bacteriurie NNO wordt gecodeerd met N39.0 'urinegewinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd'.

**Toelichting**

Een bacteriurie hoeft niet altijd tot een infectie te leiden maar desondanks is een (asymptomatische) bacteriurie in de ICD-10 ingedeeld als urinegewinfectie en wordt voor de codering strikt de alfabetische index gevolgd.

## 15-1 Partus - hemofilie dragerschap

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-09-2014

### **Vraag**

Hoe wordt een partus gecodeerd van een moeder met hemofilie dragerschap?

### **Advies**

Codeer O35.2 "(Vermoede) hereditaire aandoening bij foetus als indicatie voor zorg bij moeder"  
Codeer voor het resultaat van de bevalling Z37.- .

## 15-2 Harde buiken bij een gravida

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### **Vraag**

Hoe wordt de diagnose 'Harde buik bij een gravida' gecodeerd?

### **Advies**

Codeer O47.- (Valse weeën).

## 15-3 Minder leven (foetale bewegingen) voelen tijdens de zwangerschap

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### **Vraag**

Hoe wordt 'minder leven (foetale bewegingen) voelen tijdens de zwangerschap' gecodeerd?

### **Advies**

Codeer O36.8 'Overige gespecificeerde foetale problemen als indicatie voor zorg bij moeder'.

## 15-4 Spontane drielingbevalling in ziekenhuis

---

ingangsdatum: 01-03-2013

### **Vraag**

Hoe wordt een spontane drielingbevalling in het ziekenhuis gecodeerd?

### **Advies**

O30.1 (Drielingzwangerschap) voor de hoofdaandoening en Z37.5 (Overige meerlinggeboorten, allen levend geboren) voor het resultaat van de bevalling.

## 15-5 Gebruik O80-O84

---

ingangsdatum: 01-03-2013

**Vraag:**

Wanneer mag de codereeks O80-O84 (bevalling) worden gebruikt?

**Advies:**

Gebruik deze codereeks zoals aangegeven in de handleiding bij de hoofdstuk specifieke opmerkingen (paragraaf 4.5.4.)

- Als hoofddiagnose:

Codes uit dit blok mogen alleen worden gebruikt voor codering van de hoofdaandoening als geen enkele andere aandoening uit Hoofdstuk XV wordt vermeld.

- Als neventiagnose:

Als facultatief aanvullend kunnen deze codes worden gebruikt om een methode of type van bevalling aan te geven wanneer geen afzonderlijke rubriek of verrichtingenclassificatie voor dit doel wordt gebruikt.

**Toelichting:**

In principe zal een code uit de reeks O80-O84 nooit hoofddiagnose zijn omdat er een (medische) indicatie moet zijn om in de tweede of derde lijn te bevallen. Dit kan een huidig probleem/complicatie/aandoening zijn of een probleem/complicatie/aandoening in de anamnese.

Daarnaast geldt de regel dat een code uit de reeks O80-O84 alleen hoofddiagnose mag zijn als er geen enkele andere O-code is geregistreerd. Zodra er één of meerdere andere O-codes zijn geregistreerd mag een code uit de reeks O80-O84 dus geen hoofddiagnose zijn.

**Voorbeeld**

Opname voor electieve ongecompliceerde keizersnede op verzoek van patiënte, zonder medisch indicatie.

Codeer O82.0 'bevalling d.m.v. electieve keizersnede', als hoofddiagnose tenzij een andere O-code is geregistreerd.

N.B. een keizersnede zonder medische indicatie is (nog) niet gangbaar in Nederland.

## 15-6 Dreigende serotiniteit

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-04-2016

mutatiedatum: 01-01-2018

**Vraag**

Hoe wordt dreigende serotiniteit gecodeerd?

**Advies**

Codeer een opname vanwege dreigende serotiniteit met code O99.8 'overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren'.

## 15-7 Voortijdig breken van de vliezen

---

ingangsdatum: 15-01-2014

**Informatie**

Men spreekt van voortijdig breken van de vliezen als aansluitend hieraan geen weeënactiviteit optreedt. De term voortijdig gebroken vliezen zegt dus niks over de duur van de zwangerschap.

Zijn de vliezen voortijdig gebroken voor het einde van de 37e zwangerschapsweek, dan spreekt men ook wel van preterm premature rupture of the fetal membranes (PPROM).

Als de vliezen voortijdig zijn gebroken vanaf het einde van de 37e zwangerschapsweek, dan spreekt men van premature rupture of membrane (PROM).

Premature slaat in bovenstaande termen alleen op het voortijdig breken van de vliezen en niet op de duur van de zwangerschap. Preterm slaat wél op de zwangerschapsduur. Verwarrend is dat in plaats van premature soms de term prelabour wordt gebruikt (prelabor = vóór de latente en actieve fase met weeën tot aan de uitdrijving).

### Advies

- A. 042.0 “Voortijdig breken van de vliezen met begin van de weeën binnen 24 uur”  
Gebruik deze code als de weeën niet meteen aansluitend beginnen na het breken van de vliezen.
- B. 042.1 “Voortijdig breken van de vliezen met begin van de weeën meer dan 24 uur later”  
Gebruik deze code als de weeën meer dan 24 uur later beginnen na het breken van de vliezen (= langdurig gebroken vliezen).
- C. 042.2 “Voortijdig breken van vliezen met uitstel van bevalling door middel van therapie”  
Na toediening van bijvoorbeeld weeënremmers kunnen er 4 situaties ontstaan:
1. Weeënremmers hebben geen effect en de bevalling zet door: dan is gebruik van deze code niet van toepassing (zie A of B voor de juiste code).
  2. Weeënremmers hebben effect en de bevalling vindt in dezelfde opname plaats: codeer 042.2 en aanvullend het resultaat van de bevalling met een code uit Z37.-
  3. Weeënremmers hebben effect en de bevalling vindt niet tijdens deze opname plaats: codeer 042.2
  4. Weeënremmers hebben effect en de bevalling vindt in een latere heropname plaats: codeer 042.2 en aanvullend het resultaat van de bevalling met een code uit Z37.-
- D. Als er gedurende de opname voor voortijdig gebroken vliezen ook sprake is van premature weeën (voor het einde van de 37e zwangerschapsweek, PPRM), gebruik dan aanvullend een code uit categorie O60 “voortijdige weeën”. De exclusie bij O60 kan in dit geval worden genegeerd. De exclusies in de ICD-10 zijn er voor bedoeld om de voorkeurscode te bepalen.

## 15-8 Langdurige bevalling

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Langdurige bevalling

Categorie O63 “Langdurige bevalling” heeft in de ICD-10 betrekking op de periode als de bevalling op gang is gekomen. De codes uit deze categorie worden bijvoorbeeld gebruikt bij een verlengde ontsluitingsfase (1e fase), en een verlengde uitdrijvingsfase (2e fase). Het gebruik van deze codes heeft geen relatie met de codes uit categorie O42 “Voortijdig breken van vliezen”, het zijn 2 verschillende toestanden.

Daarom kunnen codes uit categorie O42 “Voortijdig breken van vliezen” en O63 “Langdurige bevalling” naast elkaar gebruikt worden als er bijvoorbeeld sprake is van voortijdig gebroken vliezen met in een latere fase een verlengde uitdrijving.

Codes 075.5 en 075.6

Gebruik deze codes alleen bij een langdurige/late bevalling na het (kunstmatig) breken van de vliezen als geen specificatie in categorie 042 en/of 063 mogelijk is.

#### **Advies**

- Gebruik een code uit categorie 063 “Langdurige bevalling”, ongeacht van het tijdstip waarop de vliezen zijn gebroken.
- Codes uit categorie 042 “Voortijdig breken van vliezen” en 063 “Langdurige bevalling” kunnen naast elkaar gebruikt worden als er bijvoorbeeld sprake is van voortijdig gebroken vliezen met in een latere fase een verlengde uitdrijving.
- Gebruik codes 075.5 en 075.6 alleen bij langdurige/late bevalling na het (kunstmatig) breken van de vliezen als geen specificatie in categorie 042 en/of 063 mogelijk is.

### 15-10 Pijnbestrijding bij de bevalling

---

ingangsdatum: 15-01-2014  
mutatiedatum: 01-01-2020 & 01-04-2021

#### **Vraag**

Hoe codeer je een opname voor pijnbestrijding (bijvoorbeeld epiduraal) bij de bevalling?

#### **Advies**

Codeer de medische indicatie voor de pijnbestrijding als hoofddiagnose.

Als de pijnbestrijding op verzoek van de patiënte wordt gegeven zonder medische noodzaak, bestaat er wel een indicatie om in het ziekenhuis te bevallen en codeer je het niet zozeer als een aandoening maar als een toestand, zoals bedoeld is met code 099.8 ‘overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren’.

Als de pijnbestrijding niet de reden van opname is, codeer je de medische indicatie voor de pijnbestrijding als nevendiagnose. Als de pijnbestrijding op verzoek van de patiënte wordt gegeven zonder medische noodzaak, leg je dat niet vast met 099.8 omdat pijnbestrijding een behandeling is en geen diagnose (zie codeadvies 21-12).

#### **Voorbeelden**

- Opname voor pijnbestrijding vanwege uitputting tijdens partus: 075.8 ‘overige gespecificeerde complicaties van bevalling’
- Opname voor pijnbestrijding op verzoek van patiënte: 099.8 ‘overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren’.
- Opname voor langdurige ontsluiting en in de loop van de bevalling wordt, op verzoek van patiënte, pijnbestrijding toegediend; de langdurige ontsluiting is de hoofddiagnose en voor de pijnbestrijding op verzoek wordt geen ICD-10 code geregistreerd.

### 15-12 Stuitligging/bevalling

---

ingangsdatum: 15-01-2014

#### **Vraag**

Hoe wordt een sectio i.v.m. stuitligging en hoe wordt een vaginale stuitbevalling gecodeerd?

#### **Advies**

Een geplande sectio i.v.m. stuitligging wordt gecodeerd met O32.1 “Stuitligging als indicatie voor zorg bij moeder”.

Een spoedsectio vanwege een mislukte vaginale stuitbevalling wordt gecodeerd met O64.1 “Moeilijke bevalling door stuitligging”.

Een vaginale stuitbevalling wordt gecodeerd met O64.1 “Moeilijke bevalling door stuitligging” ongeacht of dit door de specialist als moeilijke bevalling wordt omschreven.

Dit op basis van de alfabetische index:

Bevalling

- gecompliceerd (door)

- - stuitligging

De keuze voor een gecompliceerde bevalling is dat een stuitligging een risico vormt voor de bevalling.

## 15-13 Gebruik O35.-

---

ingangsdatum: 01-09-2014

### Vraag

Wanneer mag je een code uit de klasse O35 gebruiken?

### Advies

Gebruik alleen een code uit O35.- als er sprake is van een bekende of vermoede afwijking / schade aan de foetus die reden is van zorg bij de moeder. Medicatiegebruik op zich is bijvoorbeeld geen reden om code O35.5 te gebruiken. Er moet daadwerkelijk een reden voor zorg (bijvoorbeeld observatie of langere opnameduur) zijn.

Als er geen afwijking wordt vermoed of gebruik NNO:

- Roken tijdens zwangerschap; O99.3 + F17.1
- Alcoholgebruik tijdens zwangerschap; O99.3 + F10.1
- Drugsgebruik tijdens zwangerschap; O99.3 + F1-.1
- Medicatie gebruik tijdens zwangerschap: codeer de aandoening waarvoor de medicatie wordt gegeven (O-code en eventueel aanvullende code ter specificatie) + Z92.2
- Alcohol, roken, drugs tijdens (begin) van de zwangerschap maar niet meer bij huidige opname; O99.8 + Z86.4

## 15-14 GBS-dragerschap bij zwangerschap en bevalling

---

ingangsdatum: 01-09-2014

mutatiedatum: 01-01-2020

### Vraag

Hoe wordt GBS-dragerschap bij een zwangerschap en bevalling gecodeerd?

### Advies

GBS-dragerschap bij zwangerschap en bevalling wordt gecodeerd met code O99.8 ‘overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren’ en aanvullend met Z22.3 ‘Drager van overige gespecificeerde bacteriële ziekten’ ter specificatie van de GBS-dragerschap.

### Toelichting:

GBS-dragerschap op zich is geen aandoening, maar wel een indicatie om klinisch te bevallen. Dit wordt niet zozeer als een aandoening gecodeerd, maar als een toestand, zoals bedoeld wordt

met code O99.8 'overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren'.

## 15-15 Bekkeninstabiliteit

---

ingangsdatum: 01-01-2015  
vervangt: CvZ advies nieuwsbrief 3-1998

### **Bekkeninstabiliteit**

Tijdens de zwangerschap verslappen bepaalde ligamenten wat soms leidt tot bekkeninstabiliteit.

#### **Advies**

De volgende vier mogelijkheden kunnen worden onderscheiden:

1. Code O71.6 "Obstetrische beschadiging van bekkengewrichten en ligamenten"  
Deze code reserveren we daarom voor bekkeninstabiliteit veroorzaakt door beschadigingen tijdens de bevalling.
2. Code O34.8 "Overige gespecificeerde afwijkingen van bekkenorganen als indicatie voor zorg bij moeder".  
Deze code mag alleen gebruikt worden voor aandoeningen die op zichzelf geen relatie met de huidige zwangerschap hebben. Het gaat om aandoeningen die al bestonden en nu verergeren of een complicatie vormen. De bekkeninstabiliteit berust meestal op een aandoening uit hoofdstuk XIII (botspierstelsel). Gebruik aanvullend code M24.25 "Aandoening van ligament" om de aandoening te specificeren.
3. Code O26.8 "Overige gespecificeerde aandoeningen verband houdend met de zwangerschap"  
Dit is de enige mogelijkheid om een bekkeninstabiliteit aan te geven die ontstaan is door de huidige zwangerschap. Gebruik aanvullend code M24.25 "Aandoening van ligament; Bekkengebied en bovenbeen" om de aandoening te specificeren.
4. Code M24.25 "Aandoening van ligament; Bekkengebied en bovenbeen". Als er buiten de zwangerschap (ná de kraambedperiode) (nog) sprake is van bekken- instabiliteit dan kan code M24.25 (Alfa: Slap, ligament) daarvoor worden gebruikt.

## 15-16 Hoofddiagnose bij bevallingen

---

ingangsdatum: 01-01-2015

### **Codeadvies**

De indicatie voor klinische zorg bepaalt de hoofddiagnose.

### **Toelichting**

De definitie van hoofddiagnose in de LBZ luidt: de diagnose die achteraf, dus bij ontslag, wordt beschouwd als de reden van de opname in het ziekenhuis.

De hoofddiagnose betreft dus de reden van de opname. De reden van opname is veelal de bevalling. Codeer je nu de medische indicatie als hoofddiagnose of bijvoorbeeld een tijdens de opname optredende fluxus?

Onderstaande stappenplan is een hulpmiddel om tot de juiste hoofddiagnose te komen

Opmerking:

Codes uit de range O80-O84 'Bevalling' worden alleen gebruikt als geen enkele andere aandoening uit het hoofdstuk Zwangerschap, bevalling en kraambed, wordt vermeld.

## **Stappenplan om te komen tot de hoofddiagnose met betrekking tot het coderen van bevallingen.**

### Stap 1

Is patiënte opgenomen vanwege een complicatie van de zwangerschap waarbij de bevalling heeft plaatsgevonden tijdens de opname?

Zo ja → ga naar stap 2

Zo nee → ga naar stap 3

### Stap 2

Codeer de zwangerschapscomplicatie als hoofddiagnose.

### Stap 3

Ga na of er vòòr de opname een medische indicatie is waarvoor de bevalling in het ziekenhuis moet plaatsvinden.

Zo ja → ga naar stap 4

Zo nee → ga naar stap 7

### Stap 4

Ga na of de medische indicatie betrekking heeft op de huidige opname.

Zo ja → ga naar stap 5

Zo nee → ga naar stap 6

### Stap 5

Medische indicatie heeft betrekking op de huidige opname:

Codeer de medische indicatie als hoofddiagnose

### Stap 6

Medische indicatie betreft verloskundige anamnese van huidige of voorgaande zwangerschap maar speelt bij huidige opname geen rol meer:

Codeer

- bij een ongecompliceerde bevalling:

099.8 + Z35.- 'controle van zwangerschap met verhoogd risico [high-risk]' (de anamnese is de medische indicatie voor de klinische bevalling)

- bij een gecompliceerde bevalling:

codeer de belangrijkste complicatie als hoofddiagnose en aanvullend Z35.- 'controle van zwangerschap met verhoogd risico [high-risk]' (of andere relevante code voor de anamnese).

### Stap 7

Ga na of er een kunstverlossing heeft plaatsgevonden (onder kunstverlossing wordt verstaan: een sectio, vacuüm of forceps)

Zo ja → ga naar stap 8

Zo nee → ga naar stap 9

### Stap 8

Codeer de indicatie voor de kunstverlossing als hoofddiagnose.

### Stap 9

Codeer de belangrijkste complicatie als hoofddiagnose.

## **Voorbeelden:**

### Voorbeeld 1

Medische indicatie: negatieve dyscongruentie

Verloop: chemische inleiding; perineumruptuur

Hoofddiagnose: negatieve dyscongruentie (stappen: 1,2)  
nevendiagnose perineumruptuur

**Voorbeeld 2**

Medische indicatie: infertiliteit in anamnese  
Verloop: foetale nood waarvoor vacuümextractie en fluxus postpartum  
Hoofddiagnose foetale nood (stappen: 1,3,4,6)  
Nevendiagnose fluxus postpartum  
Nevendiagnose infertiliteit in anamnese

**Voorbeeld 3**

Medische indicatie: sectio in anamnese  
Verloop foetale nood waarvoor sectio  
Hoofddiagnose uteruslitteken na vroegere operatie als indicatie voor zorg bij moeder (stappen: 1,3,4,5)  
Nevendiagnose foetale nood

**Voorbeeld 4**

Medische indicatie: Totaal ruptuur in de anamnese  
Verloop: perineumruptuur  
Hoofddiagnose litteken van vulva en perineum na eerdere totaal ruptuur (stappen: 1,3,4,5)  
Nevendiagnose perineumruptuur

## 15-17 Afbreken zwangerschap vanwege foetale afwijking

---

ingangsdatum: 01-01-2015  
mutatiedatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Welke code is hoofddiagnose bij het afbreken van een zwangerschap vanwege een afwijking bij het kindje?

**Advies**

Hoofddiagnose O35.- 'Indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede afwijkingen van of schade aan foetus' en aanvullend O04.- 'Medische abortus'

**Toelichting**

De indicatie voor het afbreken van de zwangerschap is de hoofddiagnose. Aanvullend wordt aangegeven dat het een therapeutisch afgebroken zwangerschap betreft. Code O04 is hier de passende code voor, ongeacht de zwangerschapsduur.  
NB Z37.- 'Resultaat van bevalling' aanvullend coderen bij een lichaamsgewicht van minimaal 500 gram. Als het gewicht niet bekend is geldt een zwangerschapsduur van minimaal 22 weken (zie deel 2 van de ICD-10 paragraaf 5.7.2).

**voorbeeld 1**

Afbreken zwangerschap in de 12<sup>e</sup> week vanwege een chromosoomafwijking van het kindje.  
Code O35.1 '(Vermoede) chromosoomafwijking bij foetus als indicatie voor zorg bij moeder'  
+  
Code O04.9 'Medische abortus'

**voorbeeld 2**

Late zwangerschapsafbreking in de 28<sup>e</sup> week vanwege anencefalie van het kindje.

Code O35.0 '(Vermoede) misvorming van centraal zenuwstelsel van foetus als indicatie voor zorg bij moeder'

+

Code O04.9 'Medische abortus'

+

Resultaat van de bevalling Z37.-

## 15-18 HIV-positiviteit bij zwangerschap en bevalling

---

ingangsdatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-01-2020

### Vraag

Hoe wordt HIV-positiviteit bij een zwangerschap en bevalling gecodeerd?

### Advies

HIV-positiviteit bij zwangerschap en bevalling wordt gecodeerd met code O99.8 'overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren' en aanvullend met Z21 'Status van asymptomatische infectie met humaan immunodeficiëntievirus [HIV]' ter specificatie van de HIV-positiviteit.

### Toelichting:

HIV-positiviteit op zich is geen aandoening, maar wel een indicatie om klinisch te bevallen. Dit wordt niet zozeer als een aandoening gecodeerd, maar als een toestand, zoals bedoeld wordt met code O99.8 'overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren'.

## 15-19 O-codes bij andere specialismen dan gynaecologie

---

ingangsdatum: 01-07-2018 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-01-2020

### Vraag

Hoe codeer je een aandoening bij een zwangere patiënte die is opgenomen voor een ander specialisme dan gynaecologie?

### Advies

- Een aandoening gerelateerd aan de zwangerschap of kraambed wordt gecodeerd met een O-code.
- Een aandoening niet gerelateerd aan de zwangerschap, bevalling of kraambed wordt gecodeerd met een code uit het betreffende hoofdstuk, tenzij de ICD-10 een O-code aangeeft.

Indien de opname tijdens de zwangerschap plaatsvindt, en je geen O-code registreert op basis van bovenstaande advies, codeer dan aanvullend code Z33 'zwangerschap als bijkomstige bevinding'.

### Toelichting

Een patiënte met een aandoening tijdens de zwangerschap en het kraambed, zal in de regel door de gynaecoloog worden opgenomen, tenzij de zorgvraag geen relatie tot de zwangerschap heeft en/of door een ander specialisme behandeld dient te worden.

Niet alle aandoeningen die zich tijdens de zwangerschap of het kraambed voordoen hebben een relatie tot, of zijn van invloed op, de zwangerschap of het kraambed. In die gevallen is een O-code niet van toepassing en worden eventuele exclusies op hoofdstukniveau niet gevolgd.

### Voorbeelden

- Zwangere patiënte wordt opgenomen vanwege een galsteenaanval
  - Opname voor heelkunde: hoofddiagnose K80.2 + aanvullend Z33
  - Opname voor gynaecologie: hoofddiagnose O99.6 + aanvullend K80.2
- Opname 2 weken postpartum vanwege een mastitis
  - Opname voor heelkunde: O91.2 'mastitis, - tijdens zwangerschap, kraambed of postpartum'
  - Opname voor gynaecologie: O91.2 'mastitis, - tijdens zwangerschap, kraambed of postpartum'
- Overname interne geneeskunde vanwege postpartum ontstane acute nierinsufficiëntie, leverfunctiestoornis en hemolytisch-uremisch syndroom
  - (NAS) O90.4 'acute nierinsufficiëntie 'post partum'
  - (NAS) O26.6 'leveraandoening tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed'
  - (NAS) O99.0 'anemie die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceert' + D59.3 'hemolytisch-uremisch syndroom' ter nadere specificatie
- Opname bij inwendige geneeskunde vanwege ontregelde DM1 tijdens zwangerschap
  - O24.0 'type 1 'diabetes mellitus' reeds bestaand'

## 15-20 Zwangerschapsduur missed abortion en intra-uteriene vruchtdood

---

ingangsdatum: 01-07-2018 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Bij welk aantal zwangerschapsweken ligt de grens voor de registratie van een missed abortion en een intra-uteriene vruchtdood.

### Advies

Bij een missed abortion (O02.1) wordt een zwangerschapsduur tot 16 weken aangehouden. Een (vroeg) vruchtdood bij een zwangerschapsduur vanaf 16 weken wordt vastgelegd met O36.4 'intra-uteriene vruchtdood als indicatie voor zorg bij moeder'.

NB voor IUVD geldt dat Z37.- 'Resultaat van bevalling' aanvullend gecodeerd wordt bij een lichaamsgewicht van minimaal 500 gram. Als het gewicht niet bekend is, geldt een zwangerschapsduur van minimaal 22 weken (zie deel 2 van de ICD-10 paragraaf 5.7.2).

## 15-21 Angst voor de bevalling

---

ingangsdatum: 01-01-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je angst voor de bevalling?

### Advies

Angst voor een bevalling codeer je met

O99.3 'Psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren'  
& aanvullend

F40.2 'Specifieke (geïsoleerde) fobieën'

### **Toelichting**

Een specifieke fobie komt slechts voor onder zeer specifieke omstandigheden, zoals vliegangst en angst voor de tandarts en sluit daarbij goed aan bij angst voor de bevalling.

### **Voorbeeld**

Patiënt met angst voor de bevalling wordt gepland opgenomen voor een inleiding en bij de baring ontstaat een tweedegraads perineumruptuur. Het resultaat van de bevalling is een gezonde zuigeling.

Codes O99.3 + F40.2 + O70.1 + Z37.0

## 15-22      **Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed**

---

ingangsdatum:            01-01-2020

### **Vraag**

Hoe codeer je een persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed?

### **Advies**

Bij het coderen van een persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed worden twee situaties onderscheiden:

1. Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed tijdens huidige zwangerschap, bevalling of kraambed: codeer code Z35.- 'controle van zwangerschap met verhoogd risico [high risk]'
2. Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed zonder huidige zwangerschap, bevalling of kraambed: codeer Z87.5 'Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed'

### **Toelichting**

De alfabetische index geeft bij voorgaande obstetrische problemen, met invloed op de zwangerschapsbegeleiding, code Z35.-.

Bijvoorbeeld bevalling, - prematuur, - - voorafgaand, met invloed op zwangerschapsbegeleiding Z35.2.

NB. In het verleden is het advies gegeven om code Z35.- niet te gebruiken bij opnamen voor bevallingen maar dat blijkt bij nader inzien niet correct.

### **Voorbeelden**

1. Opname voor klinische bevalling op medische indicatie, vanwege schouderdystocie in de voorgeschiedenis: O99.8 'overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren' + Z35.2 'controle van zwangerschap met anderszins belaste verloskundige anamnese en voortplantingsanamnese' + Z37.- om het resultaat van de bevalling vast te leggen

Alfabetisch zoekpad voor Z35.2:

zwangerschap  
- begeleiding

- - belaste obstetrische anamnese (aandoening in O10-O92) Z35.2
- 2. Observatie vanwege zwangerschapshypertensie, waarbij er een pre-eclampsie in de voorgeschiedenis is vermeld: O13 'zwangerschapshypertensie' + Z35.2 'controle van zwangerschap met anderszins belaste verloskundige anamnese en voortplantingsanamnese'  
Zoekpad Z35.2 zie voorbeeld 1
- 3. Opname voor excisie leiomyoom van de uterus die in het verleden tijdens een zwangerschap tot een voortijdige bevalling heeft geleid. D25.9 + Z87.5  
Alfabetisch zoekpad voor Z87.5:  
anamnese (persoonlijk) (met)(van)
  - aandoening
  - - obstetrisch Z87.5

## 16-1 BRUE/ALTE

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-01-2021 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ advies nieuwsbrief 10-1994

### Vraag

Hoe wordt een 'brief resolved unexplained event' (BRUE) of een 'apparent life-threatening event' (ALTE) gecodeerd?

### Advies

- Codeer bij BRUE/ALTE het meest specifieke symptoom als hoofddiagnose (zie voor de codering bij de leeftijd t/m 28 dagen codeadvies 16-4)
- Codeer voor BRUE/ALTE NNO
  - t/m de leeftijd van 28 dagen:  
P96.8 'overige gespecificeerde aandoeningen, ontstaan in perinatale periode' en aanvullend R68.1 'Niet-specifieke symptomen typisch voor kinderleeftijd'
  - na de leeftijd van 28 dagen:  
R68.1 'Niet-specifieke symptomen typisch voor kinderleeftijd'

### Toelichting

Bij BRUE/ALTE is het soms lastig vast te stellen wat er precies aan de hand is, het is vaak een (thuis)observatie door de ouders van een plotseling en onverwacht optredende schijnbaar levensbedreigende situatie bij een tevoren gezond kind.

## 16-2 Zuigeling van moeder met diabetes tijdens zwangerschap zonder gevolgen voor het kind

---

ingangsdatum: 01-09-2014

### Vraag

Opname zuigeling van een moeder met diabetes tijdens de zwangerschap. Het kind wordt opgenomen ter observatie. De diabetes blijkt geen gevolgen te hebben gehad voor het kind.

Informatie:

In tegenstelling tot de inclusie onder blok P00-P04 mogen deze codes ook gebruikt worden in die gevallen waarin pathologie afwezig is en de wenselijkheid bestaat om de 'behoefte aan extra zorg / extra aandacht' bij een pasgeborene vast te leggen.

## Advies

Codeer de behoefte aan extra zorg / extra aandacht bij:

- Kind van moeder met diabetes gravidarum met P01.8 "Gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde zwangerschapscomplicatie bij moeder".
- Kind van moeder met een bestaande diabetes met P00.8 "Gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde aandoeningen van moeder".

## 16-3 Behoefte aan extra zorg/aandacht/observatie bij gezonde neonaten

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 24.1

### Vraag

Hoe wordt de behoefte aan extra zorg bij een gezonde neonat gecodeerd?

### Advies

Behoefte aan extra zorg/aandacht/observatie bij gezonde neonaten kan worden vastgelegd met een code uit de reeks P00-P04 'Gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van de moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling'.

### Toelichting

In tegenstelling tot de inclusie onder blok P00-P04 mogen deze codes ook gebruikt worden in die gevallen waarin pathologie afwezig is maar de wenselijkheid bestaat om de 'behoefte aan extra zorg / extra aandacht' bij een pasgeborene vast te leggen.

Volgorde van vastleggen

- indien de neonat is opgenomen bij een gynaecoloog, codeer deze behoefte aan extra zorg dan met een code uit P00-P04 als **nevendiagnose**. Codeer Z38.- 'Levendgeboren zuigeling naar plaats van geboorte' als hoofddiagnose.
- indien de neonat is opgenomen bij een kinderarts codeer deze behoefte aan extra zorg dan als **hoofddiagnose**. Codeer Z38.- 'Levendgeboren zuigeling naar plaats van geboorte' als nevendiagnose.

Code Z38.- wordt alleen gecodeerd bij het specialisme waarvoor het kind als eerste is opgenomen.

### Voorbeelden

Gezonde zuigeling, ivm chemische inleiding opgenomen voor extra zorg/aandacht/observatie

- indien opname voor gynaecoloog: Z38.- en aanvullend P03.8
- indien opname voor kinderarts: P03.8 en aanvullend Z38.-

Gezonde zuigeling, ivm sectio opgenomen voor extra zorg/aandacht/observatie

- indien opname voor gynaecoloog: Z38.- en aanvullend P03.4
- indien opname voor kinderarts: P03.4 en aanvullend Z38.-

zie ook CA 16-2

## 16-4 Perinatale en neonatale aandoeningen

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 4.6  
mutatiedatum: 01-10-2016

## **Vraag**

Tot welke leeftijd mogen perinatale en neonatale aandoeningen uit hoofdstuk XVI (P00-P96) worden gecodeerd?

## **Advies**

Gebruik codes uit hoofdstuk XVI als samenhang met de geboorte (de perinatale periode) of de neonatale periode vaststaat.

Bij aandoeningen waarvoor zowel in hoofdstuk XVI als elders codes bestaan, wordt als grens de leeftijd t/m 28 dagen na de geboorte afgesproken.

## **Toelichting**

Onder perinataal verstaan we de periode kort voor en kort na de geboorte. Voor pasgeborenen/neonaten (ook onderdeel van hoofdstuk XVI) wordt als leeftijdsgrens 28 dagen afgesproken.

We volgen hier de inclusie bij hoofdstuk XVI op pagina XVI.1: 'aandoeningen ontstaan in perinatale periode, ook al doet sterfte of ziekte zich later voor'.

Voorwaarde is dat de oorsprong van de aandoening in de perinatale of neonatale periode ligt en dat de aandoening nog actueel is.

Om aan te geven dat er een niet actueel probleem uit de perinatale/neonatale periode van invloed is op de huidige zorgperiode kan Z87.6 'Persoonlijke anamnese met bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode' aanvullend worden gecodeerd.

## **Voorbeelden**

- Erbse paralyse ontstaan door geboortetrauma P14.0 'Paralyse van Erb door geboortetrauma'. Deze paralyse is ontstaan bij de geboorte en niet meer hersteld, dus nog actueel en te coderen in dit hoofdstuk.
- Taalstoornis toegeschreven aan cerebrale bloeding door geboortetrauma F80.9 'Ontwikkelingsstoornis van spraak of taal, niet gespecificeerd' + Z87.6 'Persoonlijke anamnese met bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode'. De taalstoornis is het gevolg van de cerebrale bloeding maar de bloeding is nu niet meer actueel, deze wordt aanvullend gecodeerd met een code voor de aandoening in de anamnese (Z87.6).
- Hypoglykemie bij pasgeborene (leeftijd 3 weken) P70.4 'Overige neonatale hypoglykemie'  
Idem op leeftijd van 6 weken E16.1 'Overige gespecificeerde vormen van hypoglykemie' (als geen samenhang met de geboorte wordt aangegeven, zoekpad: hypoglykemie, infantiel) (bij wel samenhang P70.4)

## **Stappenplan bij codering van perinatale en neonatale aandoeningen**

### **Stap 1**

Is patiënt bij ontstaan<sup>12</sup> van de aandoening ouder dan 28 dagen?

Zo ja → ga naar stap 2a of 2b

Zo nee → ga naar stap 3

### **Stap 2a**

<sup>12</sup> Het zal niet altijd duidelijk zijn op welke levensdag een aandoening is ontstaan. Als dat niet te achterhalen is wordt gecodeerd alsof de aandoening is ontstaan in de periode t/m 28 dagen na de geboorte

Patiënt is bij ontstaan van de aandoening ouder dan 28 dagen en de oorsprong van de aandoening is niet gelegen in de perinatale of neonatale periode → codeer de aandoening niet met een code uit hoofdstuk XVI (P00-P96).

#### Stap 2b

Patiënt is bij ontstaan van de aandoening ouder dan 28 dagen maar de oorsprong van de aandoening ligt in de perinatale of neonatale periode → codeer de aandoening volgens dit codeadvies (16-4 'Perinatale en neonatale aandoeningen').

#### Stap 3

Zoek de betreffende aandoening op in de alfabetische lijst, geeft deze een suggestie voor een P-code?

Zo ja → codeer, na controle in de systematische lijst, de P-code

Zo nee → ga naar stap 4

#### Stap 4

Wordt in de alfabetische lijst een suggestie gegeven voor een code buiten het P-hoofdstuk?

Zo ja → ga naar stap 5

Zo nee → ga naar stap 7

#### Stap 5

Geldt voor de voorgestelde code een exclusie<sup>13</sup> voor bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale of neonatale periode (P00-P96)?

Zo ja → ga naar stap 6

Zo nee → codeer, na controle in de systematische lijst, de voorgestelde code

#### Stap 6

Staat bij de exclusie een suggestie voor een P-code?

Zo ja → codeer, na controle in de systematische lijst, de voorgestelde code<sup>14</sup>

Zo nee → ga naar stap 7

#### Stap 7

Hoe ga je te werk als de te coderen aandoening niet in de alfabetische lijst staat of als er een exclusie geldt bij de voorgestelde code zonder dat een suggestie voor een P-code wordt gegeven?

1. Kies binnen welk blok van hoofdstuk XVI de aandoening valt (zie pagina XVI.1 van de systematische lijst)
2. Kies binnen het blok de meest passende code. Indien gewenst kan een code uit één van de andere hoofdstukken aanvullend worden gecodeerd voor verdere specificatie van de aandoening

#### Voorbeelden:

1. Neonatale pneumonie ontstaan op de 3e dag na geboorte  
Code P23.9 'congenitale pneumonie, niet-gespecificeerd' (stappen 1→ 3)

<sup>13</sup> Let op: de exclusie kan aan het begin van het hoofdstuk staan maar ook aan het begin van een blok of bij de betreffende code zelf

<sup>14</sup> Indien gewenst kan de P-code voor nadere specificatie aangevuld worden met een code uit één van de andere hoofdstukken. Dit mag ook de code zijn waarbij de exclusie voor de P-code is opgenomen. De exclusies in de ICD-10 zijn er namelijk voor het bepalen van de voorkeurscode. Als je via de exclusie in een klasse uitkomt waar de term minder specifiek is beschreven, mag je aanvullend specificeren als daarmee het ziektebeeld beter beschreven wordt.

2. Neonataal herseninfarct ontstaan op 10e dag na geboorte  
Code P29.8 'overige gespecificeerde cardiovasculaire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode' + I63.9 'cerebraal infarct niet-gespecificeerd' (stappen: 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7)
3. Bradycardie direct na de geboorte  
Code P29.1 'neonatale cardiale-dysritmie' + R00.1 'bradycardie, niet-gespecificeerd' (stappen 1 → 3 → 4 → 5 → 6)
4. Meningokokkenmeningitis ontstaan op 21e dag na geboorte  
Code A39.0† 'meningitis door meningokokken' + G01\*'meningitis bij elders geclassificeerde bacteriële-ziekten' (stap 1 → 3 → 4 → 5)  
Toelichting: de exclusies aan het begin van hoofdstuk 1 en bij blok P35-P39 geven aan dat infecties die bij de geboorte aanwezig zijn worden vastgelegd met een P35-P39 (behalve waar een exclusie binnen dit blok een andere code geeft) en dat infecties ontstaan na de geboorte worden vastgelegd met A00-B99/J09-J11 (behalve waar een exclusie bij één van deze codes een P-code geeft).  
Als onduidelijk is of de infectie bij geboorte aanwezig was of ontstaan is na de geboorte, wordt gecodeerd aan de hand van de codes en aanwijzingen bij blok P35-P39.
5. Streptokokkensepsis ontstaan op de 10e dag na geboorte  
Code P36.1 'sepsis van pasgeborene door overige en niet-gespecificeerde streptokokken' (stappen 1 → 3)  
Toelichting: zie voorbeeld 4, omdat de infectie na de geboorte is ontstaan word je in eerste instantie gewezen op code A40.9 maar omdat daar een exclusie voor neonataal staat, kom je uit op code P36.1.
6. Persistierende anemie bij prematuur geboren kind van 8 weken oud  
Code P61.2 'anemie bij praematuritas' (stappen 1 → 2)
7. Opname van kind van 2 weken oud met RS bronchiolitis  
Code P28.8 'overige gespecificeerde respiratoire aandoeningen van pasgeborene' + J21.0 'acute bronchiolitis door respiratoir-syncytieel virus' (stappen 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7)
8. Pneumonie ontstaan op de 30e dag van de opname van een in het ziekenhuis geboren kind  
Code J18.9 'pneumonie, niet gespecificeerd' (stappen 1 → 2)  
Opmerking: Als de termijn waarop de aandoening ontstaat niet duidelijk is wordt gecodeerd aan de hand van de richtlijnen voor de perinatale periode (dus leeftijd ≤ 28 dagen hierbij aanhouden).
9. Meningitis ontstaan op de 14e dag na de geboorte  
Code P96.8 'overige gespecificeerde aandoeningen, ontstaan in de perinatale periode + G03.9 'meningitis, niet gespecificeerd' (stappen 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7)

### **Keuze van de hoofddiagnose**

Bij meerdere aandoeningen van de pasgeborene kan het lastig zijn te bepalen wat de hoofddiagnose is. Dit moet door de specialist worden aangegeven. Als de specialist dat niet doet en de codeur kan de keuze niet maken, codeer dan de eerst genoemde aandoening als hoofddiagnose (zie hiervoor de aanwijzing in deel 2 van de ICD-10 bij paragraaf 4.5.3. MB2).

## 16-5 Pasgeborene van moeder met GBS-infectie, pasgeborene geen infectie

ingangsdatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Wat is de juiste code voor een pasgeborene waarvan de moeder een GBS-infectie heeft maar de pasgeborene deze infectie niet heeft?

**Advies**

Pasgeborene van moeder met GBS-infectie: P00.8 'gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde aandoening van moeder' (zie exclusie bij P00.2).

**Toelichting**

In tegenstelling tot de inclusie boven hoofdstuk XVI mogen de codes uit P00-P04 ook gebruikt worden in die gevallen waarin pathologie afwezig is en de wenselijkheid bestaat om de 'behoefte aan extra zorg / extra aandacht' bij een pasgeborene vast te leggen.

---

## 16-6 Pasgeborene van moeder met HIV-infectieziekte, pasgeborene geen infectie

---

ingangsdatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

mutatiedatum: 01-10-2016

**Vraag**

Wat is de juiste code voor een pasgeborene waarvan de moeder een HIV-infectieziekte heeft maar de pasgeborene deze infectie niet heeft?

**Advies**

Pasgeborene van moeder met een HIV-infectieziekte: P00.2 'gevolgen voor foetus en pasgeborene door infectieziekten en parasitaire aandoening van moeder'

**Toelichting**

In tegenstelling tot de inclusie boven hoofdstuk XVI mogen de codes uit P00-P04 ook gebruikt worden in die gevallen waarin pathologie afwezig is en de wenselijkheid bestaat om de 'behoefte aan extra zorg / extra aandacht' bij een pasgeborene vast te leggen.

---

## 16-7 Pasgeborene van moeder met GBS- of HIV-dragerschap, pasgeborene geen infectie

---

ingangsdatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

**Vraag**

Wat is de juiste code voor een pasgeborene waarvan de moeder draagster is van GBS of HIV en de pasgeborene geen van deze infecties heeft?

**Advies**

Voor zowel de pasgeborene van een moeder met GBS-dragerschap als een moeder met HIV-dragerschap wordt code P00.8 'gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde aandoening van moeder' vastgelegd.

**Toelichting**

In tegenstelling tot de inclusie boven hoofdstuk XVI mogen de codes uit P00-P04 ook gebruikt worden in die gevallen waarin pathologie afwezig is en de wenselijkheid bestaat om de 'behoefte aan extra zorg / extra aandacht' bij een pasgeborene vast te leggen.

## 16-8 Pasgeborene zowel prematuur als dysmatuur

---

ingangsdatum: 01-10-2014 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Wat is de juiste hoofddiagnose als een pasgeborene zowel prematuur als dysmatuur is?

### Advies

Als een kindje zowel prematuur als dysmatuur is wordt als hoofddiagnose de aandoening vastgelegd die beschouwd wordt als de belangrijkste reden tot opname. Dit zal veelal de prematuriteit zijn maar kan ook, als het achterblijven van de foetale groei de belangrijkste reden voor zorg is, de dysmaturiteit zijn.

Als niet duidelijk blijkt of de prematuriteit of de dysmaturiteit de belangrijkste reden tot opname was codeer dan de prematuriteit als hoofddiagnose.

### Toelichting

Dysmatuur geboren baby's hebben een te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap. Dit wordt vastgelegd met code P05.0 'Licht voor zwangerschapsduur'. Prematuur geboren baby's worden geboren na een zwangerschap van minder dan 37 voltooide weken. Dit wordt vastgelegd met code P07.- 'Stoornissen gerelateerd aan korte zwangerschapsduur en laag geboortegewicht, niet elders geclassificeerd'.

Een laag geboorte gewicht dat gerelateerd is aan de zwangerschapsduur valt ook binnen code P07.-. Bij P07 staat een aanwijzing dat, wanneer zowel het geboortegewicht als de zwangerschapsduur bekend zijn, het geboortegewicht prevaleert. Let wel; dit gaat om een laag geboorte gewicht gerelateerd aan de zwangerschapsduur. Als er sprake is van een laag geboorte gewicht door trage foetale groei of foetale ondervoeding wordt dat vastgelegd met P05.- (zie de exclusie bij P07).

### Voorbeelden

1. Prematuur geboren bij een zwangerschapsduur van 36 weken en 5 dagen, en dysmatuur met een geboortegewicht van 1800 gram. Vanwege het lage geboortegewicht moet het kindje in de couveuse verpleegd worden.  
Hoofddiagnose P05.0 'Licht voor zwangerschapsduur' + P07.1 'Laag geboortegewicht, overig' + P07.3 'Overige preterme kinderen'
2. Prematuur geboren bij zwangerschapsduur van 27 weken en geboortegewicht 900 gram.  
Hoofddiagnose P07.0 'Extreem laag geboortegewicht' + P07.2 'Extreme immaturiteit'
3. Prematuur geboren bij 32 weken en dysmatuur geboortegewicht van 1100 gram.  
Vanwege de prematuriteit wordt het kindje op de NICU verpleegd.  
Hoofddiagnose P07.1 'Laag geboortegewicht, overig' + P07.3 'Overige preterme-kinderen' + P05.0 'licht voor zwangerschapsduur'

NB Bij overplaatsingen aansluitend aan de geboorte van prematuren en dysmaturen wordt, indien relevant voor de opname, het oorspronkelijke geboortegewicht en zwangerschapsduur gecodeerd.

### Bijvoorbeeld:

premauur van 26 weken en 800 gram geboren in academisch centrum en na 6 weken overgeplaatst naar perifeer ziekenhuis. Inmiddels weegt het kindje 1200 gram. In het perifere ziekenhuis worden (net als in het academisch centrum) codes P07.0 'Extreem laag geboortegewicht' + P07.2 'Extreme immaturiteit' geregistreerd.

## 17-1 Pitt-Hopkins syndroom

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
 mutatiedatum: 01-01-2022

### Vraag

Hoe wordt het Pitt-Hopkins syndroom gecodeerd?

### Advies

Codeer Q87.0 'congenitale gestoorde ontwikkelingsyndromen waarbij voornamelijk aangezicht is aangedaan'.

## 17-2 Cheilognatopalatoschisis

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
 mutatiedatum: 01-09-2014  
 vervangt: CvZ aca 14.5

### Vraag

Hoe wordt cheilognatopalatoschisis gecodeerd?

Informatie:

Cheilognatopalatoschisis is niet als geheel opgenomen in de ICD-10. Het gespleten kaakgedeelte ontbreekt in de omschrijving van codes uit klasse Q37.

### Advies

Codeer hier aanvullend. Codeer Q37.- "Gespleten gehemelte met gespleten lip" en aanvullend Q67.4 "Overige congenitale misvormingen van schedel, aangezicht en kaak" voor de kaakspleet.

## 17-3 Gecorrigeerde congenitale afwijkingen

---

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een congenitale aandoening waarvoor operatieve correctie heeft plaatsgevonden?

### Advies

Codeer een congenitale afwijking

1. waarbij de 'natuurlijke' anatomische situatie en functie is hersteld met code Z87.7 'Persoonlijke anamnese met congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen'. Indien wenselijk kan met een Z-code de postoperatieve toestand worden gespecificeerd.
2. waarbij de 'natuurlijke' anatomische situatie en/of functie niet volledig is hersteld met de (resterende) congenitale aandoening. Codeer aanvullend met een Z-code de postoperatieve toestand.

### Toelichting

Bij het coderen van een (dag)opname is het van belang om de actuele reden van zorg voor de patiënt vast te leggen. Als een congenitale aandoening is hersteld, is deze niet meer aanwezig en

dient niet gecodeerd te worden. Soms kan het relevant zijn om vast te leggen dat er een congenitale aandoening in het verleden was en in dat geval is bovenstaand advies nummer 1 van toepassing.

*Bijvoorbeeld*

Cervixinsufficiëntie bij status na excisie van embryonale cyste van de cervix.

N88.3 'Cervixinsufficiëntie' + Z87.7 'Persoonlijke anamnese met congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen'

Als de congenitale aandoening niet volledig anatomisch en/of functioneel hersteld is èn relevant is voor de huidige (dag)opname dan is de oorspronkelijke congenitale aandoening nog reden tot zorg en geldt bovenstaande advies nummer 2.

*Bijvoorbeeld*

Decompensatio cordis bij patiënt met status na operatieve correctie tetralogie van Fallot.

Omdat een operatieve correctie bij deze aandoening niet tot een volledig normaal anatomisch hart zal leiden is de codering als volgt: I50.9 'Hartdecompensatie, niet gespecificeerd' + Q21.3 'Tetralogie van Fallot'

## 18-1 Huilbaby

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
vervangt: CvZ aca 20.3

**Vraag**

Hoe wordt een huilbaby gecodeerd?

**Advies**

Codeer R68.1 (Overmatig huilen van kind).

## 18-2 Verhoogd PSA

---

ingangsdatum: 01-03-2013

**Vraag**

Hoe wordt een verhoogd PSA gecodeerd?

Informatie:

PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigeen en dit wordt gemeten in het serum.

**Advies**

Gebruik zoekpad: Abnormale bevinding > immunologisch > immunologische bevinding > serum.  
Codeer R76.8 (Overige gespecificeerde afwijkende immunologische bevindingen in serum, niet gespecificeerd).

## 18-3 Prerenale en postrenale nierinsufficiëntie

---

ingangsdatum: 15-01-2014  
mutatiedatum: 01-10-2017

**Vraag**

Hoe codeer je prerenale nierinsufficiëntie en postrenale nierinsufficiëntie?

**Advies**

Prerenale nierinsufficiëntie en postrenale nierinsufficiëntie worden beide met R39.2 'extrarenale uremie' gecodeerd.

**Toelichting**

Prerenale nierinsufficiëntie is het slecht functioneren van de nier als gevolg van een slechte bloeddorstrooming van de nier of een verminderde bloedtoevoer naar de nieren. De oorzaak hiervan is gelegen voor de nier (pre/extrarenaal). Het bekendste voorbeeld hiervan is nierinsufficiëntie t.g.v. dehydratie.

Postrenale nierinsufficiëntie is het slecht functioneren van de nier als gevolg van obstructie van hogere of lagere urinewegen, zoals bij urolithiasis en prostaatcarcinoom. De oorzaak hiervan is gelegen na de nier (post/extrarenaal).

**NB**

Renale nierinsufficiëntie is het slecht functioneren van de nier als gevolg van schade aan de nier zelf. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door medicijnen, diabetes mellitus of acute glomerulonefritis.

Nierinsufficiëntie en uremie zijn in de ICD-10 synoniem (uremie is het gevolg van nierinsufficiëntie).

Vanwege de exclusie voor extrarenale uremie bij blok N17-N19, wordt prerenale en postrenale nierinsufficiëntie met R39.2 vastgelegd, dit geldt ook voor de acute vorm.

## 18-5 Keelpijn

---

ingangsdatum: 15-01-2014

**Vraag**

Bij het zoekpad (deel 3) pijn, - keel kan er twijfel ontstaan welke code te gebruiken; J02.9 'Acute faryngitis, niet gespecificeerd' of code R07.0 'Pijn in keel'. Welke code is juist en welke code kan gebruikt worden voor keelpijn NNO?

**Advies**

Codeer keelpijn in het kader van ontsteking met J02.9 'Acute faryngitis, niet gespecificeerd'  
Codeer keelpijn niet in het kader van ontsteking / NNO met R07.0 'Pijn in keel'

## 18-6 SIRS

---

ingangsdatum: 01-01-2015

vervangt: CvZ nieuwsbrief juli 1998 en december 2002

**Vraag**

Wat is het juiste gebruik van de codes voor SIRS?

**Advies**

Codes voor SIRS (R65.0-R65.9) mogen alleen worden gebruikt om aanvullend aan de oorzaak te coderen.

Wanneer er sprake is van SIRS:

1. Codeer de oorzaak
2. Codeer aanvullend SIRS
3. Codeer aanvullend de complicaties (zoals (multipale) orgaanfalen en/of shock)

## Toelichting

De afkorting SIRS staat voor systemisch inflammatoir responsyndroom. Oorzaken van dit syndroom kunnen o.a. zijn:

- trauma
- complicaties van een operatie
- brandwonden
- pancreatitis

## Complicaties

Bij SIRS leidt een te heftige inflammatoire respons op zichzelf vaak tot complicaties zoals (multipel) orgaanfalen en/of shock.

## Voorbeelden

- SIRS met acute nier en respiratoire insufficiëntie t.g.v. een acute pancreatitis  
Codeer de oorzaak  
K85.9 'Acute pancreatitis, niet gespecificeerd'

Codeer aanvullend SIRS

R65.1 'Systemisch inflammatoir responsyndroom van infectieuze oorsprong, met orgaanfalen'

Codeer aanvullend de acute nier en respiratoire insufficiëntie

N17.9 'Acute nierinsufficiëntie, niet gespecificeerd'

J96.0- 'Acute respiratoire insufficiëntie'

- Stomp leverletsel t.g.v. val van steiger, tijdens opname ontwikkeling SIRS zonder orgaanfalen  
Codeer de oorzaak  
S36.10 'Letsel van lever of galblaas; zonder open wond naar buikholte'  
W12.99 'Val op en van steiger; niet gespecificeerde plaats tijdens niet gespecificeerde bezigheid'

Codeer aanvullend het tijdens de opname ontwikkelde SIRS met de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname

NAS R65.2 'Systemisch inflammatoir responsyndroom van niet-infectieuze oorsprong, zonder orgaanfalen'

## 18-8 Verhoogd troponine

---

ingangsdatum: 01-01-2018 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe wordt een verhoogde waarde van troponine gecodeerd?

### Advies

Codeer een verhoogd troponine met R77.8 'overige gespecificeerde afwijkingen van plasmaproteïne'

## Toelichting

Troponine is een onderdeel van de hartspier. Het is een eiwit maar geen enzym en valt daarom onder het plasmaproteïne.

Als het verhoogde troponine verklaard is door een infarct (of andere oorzaak) wordt de afwijkende waarde niet gecodeerd.

## 18-9 Hemodynamische instabiliteit

---

ingangsdatum: 01-01-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je hemodynamische instabiliteit?

### Advies

Hemodynamische instabiliteit

- Zonder vermelding van circulatoire shock: codeer R09.8 'Overige gespecificeerde symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel'
- Indien er sprake is van circulatoire shock: codeer alleen de (gespecificeerde) shock.

### Toelichting

Indien er sprake is van hemodynamische instabiliteit zonder vermelding van circulatoire shock adviseren we het zoekpad labiel, - bloeddruk R09.8 aan te houden, en niet het zoekpad voor schommelende bloeddruk. Met dit advies sluiten we aan bij de internationale codering.

## 18-10 Longinfiltraat NNO

---

ingangsdatum: 01-01-2020 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 11.5

### Vraag

Wat is de code voor een niet nader omschreven longinfiltraat?

### Advies

Codeer een niet nader omschreven longinfiltraat met R91 'afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van long'.

### Toelichting

Voor longinfiltraat kom je via de Alfabetische lijst terecht bij code J82 'Pulmonale eosinofilie, niet elders geassocieerd'. De term longinfiltraat NNO betekent eigenlijk niets meer dan een schaduw op de thoraxfoto, welke wijst op een niet nader te duiden afwijking van het longparenchym.

NB Indien wél duidelijk is beschreven welke aandoening het infiltraat verklaart (bijvoorbeeld een pneumonie), codeer dan alleen deze beschreven aandoening.

**NIEUW**

## 18-11 Consolidatie long NNO

---

ingangsdatum: 01-01-2022 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Wat is de code voor een niet nader omschreven consolidatie van de long?

**Advies**

Codeer een niet nader omschreven consolidatie van de long met R91 'afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van long'.

**Toelichting**

Voor consolidatie van de long word je in de alfabetische lijst verwezen naar pneumonie, lobair. De term consolidatie betekent eigenlijk niets meer dan een verdichting van longweefsel op de thoraxfoto, welke wijst op een niet nader te duiden afwijking van het longparenchym.

NB Indien wél duidelijk is beschreven welke aandoening de consolidatie verklaart (bijvoorbeeld een pneumonie), codeer dan alleen deze beschreven aandoening.

## 19-1 Aneurysma spurium / vals aneurysma t.g.v. een hartkatheterisatie

---

ingangsdatum: 01-03-2013

**Vraag**

Hoe wordt een aneurysma spurium t.g.v. een hartkatheterisatie gecodeerd?

**Advies**

Codeer een aneurysma spurium na hartkatheterisatie met T81.7 + Y84.0 (Vasculaire complicaties na medische verrichting + complicatie na hartkatheterisatie).

Codeer aanvullend de lokalisatie van het aneurysma met een code uit blok I72, bijvoorbeeld een aneurysma van de arteria femoralis (I72.4)

**Toelichting**

Een aneurysma spurium of vals aneurysma, is een aneurysma waarvan de wand niet of slechts voor een deel bestaat uit de arteriewand, bijv. na verwonding van een arterie, waarna zich in of naast de vaatwand een met bloed gevulde bindweefselzak vormt. Na hartkatheterisatie is een vals aneurysma ter hoogte van de punctieplaats een bekende complicatie. (bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1178-81 en Pinkhof geneeskundig woordenboek).

Zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling.

## 19-2 Mediale en laterale collumfractuur

---

ingangsdatum: 01-03-2013

**Vraag**

Hoe wordt een mediale of laterale collumfractuur gecodeerd?

**Advies**

Codeer S72.0- (Fractuur van femurhals).

**Toelichting**

Een mediale of laterale collumfractuur is een femurhalsfractuur.

## 19-3 Delayed graft na een transplantatie

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Hoe wordt een delayed graft na een transplantatie gecodeerd?

### Advies

Codeer een delayed graft na een niertransplantatie met code T83.8 "Overige gespecificeerde complicaties van urogenitale prothesen, implantaten en transplantaten" en aanvullend Y83.0 "Operatie met transplantatie van volledig orgaan".

Gebruik bij andere organen dan de nier de code T82.8 / T84.8 / T85.8 en aanvullend Y83.0.

Zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling!

### Toelichting

Als de nierfunctie van een nier na transplantatie vertraagd op gang komt is er sprake van een delayed graft.

## 19-4 Brandwonden

---

ingangsdatum: 01-09-2014

mutatiedatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

### Advies

Indien er binnen een drie-teken categorie meerdere graden brandwonden bestaan, bijv. 1e en 2e graads brandwond hoofd, wordt uitsluitend de hoogste graad brandwond gecodeerd.

Gebruik van code T31.- en T32.-, "Brandwonden/etsing geklasseerd naar uitgebreidheid van betrokken lichaamsoppervlak":

- a) als codering wanneer de lokalisatie van de brandwond/etsing niet is gespecificeerd
- b) als aanvullende codering bij de codes T20-T29 om het percentage aangedane lichaamsoppervlakte aan te geven.

## 19-5 Trauma capitis

---

ingangsdatum: 01-01-2016 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een trauma capitis?

### Advies

Achterhaal wat het precieze letsel is. Als dat niet mogelijk is, dan wordt een trauma capitis NNO gecodeerd met code S09.9 'niet gespecificeerd letsel van hoofd'.

### Toelichting

Trauma capitis zegt niet meer dan 'hoofd- en schedelletsel'. Pinkhof geeft als omschrijving: letsel aan het hoofd, veelal leidend tot hersenletsel (trauma cerebri). Het is dus belangrijk om te achterhalen wat het exacte letsel is. Als dat niet mogelijk is wordt trauma capitis NNO gecodeerd met code S09.9.

## 19-6 Licht traumatisch schedelhersenletsel (LTSH)

---

ingangsdatum: 01-04-2016 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Hoe codeer je een LTSH?

### Advies

Achterhaal wat het precieze letsel is. Als dat niet mogelijk is, dan wordt een LTSH NNO gecodeerd met code S09.9 'niet gespecificeerd letsel van hoofd'.

### Toelichting

Onder patiënten met een LTSH worden de patiënten met een schedeltrauma verstaan die op de Glasgow-comaschaal (GCS) een score hebben van 13-15 met een bewustzijnsverlies van 0-15 minuten en een posttraumatische amnesie van 0-60 minuten. Dit geeft een indicatie van eventueel hersenletsel (trauma cerebri). Het is dus belangrijk om te achterhalen wat het exacte letsel is. Als dat niet mogelijk is wordt LTSH NNO gecodeerd met code S09.9.

## 19-7 CAPD-gerelateerde peritonitis

---

ingangsdatum: 01-04-2016  
vervangt: CvZ aca 19.11

### Vraag

Hoe wordt een CAPD-gerelateerde peritonitis gecodeerd?

### Advies

1. Codeer een CAPD peritonitis welke ontstaan is door de katheter met:  
T85.7 'infectie en ontstekingsreactie als gevolg van overige inwendige prothesen, -implantaten en -transplantaten'  
+  
Y83.1 'operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel, als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting'  
+  
K65.8 'overige gespecificeerde peritonitis'
2. Codeer een CAPD peritonitis welke ontstaan is door het dialyseren (de vloeistof/het proces) met:  
T80.2 'infecties na infusie, transfusie en therapeutische injectie'  
+  
Y84.1 'hemodialyse, als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting'<sup>15</sup>  
+  
K65.8 'overige gespecificeerde peritonitis'

Als de oorzaak niet is te achterhalen (NNO) is het advies de CAPD-gerelateerde peritonitis te coderen als zijnde veroorzaakt door de katheter (1).

<sup>15</sup> De toepassing van code Y84.1 is verruimd tot 'hemodialyse en peritoneaal dialyse' (codeadvies 20-5)

## 19-8 Lijnsepsis

---

ingangsdatum: 01-01-2017  
mutatiedatum: 01-07-2018

### Vraag

Hoe wordt een lijnsepsis gecodeerd?

### Advies

Codeer een lijnsepsis met T82.7 'infectie en ontstekingsreactie als gevolg van overige cardiale- en vasculaire- hulpmiddelen, -implantaten en -transplantaten'. Codeer aanvullend Y83.1 'Operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel'. Codeer alleen aanvullend een sepsis als uit de documentatie van de arts blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een sepsis

### Toelichting

Een lijnsepsis wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de lijn (= intravasculaire katheter). In de ICD-10 vallen katheters onder de kunstmatige implantaten en hulpmiddelen. Het juiste zoekpad in sectie I van de alfabetische index is:  
complicatie  
- infusie  
- - katheter  
- - - infectie of ontsteking T82.7

Voor de oorzaak is het zoekpad in sectie II van de alfabetische index:  
complicatie  
- implantaat, implantatie (van)  
- - kunstmatig  
- - - inwendig hulpmiddel... Y83.1

NB Een lijnsepsis die is ontstaan tijdens de te registreren ziekenhuisopname, wordt voorzien van de aanduiding 'NAS' van aandoening niet aanwezig bij start opname bij de T- en de A-code (NAS T82.7 & NAS Y83.1 & NAS A40.-/A41.-).

Zie codeadvies 1-4 'Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie' voor de volgorde van de codering.

## 19-9 Luxatie gewrichtsprothese door ongeval

---

ingangsdatum: 01-10-2017 of zo mogelijk eerder  
mutatiedatum: 01-10-2019  
vervangt: CvZ codeadvies 28-1

### Vraag

Hoe wordt een luxatie van een gewrichtsprothese door een ongeval gecodeerd?

### Advies

Een luxatie van een gewrichtsprothese door een ongeval wordt als een mechanische complicatie van de prothese gecodeerd. Aanvullend codeer je ter specificatie de luxatie met een S-code en

het ongeval om aan te geven dat er een bijkomende externe oorzaak was waardoor het mankement van de prothese kon optreden.

Code T84.0 'mechanische complicatie van inwendige gewrichtsprothese' + S-code (bijvoorbeeld S73.0 'Luxatie van heup') + Y79.2 'orthopedische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen' + code uit V01-Y36 (bijvoorbeeld W19.99 'niet-gespecificeerde val').

### **Toelichting**

Bij patiënten met een gewrichtsprothese neemt de prothese de functie van (een deel) van het oorspronkelijke gewricht over en de zo ontstane situatie kan daarmee dus als (nieuw) gewricht beschouwd worden. Dit nieuwe gewricht heeft echter wel de functie van het oorspronkelijke gewricht maar niet de structuur van het oorspronkelijke gewricht. Problemen die zich in het nieuwe (kunstmatige) gewricht voordoen worden daarom gecodeerd als complicaties van de prothese.

NB Zie ook codeadvies 20-6 voor complicaties na het plaatsen van orthopedische protheses.

## **19-10 Antebrachiifractuur**

---

ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je een antebrachiifractuur?

### **Advies**

- Een antebrachiifractuur NNO wordt gecodeerd met S52.4- 'fractuur van schacht van zowel ulna als radius'.
- Een distale antebrachiifractuur wordt gecodeerd met S52.6- 'fractuur van ondereinde van zowel ulna als radius'.
- Een proximale antebrachiifractuur wordt gecodeerd met S52.7- 'multiple fractures van onderarm' + S52.0- 'fractuur van bovineinde van de ulna' + S52.1- 'fractuur van bovineinde van radius' (tenzij de antebrachiifractuur niet de hoofddiagnose is en/of de ulna- of radius fractuur als zwaarste beschouwd kan worden, in dat geval vervalt S52.7-. Zie codeadvies 0-5 Multipiele aandoeningen)

### **Toelichting**

Een antebrachiifractuur is een fractuur van zowel de ulna als de radius. Het betreft niet uitsluitend de schacht, ook proximale en distale onderarmfracturen vallen onder de term antebrachiifractuur. Bijvoorbeeld een fractuur van de distale ulna en radius wordt een distale antebrachiifractuur genoemd.

## **19-11 Subcutaan gelopen infuus (extravasatie)**

---

ingangsdatum: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe wordt het subcutaan lopen van infuusvloeistof gecodeerd?

### **Advies**

Het subcutaan lopen van vloeistof/medicatie van een infuus codeer je met (NAS) T80.8 'overige gespecificeerde complicaties na infusie, transfusie en therapeutische injectie' en aanvullend

(NAS) Y65.8 'overige gespecificeerde ongelukken tijdens genees- en heelkundige behandeling'. Het eventueel daarbij ontstane letsel codeer je aanvullend.

### **Voorbeeld**

Subcutaan gelopen glucose-infuus met blaarvorming onderarm, tijdens huidige opname

Codeer het subcutaan gelopen infuus met NAS T80.8 + NAS Y65.8

Codeer het ontstane letsel aanvullend met NAS T22.6 voor etsing van 2e graad (= blaarvorming) + NAS X44.29 voor de onopzettelijke blootstelling aan de glucose.

## 19-12 Complicatie van een JJ-stent (dubbel J-katheter)

ingangsdatum: 01-04-2021 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je een complicatie van een JJ-stent, ook wel dubbel J-katheter genoemd?

### **Advies**

Een complicatie van een JJ-stent, ook wel een dubbel J-katheter genoemd, valt voor de codering onder de overige urineweghulpmiddelen en -implantaten.

### **Toelichting**

Een JJ-stent, ook wel een dubbel J-katheter genoemd, wordt voor de codering als een stent gezien omdat deze geen verbinding heeft met de buitenwereld.

### **Voorbeeld**

Luxatie van een JJ-stent T83.1 + Y73.2

## 19-13 Niet-traumatisch subcutaan emfyseem

ingangsdatum: 01-07-2021 of zo mogelijk eerder

### **Vraag:**

Hoe wordt niet-traumatisch subcutaan emfyseem gecodeerd?

### **Advies:**

Codeer niet-traumatisch subcutaan emfyseem met code T79.7 'traumatisch subcutaan-emfyseem' + X59.99 'blootstelling aan niet-gespecificeerde factor als oorzaak van overig en niet-gespecificeerd letsel'.

### **Toelichting:**

De ICD-10 biedt geen enkele mogelijkheid om niet-traumatisch subcutaan emfyseem buiten hoofdstuk XIX te coderen. Omdat het ziektebeeld het beste tot uiting komt in de omschrijving van code T79.7 wordt strikt de alfabetische index gevolgd en kom je uit op code T79.7 (zoekpad emfyseem, - subcutaan (traumatisch) T79.7). Omdat traumatisch tussen haakjes staat betekend dat ook niet-traumatisch subcutaan emfyseem onder code T79.7 wordt geclassificeerd, zie uitleg in de laatste alinea van pagina 4 van de alfabetische lijst. Als uitwendige oorzaak is X59.99 de 'minst slechte' keuze.

## 20-2 Vervoermiddelen

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Onder welk vervoermiddel valt een scootmobiel, brommobiel, trike, quad etc.?

### **Advies**

In overleg met o.a. het RIVM en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersongevallen is het volgende besloten:

Scootmobiel en brommobiel onder V20 - V29

Trike en quad vallen onder V86.-

Segway, rolstoel en elektrische rolstoel vallen onder de voetgangersvervoermiddelen.

## 20-3 Rollator

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Hoe wordt een val met een rollator gecodeerd?

### **Advies**

Een rollator is géén vervoermiddel maar een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een stok. Codeer een val met een rollator daarom als een "gewone" val, bijvoorbeeld met code W18 "Overige val op eenzelfde niveau" of W19 "Niet gespecificeerde val".

## 20-4 Val uit maxi cosi etc.

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Onderwerp**

Val uit maxi cosi, fietsstoeltje, boodschappenkar, of kinderwagen.

### **Advies**

bij vervoersongevallen (V01-V99):

maxi cosi in auto = passagier

maxi cosi als wandelwagen = voetganger

wandelwagen = voetganger

fietsstoeltje = passagier

boodschappenkar = voetganger

Val uit maxi cosi, niet samenhangend met de risico's verbonden aan vervoer (exclusie pag.XX.4 deel 1), (W00-X59):

Val uit maxi cosi gebruikt als stoel thuis = W07.--

Val uit maxi cosi die wordt gedragen = W04.--

Val uit maxi cosi (die wordt gedragen) door botsing met voetganger, (ook op openbare weg!) = W03.-- (= voetganger tegen voetganger)

## 20-5 Peritoneaal dialyse

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Toevoegen in deel 1**

Voeg in deel 1 bij code Y84.1 Peritoneale dialyse toe.

## 20-6 Complicaties na het plaatsen van orthopedische protheses

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-08-2015

### **Onderwerp**

Er zijn 2 codes beschikbaar voor de uitwendige oorzaak voor complicaties na het plaatsen van orthopedische protheses zonder afwijkende gang van zaken tijdens de verrichting:

1. Y79.2 'Orthopedische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen, Prothesen en overige implantaten, materialen en bijkomende hulpmiddelen'
2. Y83.1 'Operatie en overige heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting, Operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel'

### **Advies**

Code Y79.2 valt binnen het blok 'Medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen bij diagnostisch en therapeutisch gebruik'. Hierbij is een inclusie voor mankement of slecht functioneren van medische hulpmiddelen.

Bij code T82.0 staat opgesomd wat er onder mechanische complicaties valt. Dit staat weliswaar bij de cardiale en vasculaire prothesen, implantaten en transplantaten, maar deze opsomming geldt ook voor mechanische complicaties van andere organen en weefsels (zoals de inwendige orthopedische prothesen bij code T84.-). Voor alle mechanische complicaties is Y79.- de aanvullende code voor de uitwendige oorzaak.

Code Y83.1 valt binnen het blok 'Genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting'.

Niet mechanische complicaties (behalve infecties en ontstekingsreacties) zijn gespecificeerd bij code T82.8. Ook hiervoor geldt dat de hier genoemde complicaties ook voor andere organen en weefsels opgaan. Voor alle niet mechanische complicaties is Y83.1 de aanvullende code voor de uitwendige oorzaak.

### **Voorbeelden**

- Loslaten kop van totale heup wordt gecodeerd met: T84.0 'Mechanische complicatie van inwendige gewrichtsprothese'+ Y79.2
- Geïnfecteerd osteosynthesemateriaal van de tibia wordt gecodeerd met T84.6 'Infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendig fixatiemateriaal [elke lokalisatie]' + Y83.1

Zie ook codeadvies 20-8 Y-codering bij complicaties door genees-en heelkundige behandeling.

NB Zie codeadvies 19-9 voor luxatie van een kunstgewricht na een ongeval.

## 20-7 Vierde en vijfde teken bij ongevalstoedracht

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Onderwerp

Er is soms onduidelijkheid over het gebruik van het vierde en vijfde teken bij de ongevalstoedracht.

Voorbeelden:

a) Verkeersongeval ↔ niet-verkeersongeval

Het is vaak onduidelijk of het om een ongeval op de openbare weg gaat. Dit zal meestal wel het geval zijn.

Wat is het vierde teken bij een verkeersongeval zonder vermelding van de exacte locatie waar het ongeval heeft plaatsgevonden?

Advies:

In de meeste gevallen zal het gaan om een ongeval op de openbare weg, daarom het advies om bij een onbekende plaats van het ongeval het vierde teken voor een verkeersongeval te gebruiken.

b) 4e teken voor fietser nno

Bij de ongevallen van een wielrijder wordt met het 4e teken aangegeven of het de bestuurder of een passagier betreft. Vaak is dat niet bekend.

Coderen we dan standaard de .9 “niet gespecificeerde wielrijder gewond bij verkeersongeval” of .4/.6/.7 “Bestuurder (van...) gewond bij verkeersongeval”, omdat dat waarschijnlijk het meeste voorkomt?

Advies:

Als het verkeersslachtoffer een fietser is wordt het 4e teken voor bestuurder gebruikt.

c) Val uit klimwand/rek in gymzaal

W09 “Val waarbij speeltuitrusting betrokken is” of W17 “Overige val van ene niveau naar andere”?

Advies:

Een klimwand/rek wordt niet als speeluitrusting gezien. Een val uit klimwand/rek wordt gecodeerd met W17.

d) Gymzaal in/bij school

4e teken .2 “Scholen, andere instellingen en openbare ruimten” incl. schoolterrein of .3 “Plaats voor sport en atletiek” incl. gymnastiekzaal.

Advies:

De gymzaal maakt deel uit van de school vandaar het vierde teken 2.

e) 5e teken voor activiteit bij uit eten gaan

Is dit .1 “Bezig met vrijetijdsbesteding” of .4 “Tijdens rusten, slapen, eten en overige voor het leven noodzakelijke activiteiten”, maar kan ook .2 “Werkend voor inkomen” zijn bij bv een zakenlunch.

Advies:

Over het algemeen zal uit eten gaan een vrijetijdsbesteding zijn. Als dit niet duidelijk blijkt kan je strikt genomen niet anders dan .9 “Tijdens niet gespecificeerde bezigheid” coderen.

NB De informatie over de bezigheid tijdens het ongeval is heel vaak niet voorhanden en zal dus vaak met .9 vastgelegd worden.

## 20-8 Y-codering bij complicaties door genees- en heelkundige behandeling

ingangsdatum: 01-08-2015 of zo mogelijk eerder  
vervangt: CvZ aca 25.1

### Vraag

Wat is de juiste Y-code om de uitwendige oorzaak aan te geven bij een complicatie na een genees- en heelkundige behandeling vast te leggen?

### Advies

1. Codeer voor een onbedoelde gang van zaken tijdens de genees- en heelkundige behandeling Y60-Y69.
2. Codeer voor een mechanische complicatie van een medisch hulpmiddel Y70-Y82.
3. Codeer voor een afwijkende reactie of latere complicatie Y83-Y84.

### Toelichting

Voor het vastleggen van de uitwendige oorzaak van complicaties bij medische behandelingen zijn drie codereeksen beschikbaar:

1. Y60-Y69 'Ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling'
2. Y70-Y82 'Medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen bij diagnostisch en therapeutisch gebruik'
3. Y83-Y84 'Genees- en heelkundige verrichting als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting'

1. Bij codereeks Y60-Y69 is er sprake van een 'ongeluk' tijdens een genees- en heelkundige behandeling. Het gebruik van deze codes geeft alleen het oorzakelijke verband weer en heeft niets met schuld of verwijtbaarheid te maken. Elke ingreep brengt immers een bepaald risico met zich mee.

Bijvoorbeeld

- Uterusperforatie tijdens hysteroscopie: ongevalscode Y60.4 'Onopzettelijke snee, punctie, perforatie of bloeding tijdens endoscopisch onderzoek'.

NB Y60-Y69 wordt voorafgegaan door een code uit hoofdstuk XIX 'Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken' om de aard van het letsel aan te geven.

2. Bij Y70-Y82 is er sprake van mankementen of slecht functioneren van medische hulpmiddelen. Er is geen sprake van een 'ongeluk' bij het plaatsen of een (late) complicatie van de ingreep zelf maar er is een probleem met het hulpmiddel.

Bijvoorbeeld

- Spontane luxatie van een heupprothese: ongevalscode Y79.2 'Orthopedische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen'
- IUD gemigreerd naar in de buikholte: ongevalscode Y76.2 'Obstetrische en gynaecologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenis'

NB Y70-Y82 wordt voorafgegaan door T82.0 t/m T82.5, T83.0 t/m T83.4, T84.0 t/m T84.4 of T85.0 t/m T85.6 om de aard van de mechanische complicatie mee aan te geven.

3. Bij Y83-Y84 is er sprake van een afwijkende reactie van patiënt of latere complicatie, veroorzaakt door een medische verrichting, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens de verrichting. De medische verrichting is dus geheel conform wat gebruikelijk is verlopen, maar veroorzaakt een ongewenst gevolg. Er is hierbij geen sprake van een tijdslimiet tussen de uitgevoerde verrichting en het ontstaan van de complicatie, dus ook late complicaties vallen onder deze codes.

Bijvoorbeeld

- Postoperatieve infectie na cholecystectomie: ongevalscode Y83.6 'Verwijdering van overig orgaan (gedeeltelijk)(volledig)'
- Peritoneale adhesies na niertransplantatie: ongevalscode Y83.0 'operatie met transplantatie van volledig orgaan'

NB Y83-Y84 kan voorafgegaan worden door iedere willekeurige diagnosen om het oorzakelijk verband met de genees- of heelkundige ingreep aan te geven.

#### Opmerking

Y88.- 'Late gevolgen met genees- en heelkundige behandeling als uitwendige oorzaak' wordt gebruikt om aan te geven dat een aandoening het late gevolg van een complicatie is. De complicatie zelf is niet meer aanwezig maar het gevolg van de complicatie wel. Er is een resttoestand na een eerdere complicatie.

#### Bijvoorbeeld

- Girdlestone situatie (chirurgische verwijdering van caput en collum femoris bij infectie of losraken van femurkoprothese); Dit is het resultaat van het verwijderen van de prothese maar is geen complicatie van de heupprothese zelf. In dit geval is de ongevalscode Y88.3 'Late gevolgen van geneeskundige- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting'.

## 20-9 Ongevalscode voor gewonde scooterrijder

---

ingangdatum: 01-01-2015

mutatiedatum: 01-01-2016

#### Vraag

Hoe codeer je bij een verkeersongeval een gewonde scooterrijder als onduidelijk is:

1. Om welk type scooter het gaat (snor- of bromscooter)
2. Of de gewonde persoon bestuurder of passagier is

#### Advies

1. Als het type scooter niet is gespecificeerd, codeer deze dan als een niet gespecificeerde bromfietser, ongeacht of de gewonde persoon bestuurder of passagier is.

Codes:

V20-V29 met vierde teken .9 'niet gespecificeerde bromfietser gewond bij verkeersongeval'

2. Als het type scooter wél is gespecificeerd, maar de gewonde persoon niet gespecificeerd is als bestuurder of passagier, codeer dan alsof het de bestuurder betreft.

Codes:

V20-V29 met vierde teken .4 'Bestuurder bromfiets, bromscooter gewond bij verkeersongeval' of .6 'Bestuurder snorfiets, snorscooter gewond bij verkeersongeval'

#### Toelichting

##### Snorscooters

- vallen onder V20-V29 'Bromfietser gewond bij vervoersongeval' met vierde teken .6 of .7 bij een verkeersongeval
- wetgeving: géén helmplicht, max. snelheid 25 km/u (fietspad)

##### Bromscooters

- vallen onder V20-V29 'Bromfietser gewond bij vervoersongeval' met vierde teken .4 of .5 bij een verkeersongeval

- wetgeving: helmplicht, max snelheid 45 km/u (rijbaan)

Scooters waarbij het onduidelijk is of het een snor- of bromscooter betreft vallen onder V20-V29 'Bromfietser gewond bij vervoersongeval' met vierde teken .9 bij een verkeersongeval

## 20-10 Gebruik van meerdere codes uit hoofdstuk 20

---

ingangsdatum: 01-04-2019  
vervangt: CvZ aca 3.4

### Vraag

Is het bij een ongeval mogelijk om meerdere codes uit hoofdstuk 20 te registreren in de LBZ?

### Advies

Ja, je mag bij een ongeval meerdere codes uit hoofdstuk 20 registreren. Je kan op die manier de oorzaak van een letsel zo nauwkeurig mogelijk vastleggen.

### Voorbeeld

Brandwonden van gezicht	T20.0
door in brand vliegen van benzine	X04.49
na bromfietsongeval	V29.99

## 20-11 Y-code voor bijwerking van immunotherapie als behandeling voor maligne aandoening

---

ingangsdatum: 01-05-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Welke Y-code wordt geregistreerd voor een bijwerking van immunotherapie gegeven als behandeling van een maligne aandoening?

### Advies

Immunotherapie gegeven i.h.k.v. een oncologische behandeling heeft een antineoplastische werking. Bijwerkingen die daarbij optreden worden daarom vastgelegd met Y43.3 'ongewenst gevolg overige antineoplastische-geneesmiddelen'.

NB; zie codeadvies 0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen, voor de codering van bijwerkingen.

## 20-12 Ongeval met elektrische step

---

ingangsdatum: 01-10-2020 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Waar valt een elektrische step onder?

### Advies

De elektrische step valt onder de bromfiets (V20-V29), behalve wanneer het een elektrische kinderstep betreft of de berijder een kind is; dan valt het onder een voetganger (voetgangersvervoermiddel).

## 21-2 Palliatieve zorg

---

ingangsdatum: 01-03-2013  
mutatiedatum: 01-10-2015 & 01-04-2016

### Vraag

Hoe wordt palliatieve zorg gecodeerd?

### Advies

Codeer Z51.5 (Palliatieve zorg) als aanvullende code bij het onderliggende lijden.

Codeer Z51.5 niet als hoofdaandoening.

Codeer Z51.5 ook als er een zorgactiviteit die de palliatieve zorg beschrijft is vastgelegd (dit is een uitzondering op codeadvies 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ.)

## 21-5 Status na gastric bypass

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Wat is de code voor "status na een gastric bypass"?

### Advies

Codeer "status na een gastric bypass" met Z98.0 "Aanwezigheid van bypass en anastomose van darm" + als een gedeelte van de maag verwijderd is, aanvullend Z90.3 "Verworven afwezigheid van maag (deel van maag)".

### Toelichting

Hierbij wordt een deel van de van de maag buiten werking gesteld doordat deze dicht geniet wordt. Het nog functionele deel van de maag wordt direct aangesloten op het tweede deel van de dunne darm. In een enkel geval wordt een deel van de stuk maag daadwerkelijk verwijderd.

## 21-6 Status na sleeve gastrectomie

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Wat is de code voor status na sleeve gastrectomie?

### Advies

Te coderen met Z90.3 "Verworven afwezigheid van maag (deel van maag)".

### Toelichting

Hierbij wordt een groot deel van de maag verwijderd waardoor een buisvormige maag overblijft.

## 21-7 Status na plaatsing endoluminale sleeve

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### Vraag

Wat is de code voor status na plaatsing van een endoluminale sleeve in het duodenum (bijvoorbeeld Endobarrier™)?

### Informatie

Met een endoscopie wordt een capsule ingebracht met daarin opgevouwen de sheet met aan het begin een uitvouwbaar ankertje. Daarmee haakt de endoluminale sleeve zich vast achter de overgang van de maag naar de twaalfvingerige darm. Na de plaatsing komt het voedsel dat de patiënt eet, niet meer in aanraking met de twaalfvingerige darm. Nadat het voedsel door de endoluminale sleeve is gegaan, komt het verderop in de darm terecht.

### Advies

Aanwezigheid endoluminale sleeve: Z96.8 "Aanwezigheid van overige gespecificeerde functionele implantaten"

Verwijderen endoluminale sleeve: Z45.8 "Bijstellen van en begeleiden bij overige gespecificeerde geïmplanteerde hulpmiddelen" en niet Z46.5 "Aanmeten en bijstellen van ileostoma en andere gastro-intestinale hulpmiddelen" omdat het een geïmplanteerd hulpmiddel betreft en deze vallen onder Z45.

Complicatie van endoluminale sleeve: T85.- + Y-code (zie ook codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling)

## 21-8 Verwijderen van een CAPD katheter

---

ingangsdatum: 15-01-2014

mutatiedatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

### Vraag

Met welke Z-code wordt het verwijderen van een CAPD katheter gecodeerd?

### Advies

Alleen als het verwijderen van een CAPD katheter de reden van opname is en er geen sprake van een complicatie van de katheter is, codeer dan het verwijderen van een CAPD katheter met code Z45.8 'Bijstellen van en begeleiden bij overige gespecificeerde geïmplanteerde hulpmiddelen'.

### Toelichting

Z45.8 wordt alleen aanvullend gecodeerd als er geen verrichtingencode uit de zorgactiviteiten - tabel (ZA-code) met een zelfde betekenis is vastgelegd. Zie ook codeadvies 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ.

Codes voor bijvoorbeeld het verwijderen van myringotomiebuisjes en vaatcanules zijn via het zoekpad Verwijdering (van) (uit) te vinden bij code Z45.-. Daarom adviseren we het verwijderen van een CAPD katheter te coderen met Z45.8 "Bijstellen van en begeleiden bij overige gespecificeerde geïmplanteerde hulpmiddelen".

## 21-9 Z76.3 en Z76.2

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Wat is de code voor een gezonde moeder die meekomt (opname) met een zieke zuigeling in de kraamtijd, en de code voor een gezonde zuigeling die meekomt met een zieke moeder?

### **Advies**

Wanneer een gezonde moeder in de kraamtijd meekomt met een zieke zuigeling: codeer de gezonde moeder met Z76.3 "Gezonde persoon die zieke begeleid". Om aan te geven dat het de kraamperiode betreft: codeer aanvullend Z39.0 "Zorg en onderzoek onmiddellijk na bevalling"

Wanneer een gezonde zuigeling meekomt met een zieke moeder: codeer de gezonde zuigeling dan met Z76.2 "gezondheidszorgtoezicht op en gezondheidszorg voor andere gezonde zuigeling en kind"

## 21-10 Abstinerend beleid

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Is er een Z-code om abstinerend beleid aan te geven?

### **Advies**

Dit is niet te coderen in het domein van de ICD-10. Codeer de onderliggende aandoening.

## 21-11 Status na CABG en PTCA

---

ingangsdatum: 15-01-2014

### **Vraag**

Hoe wordt een status na CABG, status na PTCA met stentplaatsing en een status na PTCA zonder stentplaatsing gecodeerd?

### **Advies**

Status na CABG: Z95.1 "Aanwezigheid van transplantaat voor aortocoronaire bypass (inclusief LIMA en RIMA anastomosen)

Status na PTCA met stent: Z95.5 "Aanwezigheid van implantaat en transplantaat voor coronaire vaatplastiek"

Status na PTCA zonder stentplaatsing: Z92.8 "Persoonlijke anamnese met overige gespecificeerde medische behandeling"

## 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ

---

ingangsdatum: 01-09-2014

mutatiedatum 1: 01-01-2015

mutatiedatum 2: 01-10-2015

### **Advies**

Een aantal Z-codes uit de ICD-10 beschrijft een verrichting. Een Z-code uit hoofdstuk XXI van de ICD-10 hoeft niet vastgelegd te worden, als er een verrichtingencode uit de zorgactiviteitentabel (ZA-code) met een zelfde betekenis is vastgelegd. Codeer bij voorkeur de te behandelen, of te onderzoeken aandoening.

Voorbeelden:

- Chemo voor chronische leukemie nno: C95.1 (géén Z51.1; cytostatica wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode).
- Chemo voor botmeta's ontstaan 2 jaar na behandeld longcarcinoom: C79.5 & Z85.2 (géén Z51.1; cytostatica wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode).
- Chemo als aanvullende behandeling na verwijderd osteosarcoom distale femur: C40.2 (géén Z51.1; cytostatica wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode). (zie ook codeadvies 2-4).
- IVF bij vrouwelijke infertiliteit: N97.-, (géén Z31.2; IVF wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode).
- IV Natalizumab bij MS patiënt: G35 (géén Z51.8; Natalizumab wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode).
- Hemodialyse bij chronische nierinsufficiëntie: N18.9 (géén Z49.2; de dialysebehandeling wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode).
- Mammareconstructie na mastectomie vanwege mammacarcinoom Z90.1 'Verworven afwezigheid van mamma(e)' + Z85.3 'Persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van mamma' (géén Z42.1; de plastisch chirurgische nabehandeling wordt geregistreerd met een zorgactiviteitcode)

## 21-13 Leeftijdsgrens oudere primigravida en zeer jonge primigravida

---

ingangsdatum: 01-09-2014

### Vraag

Welke leeftijdsgrens wordt er gehanteerd voor de oudere primigravida en de zeer jonge primigravida bij de codes Z35.5 en Z35.6

### Advies

Als 'oudere primigravida' wordt aangemerkt de vrouw met een leeftijd > 35 jaar die voor het eerst zwanger is. De zeer jonge primigravida is < 15 jaar.

## 21-14 Opname voor preventieve verrichtingen i.v.m. genetische aanleg

---

ingangsdatum: 01-09-2014

mutatiedatum: 01-10-2015 of zo mogelijk eerder

### Onderwerp

Opname voor preventieve verrichtingen i.v.m. genetische aanleg voor een kwaadaardige aandoening

### Informatie

Steeds vaker worden preventieve verrichtingen uitgevoerd nadat via DNA-onderzoek, wegens belaste familie- anamnese of persoonlijke anamnese, de aanleg voor een kwaadaardige ziekte is vastgesteld. Een goed voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van een mutatie in het BRCA-1-gen, verantwoordelijk voor het ontstaan van (erfelijk) borst- en ovariumcarcinoom. Wanneer de mutatie van dit gen is aangetoond, kan worden besloten om preventief over te gaan tot borstamputatie of ovariëctomie. Omdat het een verrichting bij een gezond persoon betreft,

immers alleen 'de aanleg tot het mogelijk ontwikkelen van de ziekte' is vastgesteld, betreft het hier een vorm van electieve chirurgie, als diagnose te coderen met code Z40.0. Aanvullend kan uiteraard de familieanamnese of persoonlijke anamnese als verklaring voor de electieve chirurgie worden vastgelegd. De aanwezigheid van de mutatie op het BRCA-1 gen is niet afzonderlijk te coderen, maar de belaste familie- anamnese kan in dit geval als een uitingvorm daarvan worden beschouwd.

### **Advies**

Opname voor een preventieve verrichting i.v.m. genetische aanleg:  
code Z40.0 + evt. aanvullend de familie- of persoonlijke anamnese

#### voorbeeld 1

Preventieve ovariëctomie i.v.m. aangetoond BRCA-1-gen bij patiënte met mammacarcinoom (waarvoor borstampuatie) in de persoonlijke anamnese en ovariumcarcinoom in de familieanamnese:  
code Z40.0 + evt. Z85.3 + Z80.4

#### voorbeeld 2

Preventieve mastectomie i.v.m. aangetoond BRCA-1-gen bij patiënte met mammacarcinoom en ovariumcarcinoom in de familie- anamnese:  
code Z40.0 + evt. Z80.3 + Z80.4

### **Toelichting**

Bij preventieve verrichtingen ivm genetische aanleg is (nog) geen sprake van een aandoening aan het te behandelen orgaan en is codeadvies 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ niet van toepassing.

## 21-15 Status na TIA

---

ingangsdatum: 01-04-2016

### **Vraag**

Hoe wordt een status na TIA gecodeerd?

### **Advies**

Status na TIA: Z86.6 'Persoonlijke anamnese met ziekten van zenuwstelsel en zintuigen'

### **Toelichting**

Met de komst van de ICD-10 is een TIA ingedeeld in het hoofdstuk Ziekten van zenuwstelsel. In de ICD-9 stond deze aandoening nog onder het Hartvaatstelsel. Voor de codering van de persoonlijke status na een bepaalde aandoening (Z-code), houden we bij de codering strikt de (nieuwe) ICD-10 indeling aan

## 21-16 Euthanasie

---

ingangsdatum: 01-07-2018 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Is er een passende ICD-10 code om euthanasie mee vast te leggen?

### **Advies**

De aandoening in het kader waarvoor de euthanasie wordt uitgevoerd is de hoofddiagnose. De euthanasie kan aanvullend worden vastgelegd met code Z41.8 'overige gespecificeerde verrichtingen voor andere doeleinden dan herstel van de gezondheidstoestand'.

## 21-17 Aanwezigheid van katheters

---

Ingangsdatum: 01-10-2018 of zo mogelijk eerder

### **Vraag**

Hoe codeer je de aanwezigheid van katheters?

### **Advies**

Codeer de aanwezigheid van:

- katheters in natuurlijke lichaamsopeningen met Z96.- 'aanwezigheid van overige functionele implantaten'
- katheters in kunstmatige lichaamsopeningen met Z93.- 'aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening'

Voorbeelden:

Aanwezigheid verblijfskatheter Z96.0 'aanwezigheid van urogenitale implantaten'

Aanwezigheid suprapubische katheter Z93.5 'aanwezigheid van cystostoma'

Aanwezigheid PEG-katheter Z93.1 'aanwezigheid van gastrostoma'

## Wijzigingen

### Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20220101

#### 20220101 Nieuwe adviezen

- 0-25 Primaire diagnose bij interne overname
- 2-15 Codering tumorgedrag bij blaastumoren
- 10-13 Eosinofiel astma
- 18-11 Consolidatie long NNO

#### 20220101 Mutaties en aanvullingen bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie / aanvulling
0-14 'C-code voor complicatie bij perinatale aandoeningen en aandoeningentijdens zwangerschap, bevalling en kraambed'	Terminologie aangepast n.a.v. wijziging bij 0-19, waaronder aanpassing van de titel 'Aanduiding 'NAS' bij O-codes en codes voor perinatale aandoeningen'
0-19 en in het gehele document	Aanduiding 'C' van complicatie aangepast in 'NAS' voor aandoening niet aanwezig bij start opname De definitie van de term complicatie in de LBZ wijkt af van de definitie van een complicatie zoals deze in het ziekenhuis wordt gebruikt. In het ziekenhuis wordt een complicatie gedefinieerd als een aandoening die is ontstaan als gevolg van medisch handelen, en in de LBZ wordt de term gebruikt om een aandoening aan te duiden die voor opname niet aanwezig was. Deze discrepantie zorgt vooral bij de gebruikers van onze informatieproducten vaak voor verwarring. Daarom is besloten in de LBZ niet langer de term complicatie te hanteren voor aandoeningen die ontstaan tijdens een opname, maar deze aan te duiden als 'niet aanwezig bij start van opname' (NAS).
1-5 COVID-19	Verduidelijking gebruik U12.9 (zie 2 <sup>e</sup> bullet bij U12.9)  Codering voor niet gevaccineerd toegevoegd  Twee voorbeelden voor (allergische) reactie op het COVID-19 vaccin toegevoegd
2-4 Hoofddiagnose bij behandeling van maligniteit	Voorbeeld 'Opname voor verwijderen verblijfskatheter na radicale prostatectomie i.v.m. prostaatcarcinoom' toegevoegd
2-7 Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie	N.a.v. het nieuwe advies 2-15 'codering tumorgedrag bij blaastumoren' advies 2-7 aangepast en verwijzing naar advies 2-15 opgenomen
5-5 GHB-intoxicatie	Advies aangepast n.a.v. opname van de term 'gammahydroxyboterzuur' in de geneesmiddelenlijst van de ICD-10 versie 2021
9-23 Slechte, matige, of verminderde ventrikelfunctie	Advies aangevuld met rechter ventrikelfunctie

17-1 Pitt-Hopkins syndroom	Codering aangepast (Q87.0 i.p.v. Q87.8)
----------------------------	---

## 20220101 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
9-8 Hartfalen/ hartdecompensatie	Dit advies is overbodig i.v.m. een nieuwe alfabetische ingang: falen, - hart I50.9

## 20220101 Wijzigingen Bijlage 1 Lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren

Bij de tabel aangegeven dat het een bijlage bij codeadvies 0-2 is.  
 Toegevoegd dat de aandoening bepalend is voor het toepassen van de lijst en niet de code.  
 De mutaties gelden met ingang van registratiejaar 2022.

### Toegevoegd

Aandoening/omschrijving	ICD-10	Besluit expertgroep
psychomotore retardatie	F83	toegevoegd
ischemische cardiomyopathie	I25.5	toegevoegd
cardiomyopathie	I42.-	toegevoegd
chronische hartfalen	I50.-	toegevoegd
eosinofiel astma	J82	toegevoegd
aanwezigheid van <b>therapeutische</b> cardiale en vasculaire implantaten en transplantaten	Z95.-	toegevoegd dat het alleen voor therapeutische implantaten en transplantaten geldt. Niet voor diagnostiek zoals ritmechip of looprecorder
afhankelijkheid van kunsthart	Z99.4	toegevoegd

### Afgewezen verzoeken

Aandoening/omschrijving	ICD-10	Besluit expertgroep
overgewicht	E66.-	Wordt niet opgenomen. Alleen registreren als het door de specialist wordt benoemd als adipositas en relevant is voor de opname. Het is niet de bedoeling dat de codeur kijkt of o.b.v. het gewicht er sprake is van adipositas zonder dat de specialist het benoemd.
stofwisselingsstoornissen van lipoproteïnen en overige lipidemieën	E78.-	Wordt niet opgenomen. Hypercholesterolemie bijvoorbeeld is een te hoge bloedserumwaarde voor cholesterol, maar geen aandoening (het is wel een risico voor verschillende aandoeningen). E78.- alleen registreren als het relevant is voor de opname
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van psychoactieve middelen	F10-F19	Wordt niet opgenomen, alleen als het relevant voor de opname is
roken	F17.-	Wordt niet opgenomen, alleen als het relevant voor de opname is

atherosclerose	I70.- -	Wordt niet opgenomen, code is te gebruiken voor hele milde aandoeningen tot zeer ernstige en zal daarom niet altijd een risico vormen. Bovendien kan het ook genoemd worden maar al zijn behandeld. Aanname is dat relevante atherosclerose wordt benoemd als neventiagnose. Voor behandelde atherosclerose is Z95.8 vaak van toepassing. Atherosclerose dus alleen registreren indien relevant voor de opname.
aneurysma en dissectie van aorta	I71.-	Wordt niet opgenomen, code is te gebruiken voor minimaal aneurysma tot zeer ernstig en zal daarom niet altijd een risico vormen. Bovendien kan het ook genoemd worden maar al zijn behandeld. Aanname is dat een relevant aneurysma benoemd zal worden als neventiagnose. Voor een behandeld aneurysma is Z95.8 vaak van toepassing. Aneurysma/dissectie dus alleen registreren indien relevant voor de opname.
Perifeer vaatlijden	I73.9	Wordt niet opgenomen, code is te gebruiken voor hele milde aandoeningen tot zeer ernstige en zal daarom niet altijd een risico vormen. Bovendien kan het ook genoemd worden maar al zijn behandeld. Aanname is dat relevant vaatlijden wordt benoemd als neventiagnose. Perifeer vaatlijden dus alleen registreren indien relevant voor de opname.
Persoonlijke anamnese met maligne neoplasma	Z85.-	wordt niet opgenomen, alleen als het relevant voor de opname is
Persoonlijke anamnese met bepaalde andere ziekten	Z86.-	wordt niet opgenomen, alleen als het relevant voor de opname is
verworven afwezigheid van organen	Z90.-	wordt niet opgenomen, alleen als het relevant voor de opname is
afhankelijkheid van hemodialyse	Z99.2	Wordt niet opgenomen. Z99.2 is geen diagnose maar een situatie die meestal terug te zien is in N18.5 (staat wel op de lijst) en in de meeste gevallen een zorgactiviteit.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20211001

### 20211001 Nieuwe adviezen

3-6 Anemie door cytostatica

3-7 Anemie bij neoplasma (C00-D48)

14-5 Bacteriurie NNO

## 20211001 Mutatie en aanvullingen bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie / aanvulling
0-4 Aanvullend coderen	Aanvulling: Codeer alleen aanvullend als de omschrijving van de aanvullende code betekenisvol is.  Nieuwe voorbeelden toegevoegd.  Voorbeeld hepatische encefalopathie laten vervallen omdat dit in de nieuwe versie van de ICD-10 geregeld is d.m.v. een nieuwe code G94.3* en dagger/asterisk.
0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen	Verwijzing naar codeadvies 3-6 opgenomen.
0-16 Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie	Verduidelijking door 'en' te verwijderen: Indien een symptoom of een probleem als de hoofdaandoening is vastgelegd en dit duidelijk een symptoom of probleem van een gediagnosticeerde aandoening betreft, <del>en</del> waarvoor zorg werd gegeven, dan dient de gediagnosticeerde aandoening als hoofddiagnose te worden geselecteerd.  Nieuwe voorbeelden toegevoegd.
1-5 COVID-19	Bij voorbeeld 12 code G62.8 gewijzigd in G62.9.
15-13 Gebruik O35.-	Advies uitgebreid met de situaties waarbij geen afwijkingen worden gevonden.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20210701

### 20210701 Nieuwe adviezen

11-13 Bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening

19-13 Niet-traumatisch subcutaan emfyseem

### 20210701 Mutatie en aanvullingen bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie / aanvulling
0-5 Multipele aandoeningen	Aanvulling: Advies aangevuld met combinaties van aandoeningen geclassificeerd onder O99.0-O99.7: O99.8
0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen	Aanvulling: Verwijzing naar advies 1-5 voor de codering van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie
0-14 C-code voor complicatie bij perinatale aandoeningen en aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed	Aanvulling: Aangevuld dat als je bij een P- of O-code geen C-code gebruikt, je dit ook niet doet bij een daarop aanvullende codering ter specificatie uit andere hoofdstukken

0-16 Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie	<p>Aanvulling: Aangegeven dat als andere codeadviezen uitsluitel geven over de hoofddiagnose, deze adviezen prevaleren boven advies 0-16</p> <p>Verwijzing naar nieuw codeadvies 11-13 aangebracht voor het coderen van de hoofddiagnose van een bloeding bij een gespecificeerde gastro-intestinale aandoening</p>
0-19 De aanduiding 'C' van complicatie in de LBZ	<p>Aanvulling: Voorbeeld van urineweginfectie aangevuld met E-coli ter verduidelijking dat je de veroorzakende bacterie ook als complicatie moet coderen</p>
0-20 Hoofddiagnose bij postoperatieve overname vanuit een ander ziekenhuis	<p>Aanpassing: Voorbeeld opnamereden 1 aangepast</p>
1-5 COVID-19	<p>Aanvulling/wijziging: <b>Ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie (U12.9)</b></p> <p><b>U08.9 / U09.9</b> Verduidelijkingen en aanvullingen bij het gebruik van de codes U08.9 en U09.9 aangebracht</p> <p><b>Voorbeelden</b> Aangepast:</p> <p>15 <u>Opname vanwege een recidief COVID-19 infectie, vastgesteld a.d.h.v. een PCR-test, verder is er na een eerdere COVID-19 infectie nog steeds sprake van een Vermoeidheidssyndroom na COVID-19: U07.1 + G93.3 'vermoeidheidssyndroom na virusinfectie' + U09.9 'Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd'</u></p> <p>Nieuw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongewenste gevolgen na COVID-19 vaccinatie</li> <li>19 Koorts en malaise als reactie op COVID vaccinatie: T88.1 + Y59.0 + U12.9 + R50.2 + R53</li> </ul>

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20210401

### 20210401 Nieuwe adviezen

0-24 Hoofddiagnose bij opname voor orgaantransplantatie

19-12 Complicatie van een JJ-stent (dubbel J-katheter)

### 20210401 Mutatie en aanvullingen bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
------------	---------

1-5 COVID-19

Toegevoegd/gewijzigd:

**U07.1 COVID-19, virus geïdentificeerd**

Verduidelijking wanneer U07.1 mag worden gebruikt:

- COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest bij een patiënt met symptomen
- COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest bij een patiënt zonder symptomen
- COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve antigeen sneltest bij een patiënt met symptomen

**Overplaatsing van en naar ander ziekenhuis**

- Bij overplaatsing van een COVID-19 patiënt is de hoofddiagnose afhankelijk van de reden van overplaatsing:
  - de overplaatsing vindt plaats vanwege het voortzetten van de COVID-19 behandeling en/of herstel van COVID-19 → U07.1/2 is de hoofddiagnose
  - de overplaatsing vindt plaats vanwege een complicatie van COVID-19 of een andere (nieuw ontstane) aandoening → de complicatie of andere aandoening is de hoofddiagnose en U07.1/2 de nevendiagnose.

**Multisystem inflammatory syndrome (MIS-A (in Adults) of MIS-C (in Children)) gerelateerd aan COVID-19**

- Bij het Multisystem inflammatory syndrome (MIS) gerelateerd aan COVID-19, kunnen we onderstaande situaties onderscheiden.

Opnamereden is:

1. MIS na eerder doorgemaakte COVID-19: U10.9
2. MIS met tegelijkertijd COVID-19: U10.9 + U07.1/2
3. COVID-19, gedurende de opname ontwikkeling van MIS U07.1/2 & C U10.9

**Voorbeelden**

12. Patiënt wordt na een bevestigde COVID-19 overgenomen door ziekenhuis B vanwege ernstige 'critical illness'-polyneuropathie, bij overname is patiënt niet meer positief voor COVID-19

Ziekenhuis B: ~~U07.1 + G62.8~~ G62.8 + U07.1

**Nieuwe voorbeelden**

15. Vermoeidheidssyndroom na COVID-19: G93.3 'vermoeidheidssyndroom na virusinfectie' + U09.9 'Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd'

16. Kind, heeft drie maanden geleden Covid-19 gehad.

Nu opgenomen met Post-COVID Associated Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

	<p>(MIS-C) met conjunctivitis: U10.9 'Multisystem inflammatory syndrome gerelateerd aan COVID-19, niet-gespecificeerd' + B30.8† Overige gespecificeerde virale conjunctivitis + H13.1* Conjunctivitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen</p> <p>17. Patiënt wordt twee weken na een COVID-19 infectie opgenomen voor behandeling van een longembolie. PCR-test is nog positief maar patiënt is asymptomatisch en hoeft niet meer in isolatie: I26.9 + U07.1 (de reden van opname is de longembolie, deze is het gevolg van de eerdere COVID-19 infectie, U07.1 is van toepassing omdat patiënt nog positief is (zie de uitleg bij code U07.1) en niet code U09.9.</p>
9-16 Claudicatio intermittens	Aanvulling Advies aangevuld met Fontaine en PAOD en voorbeelden toegevoegd.
15-10 Epidurale pijnbestrijding bij de bevalling	Aanvulling Advies ook voor niet-epidurale pijnbestrijding bij de bevalling en voorbeeld toegevoegd.
Meerdere adviezen	Bij meerdere adviezen zijn paragraafverwijzingen naar deel 2 aangepast aan de nieuwe paragraafindeling

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20210101

Geen nieuwe adviezen

20210101 Mutatie en aanvullingen bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
------------	---------

0-12	<p>Bij het codeadvies is meer de aandacht gevestigd op de relatie tussen de aandoening/complicatie en de medische behandeling. Als die relatie niet is aangetoond of duidelijk is, is dit advies niet van toepassing en wordt de aandoening op de gebruikelijke wijze gecodeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar mogelijk is de tekst verduidelijkt.</li> <li>• De terminologie ‘aandoening of complicatie ten gevolge van een medische behandeling’ is consequenter doorgevoerd.</li> <li>• Waar van toepassing is ‘na’ vervangen voor ‘ten gevolge van’</li> </ul> <p>Aanpassingen in de voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij voorbeeld 3 is cholecystectomie vervangen door het meer realistische CABG.</li> <li>• Voorbeeld 9 is aangepast aan het huidige inzicht: de koorts moet ten gevolge van de operatie zijn gekomen, anders kom je niet uit op code T81.4</li> <li>• Bij voorbeeld 10 is code F05.8 aangepast in F05.9</li> </ul>
1-5 COVID-19	<p>Met ingang van registratiejaar 2021 zijn 3 nieuwe COVID-19 codes beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U08.9 ‘Persoonlijke anamnese van COVID-19, niet-gespecificeerd’</li> <li>• U09.9 ‘Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd’</li> <li>• U10.9 ‘Multisystem inflammatory syndrome gerelateerd aan COVID-19, niet-gespecificeerd’</li> </ul> <p>Toegevoegd/gewijzigd:</p> <p><b>Advies</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NB Bij laboratoriumtesten houden we in dit advies de PCR testen aan en niet de zogenaamde sneltesten</li> </ul> <p><b>Overplaatsing van en naar ander ziekenhuis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als een patiënt aansluitend aan een opname met COVID-19, wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, wordt dit voor de codering van U07.1/2 als één COVID-19 opname gezien, ongeacht of patiënt bij overname nog positief is.</li> </ul> <p><b>Restverschijnselen / late gevolgen na doorgemaakte COVID-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code B94.8 vervangen voor de nieuwe code U09.9</li> <li>• Deze code mag niet worden gebruikt bij opnamen waarbij U07.1/2 is geregistreerd.</li> <li>• Zie voor nadere uitleg voor het coderen van restverschijnselen/late gevolgen deel 2 van de ICD-10, paragraaf 4.4.2 onder het kopje ‘Het coderen van late gevolgen van bepaalde aandoeningen’.</li> </ul> <p><b>Status na COVID-19 zonder restverschijnselen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik code U08.9 ‘Persoonlijke anamnese van COVID-19, niet-gespecificeerd’ als het in de ontslagbrief wordt genoemd of als je in één oogopslag ziet dat door de medisch codeur eerder U07.1/2 en/of U08.9 is geregistreerd, ook zonder relatie tot de huidige opname (dit is een uitzondering op punt A van de uitwerking van het advies 0-2).</li> </ul>

	<p><b>Multisystem inflammatory syndrome gerelateerd aan COVID-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik code U10.9 ‘Multisystem inflammatory syndrome gerelateerd aan COVID-19, niet-gespecificeerd’ aanvullend op U07.1/2. Eventueel worden orgaanfalen of andere uitingen, aanvullend gecodeerd.</li> </ul> <p><b>Voorbeelden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbeeld 12 nieuw: Patiënt wordt na een bevestigde COVID-19 overgenomen door ziekenhuis B vanwege ernstige ‘critical illness’-polyneuropathie, bij overname is patiënt niet meer positief voor COVID-19 Ziekenhuis B: U07.1 + G62.8</li> <li>• Voorbeeld 13: code B94.8 vervangen door de nieuwe code U09.9.</li> <li>• Voorbeeld 14 nieuw: Vermoeidheidssyndroom na COVID-19: G93.3 ‘vermoeidheidssyndroom na virusinfectie’ + U09.9 ‘Post COVID-19 aandoening, niet-gespecificeerd’</li> </ul>
10-4 Pneumosepsis	In de ICD-10 versie 2021 is de alfabetische ingang pneumonie, - bij, - - sepsis komen te vervallen. Daarom is de derde bullet van het advies (Indien in een zeldzaam geval de sepsis de oorzaak is van de pneumonie, codeer dan de dagger-asterisk combinatie A41.-† J17.0* (via het zoekpad Pneumonie – bij (door) - - sepsis)) vervallen
12-5 Dog-ear	Code L98.8 vervangen voor de nieuwe code L98.7 ‘overmatige en overtollige huid en subcutis’
13-2 Haglundse exostose	Vanwege de nieuwe alfabetische ingang Haglund, - misvorming of ziekte (verworven) M77.3, is het codeadvies aangepast van code M89.97 in code M77.3.
13-3 Niet-traumatisch labrumlesie van het heupgewricht	Omdat er een nieuwe code is toegevoegd voor een niet-traumatische labrum lesie van de schouder (M75.6) welke via de alfabetische index is te vinden, heeft het codeadvies alleen nog betrekking op het heupgewricht. Alfabetische ingang: letsel, schouder, - - labrum S43.4, - - - oud letsel of oude scheur M75.6.
13-11 Posttraumatische dystrofie	Code M89.0 vervangen door de nieuwe code G90.5 ‘Complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1)’. CRPS-1 toegevoegd als synoniem.
16-1 BRUE/ALTE	Codeadvies 16-1 ALTE/near SIDS is aangepast a.d.h.v. de huidige terminologie en inzichten

20210101 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
0-4 Aanvullend coderen	In verband met de nieuwe code G94.3* ‘encefalopathie bij elders geclassificeerde ziekten’ is de codering van het voorbeeld ‘Hepatische encefalopathie’ is aangepast van K72.9 + G93.4 in K72.9† + G94.3*.

2-9 Symptomen en aandoeningen i.h.k.v. een maligniteit	Het ileus bij voorbeeld 7 aangepast van K56.7 in K56.6 'overige en niet-gespecificeerde darmobstructie'
15-20 Zwangerschapsduur missed abortion en intra-uteriene vruchtdood	Aanduiding van de zwangerschapsduur tot en vanaf 16 weken verduidelijkt.

## 20210101 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
6-3 'Lewy body'- dementie	Dit advies is overbodig i.v.m. een nieuwe alfabetische ingang: dementie, - Lewy body(ies) G31.8† F02.8*
7-2 Ptosis wenkbrauw	Dit advies is overbodig i.v.m. een uitbreiding in de ICD-10 versie 2021. Alfabetische ingang: ptosis, - wenkbrauw L98.7
9-2 Brugada syndroom	Dit advies is overbodig i.v.m. een nieuwe alfabetische ingang: Brugada syndroom I49.8
9-17 Ischemisch CVA	Dit advies is overbodig i.v.m. een nieuwe alfabetische ingang: accident, - cerebrovasculair, - - ischemisch I63.9
11-5 Angiodysplasie van de dunne darm	Dit advies is overbodig i.v.m. een uitbreiding in de ICD-10 versie 2021. Alfabetische ingang: angiodysplasie (caecum) (colon) (darm) K55.2, - dunnen darm K55.3
12-3 Huidoverschot na (extreem) afvallen	Dit advies is overbodig i.v.m. een uitbreiding in de ICD-10 versie 2021. Alfabetische ingang: overtollig, - huid (na gewichtsverlies) L98.7.
13-19 Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)	Dit advies is overbodig i.v.m. een uitbreiding in de ICD-10 versie 2021. Alfabetische ingang: complex regionaal pijnsyndroom (overig) (ongespecificeerd) G90.7, - type I G90.5, - type II G90.6
18-7 Systolische soufflé	Dit advies is overbodig i.v.m. een nieuwe alfabetische ingang: geruis, - systolisch R01.1

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20201001

### 20201001 Nieuwe adviezen

- 5-6 Schadelijke gevolgen van lachgas (recreatief gebruik)
- 10-12 Trapped lung
- 11-12 Inwendige herniatie na een gastric bypass
- 20-12 Ongeval met elektrische step

### 20201001 Mutatie en aanvullingen bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-19 De aanduiding 'C' van complicatie in de LBZ	Aanwijzingen toegevoegd indien niet duidelijk is of een aandoening/complicatie al bij opname aanwezig is  Verduidelijkingen en voorbeeld toegevoegd voor de coderingen van verergeringen/ontregelingen van een aandoening
1-5 COVID-19	<b>U07.2 COVID-19, virus niet geïdentificeerd</b>

	NB toegevoegd waarin staat dat de interpretatie van eventueel genoemde CO-RADS-scores wordt overgelaten aan de medisch specialist
6-6 Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)	G58.1 aangepast in G58.0

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20200701

### 20200701 Nieuwe adviezen

6-6 Anterieur Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)

9-28 Longembolie met rechtsbelasting

### 20200701 Update bestaand advies

Codeadvies	Mutatie
1-5 COVID-19	<p><b>U07.2 COVID-19, virus niet geïdentificeerd</b> De woorden 'nog' (3x) tussen haakjes geplaatst omdat er ook situaties zijn waarbij geen laboratoriumtest wordt uitgevoerd.</p> <p><b>COVID-19 uitgesloten</b> Opgenomen Z03.8 niet wordt vastgelegd als de laboratoriumtest (procedureel) wordt gedaan zonder dat er sprake is van verdenking op COVID-19.</p> <p><b>Hoofddiagnose / nevensdiagnose</b> Opgenomen dat als COVID-19 de reden van opname is bij zwangerschap, bevalling en kraambed, U07.1/.2 de hoofddiagnose is.</p> <p><b>Overplaatsing van en naar ander ziekenhuis</b> Wijze van registratie bij overplaatsing van en naar een ander ziekenhuis opgenomen</p> <p><b>Restverschijnselen / late gevolgen na doorgemaakte COVID-19</b> Het coderen van restverschijnselen na COVID-19 opgenomen</p> <p><b>Status na COVID-19 zonder restverschijnselen</b> Het coderen van status na COVID-19 zonder restverschijnselen opgenomen</p> <p><b>Voorbeelden</b> Voorbeelden 11, 12 en 13 toegevoegd</p>

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20200501

### 20200501 Nieuwe adviezen

0-23 Neutropene koorts door chemotherapie

1-5 COVID-19 (nieuw in document maar reeds op DHD-site gepubliceerd)

2-14 Mastitis carcinomatosa

6-5 Rib-tip syndroom

10-11 Astma en COPD overlap syndroom (ACOS)

- 13-19 Complex regionaal pijnsyndroom(CRPS)
- 19-11 Subcutaan gelopen infuus (extravasatie)
- 20-11 Y-code voor bijwerking van immunotherapie als behandeling voor maligne aandoening

#### 20200501 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
10-10 E-sigaret gerelateerde aandoeningen en gebruik van e-sigaret	Op basis van het definitieve WHO-advies is de volgorde van de codering aangepast: U07.0 is de eerst te coderen aandoening en de manifestaties worden aanvullend gecodeerd.

#### 20200501 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
2-8 Lymfangitis-, peritonitis- en pleuritis carcinomatosa	NB3 toegevoegd met verwijzing naar codeadvies 2-15 voor mastitis carcinomatosa
10-6 Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie	Vermeld dat als er sprake is van respiratoire insufficiëntie bij COVID-19, COVID-19 altijd de hoofd- en primaire diagnose is.

### Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20200101

#### 20200101 Nieuwe adviezen

- 10-10 E-sigaret gerelateerde aandoeningen en gebruik van e-sigaret
- 15-21 Angst voor de bevalling
- 15-22 Persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed
- 18-9 Hemodynamische instabiliteit
- 18-10 Longinfiltraat NNO

#### 20200101 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-2 Coderen van nevendiaagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ	Advies is aangevuld met de verwijzing naar een lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren (bijlage 1).
15-10 Epidurale pijnbestrijding bij de bevalling	In tegenstelling tot het eerdere advies wordt epidurale pijnbestrijding, zonder medische indicatie, gecodeerd met 099.8
15-14 GBS-dragerschap bij zwangerschap en bevalling	In de titel opgenomen dat het gaat om GBS-dragerschap bij zwangerschap en bevalling en dat het wordt gecodeerd met 099.8 + Z22.3.
15-18 HIV-positiviteit bij zwangerschap en bevalling	In de titel opgenomen dat het gaat om HIV-positiviteit bij zwangerschap en bevalling en dat het wordt gecodeerd met 099.8 + Z21
15-19 O-codes bij andere specialismen dan gynaecologie	Nadruk gelegd op het al dan geen relatie hebben van de aandoening met de zwangerschap. Toelichting en voorbeelden a.d.h.v. uitgebreid.

20200101 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
0-4 Aanvullend coderen	3 voorbeelden toegevoegd
0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling	Bij voorbeeld 3 een C voor code Y83.6 gezet.
1-4 Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie	Bij voorbeeld 4 code aangepast in B95.6 (i.p.v. B96.5)
9-21 Doorgemaakt CVA (uit de reeks I60-I64)	Opmerking aangevuld met dat de manifestaties aanvullend gecodeerd worden ongeacht of deze bij ontslag nog aanwezig zijn.
15-5 Gebruik O80-O84	Advies verduidelijkt door aanpassing in opmaak en a.d.h.v. de toelichting en een voorbeeld verduidelijkt dat O80-O84 alleen als hoofddiagnose gebruikt mogen worden als er geen enkele ander O-code is geregistreerd.
15-16 Hoofddiagnose bij bevallingen	Bij stap 6 de 2 codes Z87.5 aangepast in Z35., in lijn met codeadvies 15-22.

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20191001

20191001 Nieuwe adviezen

- 9-26 Aborted myocardinfarct
- 9-27 MINOCA
- 11-11 Presacraal abces
- 13-18 ANCA-geassocieerde vasculitis

20191001 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
19-9 Luxatie gewrichtsprothese door ongeval	Code T84.0 aangevuld met S73.0 om de complicatie nader te specificeren

20191001 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
9-6 Hemorragisch infarct	Titel aangepast in Hemorragisch herseninfarct
0-5 Multipele aandoeningen	'Let op' verwijzing toegevoegd naar codeadvies 9-15 'Multipele klepaandoeningen'.

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20190401

20190401 Nieuwe adviezen

- 0-22 Dagger-asteriskcombinaties

- 1-3 Bacteriëmie
- 1-4 Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie
- 9-25 Arteriële wandonregelmatigheden en niet-significante arteriosclerose
- 20-10 Gebruik van meerdere codes uit hoofdstuk 20

#### 20190401 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
Gehele document	Daar waar relevant, zijn codes uit hoofdstuk 20 aangevuld met een 'C' aanduiding. Zie voor de toelichting onderstaande mutatie bij codeadvies 0-19.
0-19 De aanduiding 'C' van complicatie in de LBZ	<p>Als een complicatie ontstaat tijdens een opname waarbij een aanvullende code voor de uitwendige oorzaak (hoofdstuk 20) wordt geregistreerd, krijgt de code uit hoofdstuk 20 ook een 'C' aanduiding. Het aanduiden van een hoofdstuk 20 code met een 'C' was al langer toegestaan en als zodanig beschreven in de LBZ gebruikershandleiding. In de nieuwe versie van de Gebruikershandleiding LBZ (voorjaar 2019) zal dit strakker gesteld worden en daar wordt met codeadvies 0-19 op aangesloten. 2019 wordt als overgangsjaar beschouwd en het is daarom geen probleem als het nog niet voor het hele registratiejaar 2019 op deze manier geregistreerd wordt.</p> <p>Voorbeeld toegevoegd over een COPD patiënt die tijdens de opname een exacerbatie ontwikkelt.</p>

#### 20190401 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
10-4 Pneumosepsis 14-2 Urosepsis 19-8 Lijnsepsis	Verwijzing naar codeadvies 1-4 'Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie' opgenomen.
21-9 Z76.3 en Z76.2	In de vraagstelling aangegeven dat het advies ook de codering voor een gezonde zuigeling die meekomt met een zieke moeder, betreft.

#### 20190401 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
1-2 Bacteriëmie of sepsis?	Dit advies vervalt i.v.m. nieuwe adviezen 1-3 Bacteriëmie en 1-4 Volgorde van codering bij sepsis vanuit een lokale infectie

### Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20190101

#### 20190101 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
9-23 Slechte of matige linkerventrikelfunctie	Het advies geldt specifiek voor een slechte en matige linkerventrikelfunctie en niet zoals eerder voor een slechte en -de minder specifieke term- verminderde linkerventrikelfunctie.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20181001

### 20181001 Nieuwe adviezen

- 2-12 Secundaire lokalisatie van maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (C81-C96)
- 2-13 Recidief carcinoom
- 3-4 Macrocytaire anemie zonder foliumzuurdeficiëntie
- 3-5 Trombocytose/trombocytemie NNO
- 9-24 Links- en rechts decompensatio cordis
- 12-5 Dog-ear
- 14-04 Astma renale
- 19-10 AntebrachiifRACTuur
- 21-17 Aanwezigheid van katheters

### 20181001 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
0-20 Hoofddiagnose bij postoperatieve overname vanuit een ander ziekenhuis	Verwijzing opgenomen naar codeadvies 9-21 voor postoperatieve overdacht na operatieve behandeling van een CVA.
2-8 Lymfangitis-, peritonitis- en pleuritis carcinomatosa	NB2 toegevoegd met verwijzing naar codeadvies 2-12
9-5 STEMI/nonSTEMI	Verduidelijkt dat het om een code uit een reeks gaat.
17-3 Gecorrigeerde congenitale afwijkingen	Verduidelijkt dat het om een (resterende) congenitale aandoening gaat.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20180701

### 20180701 Nieuwe adviezen

- 2-11 Gebruik van code C77.8
- 4-6 Hyperosmolaire hyperglykemische ontregelde diabetes mellitus
- 9-23 Slechte of verminderde linker ventrikel functie
- 15-19 O-codes bij andere specialismen dan gynaecologie
- 15-20 Zwangerschapsduur missed abortion en intra-uteriene vruchtdood
- 21-16 Euthanasie

### 20180701 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
------------	---------

0-14 C-code voor complicatie bij perinatale aandoeningen en aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed	Beschreven dat complicaties tijdens de opname met een code uit het blok 094-099, waarbij de aandoening overduidelijk in het kraambed is ontstaan, als complicatie geregistreerd dienen te worden. Bij twijfel of de aandoening als complicatie beschouwd moet worden, wordt het niet als complicatie vastgelegd.
19-8 Lijnsepsis	Beschreven dat een sepsis alleen aanvullend gecodeerd wordt als uit de documentatie van de arts blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een sepsis. Hiermee is het advies in lijn gebracht met de adviezen over urosepsis en pneumosepsis.

20180701 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen	Bij punt 1 van het advies verduidelijkt dat het om een code uit de reeks A00-R99 of T80-T88.8 gaat.
9-23→ 6-4 ICU acquired weakness	Dit advies was bij het verkeerde hoofdstuk genummerd

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20180401

### 20180401 Nieuwe adviezen

2-10 Meerdere onafhankelijk gelokaliseerde primaire maligne tumoren in één orgaan  
9-23 ICU acquired weakness

### 20180401 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-5 Multipele aandoeningen	Voorbeeld afgestemd op nieuw advies 2-10
0-10 Dubbelzijdige aandoeningen	Afgestemd op nieuw advies 2-10
2-1 Maligne neoplasma van onafhankelijke multipele lokalisaties C97	Afgestemd op nieuw advies 2-10
9-17 Ischemisch CVA	Aangepast n.a.v. opmerkingen uit het veld/hernieuwd inzicht

20180401 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
2-5 Doorgroei van maligne neoplasma	Voorbeeld verwijderd

### 20180401 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
------------	-------

2-3 Meerdere maligniteiten in hetzelfde orgaanstelsel	Dit advies vervalt i.v.m. nieuw advies 2-10
---	---

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20180101

### 20180101 Nieuwe adviezen

- 0-21 Hiërarchie van exclusies
- 9-22 Asystolie niet resulterend in reanimatie en/of overlijden
- 13-17 Neurogene claudicatio
- 18-7 Systolische soufflé
- 18-8 Verhoogd troponine

### 20180101 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
15-6 Dreigende serotoniniteit	Het advies is gewijzigd. In tegenstelling tot het eerdere advies wordt dreigende situatie, m.i.v. registratiejaar 2018 als aandoening/toestand vastgelegd.

### 20180101 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
0-2 Coderen van nevendiagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ	Bij punt B (chronische aandoeningen) opgenomen dat bij twijfel de chronische aandoening gecodeerd dient te worden.
0-18 Plastische (reconstructieve) chirurgie	Een voorbeeld opgenomen over wanneer Z42.- wel is toegestaan.
9-3 Rechtsdecompensatie en cardiomyopathie	Voor de volgorde van de codering een verwijzing opgenomen naar codeadvies 0-16.
16-8 Pasgeborene zowel prematuur als dysmatuur	Bij het eerste voorbeeld code P07.1 toegevoegd als aanvullende code. Een NB opgenomen over het coderen van het geboortegewicht en zwangerschapsduur bij overplaatsing van pre- en dysmaturen.
0-19 De aanduiding 'C' van complicatie in de LBZ	Een verwijzing opgenomen naar codeadvies 0-14 voor het registreren van complicatie bij perinatale aandoeningen en aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed.
0-11 Opname voor diagnostisch onderzoek (zonder behandeling)	Een voorbeeld toegevoegd voor een allergische reactie door een provocatietest zonder ziekteverschijnselen.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20171001

### 20171001 Nieuwe adviezen

10-9 Emfysemateus COPD

19-9 Luxatie gewrichtsprothese door ongeval

### 20171001 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
10-2 Exacerbatie chronische longaandoening	Titel aangepast zodat duidelijk is dat het advies de aandoeningen uit de reeks J40-J47 betreft. Middels een NB extra informatie over de geldende exclusie en het gebruik van J44.0 opgenomen.
18-3 Prerenale nierinsufficiëntie	Advies en toelichting uitgebreid met postrenale nierinsufficiëntie.

### 20171001 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
20-6 Complicaties na het plaatsen van orthopedische prothesen	Een verwijzing naar 19-9 Luxatie gewrichtsprothese door ongeval, opgenomen.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20170701

### 20170701 Nieuwe adviezen

10-8 Cryptogene organiserende pneumonie (COP / BOOP)

### 20170701 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
15-9 Pijnstilling tijdens zwangerschap	Dit advies wordt als niet relevant gezien omdat de indicatie voor de pijnstilling niet is gegeven.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20170401

### 20170401 Nieuwe adviezen

9-21 Doorgemaakt CVA (uit de reeks I60-I64)

12-4 Sacrale dimple

### 20170401 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
9-6 Hemorragisch infarct	Het advies is genuanceerd voor als de oorzaak van het infarct bekend is en aangevuld met een toelichting.

0-15 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten	In voorbeeld 2 de code voor laat gevolg van CVA gecorrigeerd in I69.4 (was I69.8).
--	--

20170401 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
9-12 CADASIL	Opgenomen dat F01.2 <b>aanvullend</b> gecodeerd wordt.
10-7 Influenza	De NB, aangevuld met J11

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20170101

### 20170101 Nieuwe adviezen

- 0-20 Hoofddiagnose bij postoperatieve overname vanuit een ander ziekenhuis
- 9-20 Hoofddiagnose bij behandeling en nazorg acuut myocardinfarct met coronairsclerose
- 10-7 Influenza
- 19-8 Lijnsepsis

### 20170101 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-10 Dubbelzijdige diagnoses	Titel gewijzigd in 'Dubbelzijdige aandoeningen'. Advies verduidelijkt: Dubbelzijdige aandoeningen worden alleen vastgelegd bij codes waarbij de z.g.n. 'multipelen' categorieën worden gebruikt.
9-12 CADASIL	Benoemd dat een dementie alleen aanvullend gecodeerd wordt als deze zich heeft ontwikkeld. Omdat het subcorticale infarcten betreft is de aanvullende code voor de dementie aangepast van F01.1 in F01.2.
9-19 Hoofddiagnose bij out of hospital cardiac arrest (OHCA)	Advies is gewijzigd: I46.0 is bij opname na OHCA de hoofddiagnose i.p.v. nevendiagnose.

20170101 Tekstuele aanpassingen (niet als mutatie per advies in dit document aangegeven)

Codeadvies	Mutatie
Algemeen	Geldt voor gehele document: <ul style="list-style-type: none"> <li>• omschrijving van gebruik van aanduiding 'C' van complicatie in de LBZ verduidelijkt: het gaat om aandoeningen die tijdens het verblijf in het ziekenhuis <i>ontstaan</i>.</li> <li>• codes J44 en J96 krijgen met ingang van 1-1-2017 een vijfde teken. Dit is verwerkt in de betreffende adviezen door met '-' aan te geven dat er nog een cijfer moet volgen.</li> </ul>
0-5 Multipelen aandoeningen	Aangepast dat een code voor multipelen aandoeningen zowel als hoofd- als primaire diagnose vastgelegd kan worden (i.p.v. alleen als hoofdaandoening)

11-9 High output stoma (HOS)	Bij het advies toegevoegd dat de volgorde van codering van HOS en gevolgen van HOS, afhankelijk is van de reden van opname.
10-6 Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie	Verwijzing naar IC vervangen door intensivist of intensivisme. Bij de LBZ gaan we uit van registratie per specialisme en niet per afdeling.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20161001

### 20161001 Nieuwe adviezen

0-19 De aanduiding 'C' van complicatie in de LBZ

11-10 Overloopdiarree

13-16 Klapvoet

### 20161001 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-8 Acute exacerbaties bij chronische aandoeningen	Paginaverwijzing aangepast: ( <i>zie 'Het coderen van acute en chronische aandoeningen'</i> ) (pagina 116-117)
0-10 Dubbelzijdige diagnosen	Paginaverwijzing aangepast
0-17 Onderzoek vanwege positieve iFOBT-test bij darmkankerscreening	Suggestie in de opmerking dat een code voor screeningsonderzoek alleen gebruikt mag worden voor bevolkingsonderzoek verwijderd.
16-4 Perinatale en neonatale aandoeningen	Stappenplan bij codering van perinatale en neonatale aandoeningen toegevoegd
16-6 Pasgeborene van moeder met HIV-infectie, pasgeborene geen infectie	Termen HIV-infectie aangepast in HIV-infectieziekte.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20160701

### 20160701 Nieuwe adviezen

10-6 Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie

13-15 'Oud' versus 'vers' letsel van het bewegingsstelsel

### 20160701 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-1 Definitie hoofddiagnose	Advies aangevuld met definitie primaire diagnose
0-6 Multiorgaanfalen (MOF)	Bij de toelichting opgenomen dat de alfabetische index van de nieuwe versie van de ICD-10 de suggestie R68.8 geeft voor MOF maar dat deze code in principe wordt afgeraden.
0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling	Voorbeeld 7 voor de pneumothorax aangepast van pleurapunctie in het aanbrengen van een centrale lijn. Een pleurapunctie is geen onbedoelde punctie of laceratie (zie nieuwe voorbeeld 20) 3 voorbeelden aan advies toegevoegd:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 Duralek/liquorlekkage na hersenoperatie</li> <li>• 20 Duraletsel/lekkage onbedoeld ontstaan door HNP operatie</li> <li>• 21 Pneumothorax na pleuradrainage middels pleurapunctie</li> </ul>
10-4 Pneumosepsis	Aangepast dat voor het aanvullend coderen van de sepsis de bacterie niet in de bloedbaan aangetoond hoeft te worden maar uit de documentatie van de arts moet blijken dat er sprake van een sepsis is. Toelichting bijgevoegd en tekstueel in lijn gebracht met codeadvies 14-2 Urosepsis.
14-2 Urosepsis	Aangepast dat voor het aanvullend coderen van de sepsis de bacterie niet in de bloedbaan aangetoond hoeft te worden maar uit de documentatie van de arts moet blijken dat er sprake van een sepsis is. Toelichting bijgevoegd.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20160401

### 20160401 Nieuwe adviezen

- 0-2 Coderen van nevendiaagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ
- 2-8 Lymfangitis-, peritonitis- en pleuritis carcinomatosa
- 2-9 Symptomen en aandoeningen in het kader van een maligniteit
- 4-5 Type 2-diabetes met insulinebehandeling
- 9-19 Hoofddiagnose bij out of hospital cardiac arrest (OHCA)
- 11-9 High output stoma (HOS)
- 19-6 Licht traumatisch schedelhersenletsel (LTSH)
- 19-7 CAPD-gerelateerde peritonitis
- 21-15 Status na TIA

### 20160401 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-2 Risicofactoren	Advies vervangen door algemener advies 'Coderen van nevendiaagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ'.
0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling	2 voorbeelden aan advies toegevoegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiatie oesofagitis twee maanden na laatste bestraling</li> <li>• Plexus brachialis letsel door radiotherapie in het verleden</li> </ul>
4-1 Ontregelde diabetes	Voorbeelden (o.a. hyperglykemische DM NNO & hypoglycemische DM NNO) toegevoegd en toelichting uitgebreid.
9-18 Stenose van een coronaire stent en van een coronaire bypass (CABG)	Advies uitgebreid met stenose in andere (niet coronaire) arteriële stents / bypasses (zie NB).
21-2 Palliatieve zorg	Advies aangepast:

	Codeer Z51.5 ook als er een zorgactiviteit die de palliatieve zorg beschrijft is vastgelegd.
--	--

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20160101

### 20160101 Nieuwe adviezen

- 2-7 Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie
- 19-5 Trauma capitis

### 20160101 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
13-8 Spondylodiscitis	Code en tekst aangepast in 2 <sup>e</sup> vraag: <del>M46.9 "Inflammatoire spondylopathie, niet gespecificeerd"</del> <u>M46.5 'Overige infectieuze-spondylopathieën'</u> (juiste zoekpad is: spondylitis, infectieus NEC M46.5)
20-9 Scooterongevallen (bij verkeersongevallen)	Motorscooter uit het advies gehaald (SWOV: motorrijders zijn veel minder geneigd om hun vervoermiddel als scooter te omschrijven en echte motorscooters komen ook niet zo vaak voor).  Scooter NNO was eerst geadviseerd als snorscooter te coderen (argument dat de meeste ongevallen hiermee gebeuren). Dit blijkt volgens de SWOV eerder andersom te liggen, maar niet in die mate dat je een standaardwaarde zou kunnen nemen.  Titel aangepast: Ongevalscode voor gewonde scooterrijder.

### 20160101 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
9-9 Atherosclerotisch gangreen	ICD-10 tabel is aangepast: het is nu mogelijk het vijfde teken 0 'zonder gangreen en 1 'met gangreen' bij de codes I70.2, I70.8 en I70.9 te registreren.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20151001

### 20151001 Nieuwe adviezen

- 0-18 Plastische (reconstructieve) chirurgie
- 15-18 Bevalling bij HIV-positieve moeder
- 16-5 Pasgeborene van moeder met GBS-infectie, pasgeborene geen infectie
- 16-6 Pasgeborene van moeder met HIV-infectie, pasgeborene geen infectie
- 16-7 Pasgeborene van moeder met GBS- of HIV-dragerschap, pasgeborene geen infectie
- 16-8 Pasgeborene zowel prematuur als dysmatuur

## 20151001 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling	Voorbeeld 9 verduidelijkt waarom T81.4 de juiste code is Voorbeeld 10 aangepast n.a.v. nieuwe ingang voor postoperatief delier Bij voorbeeld 15 een 'C' voor complicatie toegevoegd aan de codes T81.2 en S37.30
0-17 Onderzoek vanwege positieve iFOBT-test bij darmkanker-screening	N.a.v. nieuwe ingang voor occult bloed in ontlasting codeadvies aangepast van R85.5 in R19.5
1-1 Diarree NNO	N.a.v. de nieuwe versie van de ICD-10 is het advies gewijzigd van K52.9 in A09.9
2-6 Marginale zone lymfoom	Onderscheid gemaakt in de 3 belangrijkste soorten marginale zone lymfomen
9-9 Atherosclerotisch gangreen	Zodra RIVM de ICD-10 tabel heeft aangepast aan het opnemen van het vijfde teken 0 'zonder gangreen en 1 'met gangreen' bij de codes I70.2, I70.8 en I70.9, komt dit advies te vervallen
15-17 Afbreken zwangerschap vanwege foetale afwijking	Bij de toelichting opgenomen wanneer Z237.- aanvullend gecodeerd moet worden
19-4 Brandwonden	Tekst dat codes T31.- en T32.- alleen worden gebruikt bij 3e graads verbrandingen of bij 1e en 2e graads verbrandingen die groter of gelijk zijn dan 30% van het lichaamsoppervlak, vervallen omdat deze opmerking achterhaald is.
21-2 Palliatieve zorg	Beter laten aansluiten bij codeadvies 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ
21-8 Verwijderen van een CAPD katheter	Beter laten aansluiten bij codeadvies 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ
21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ	Advies algemener gemaakt; geldt niet alleen voor de codering als aanvullende code maar ook voor de hoofddiagnose
21-14 Opname voor preventieve verrichtingen i.v.m. genetische aanleg	Toelichting opgenomen waarom codeadvies 21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ, hier niet van toepassing is

## 20151001 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
3-2 Heterozygote proteïne-S-deficiëntie	In verband met de nieuw toegevoegde code D68.5 'primaire trombofilie'
5-2 Postoperatief delier	De alfabetische lijst van de nieuwe ICD-10 versie heeft een ingang voor delier postoperatief
11-2 Gastro-intestinale mucositis bij chemotherapie	De alfabetische lijst van de nieuwe ICD-10 versie heeft een ingang voor mucositis gastro-intestinale
11-4 Gastro-enteritis van de kinderleeftijd	N.a.v. de nieuwe versie van de ICD-10 waarin gastro-enteritis NNO is gewijzigd van K52.9 in A09.9
13-6 Pijn in de schouder	De alfabetische lijst van de nieuwe ICD-10 versie heeft een nieuwe ingang voor pijn schouder
15-11 Navelstreng omstrengeling zonder compressie	De alfabetische lijst van de nieuwe ICD-10 versie heeft een ingang voor navelstrengomstrengeling zonder compressie

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150801

### 20150801 Nieuwe adviezen

- 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling
- 0-13 Aandoeningen veroorzaakt door geneesmiddelen
- 0-14 C-code voor complicatie bij perinatale aandoeningen en aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
- 0-15 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten
- 0-16 Volgorde van coderen van etiologie en manifestatie
- 0-17 Onderzoek vanwege positieve iFOBT-test bij darmkankerscreening
- 2-6 Marginale zone lymfoom
- 5-5 GHB-intoxicatie
- 9-16 Claudicatio intermittens
- 9-17 Ischemisch CVA
- 9-18 Stenose van een coronaire stent en van een coronaire bypass (CABG)
- 10-5 Tonsillitis en hypertrofie van de tonsillen bij tonsillectomie
- 12-3 Huidoverschot na (extreem) afvallen
- 13-14 Carpal boss
- 14-3 Preterminale nierinsufficiëntie
- 16-3 Behoeftte aan extra zorg/aandacht/observatie bij gezonde neonaten
- 16-4 Perinatale en neonatale aandoeningen
- 17-3 Gecorrigeerde congenitale afwijkingen
- 18-6 SIRS
- 20-8 Y-codering bij complicaties door genees- en heelkundige behandeling
- 20-9 Scooterongevallen (bij verkeersongevallen)

### 20150801 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-7 Koemelkallergie	Verduidelijkt en voorbeelden toegevoegd
2-4 Hoofddiagnose bij behandeling maligniteiten	Verduidelijkt en voorbeelden toegevoegd
5-2 Postoperatief delier	Meer de nadruk gelegd op het al dan niet bestaan van een relatie tussen de aandoening en de operatie, n.a.v. nieuw codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling
9-1 Postoperatief atriumfibrilleren	Meer de nadruk gelegd op het al dan niet bestaan van een relatie tussen de aandoening en de operatie, n.a.v. nieuw codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling
14-1 Fausse route urethra door katheter	Codering aangepast o.b.v. nieuw inzicht n.a.v. nieuw codeadvies 0-12 Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling
20-6 Complicaties na het plaatsen van orthopedische prothesen	Verduidelijkt dat de complicaties genoemd bij T82.0 en T82.8 ook voor T84.- gelden.

## Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101

### 20150101 Nieuwe adviezen

- 0-11 Opname voor diagnostisch onderzoek (zonder behandeling)
- 2-4 Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit
- 2-5 Doorgroei van maligne neoplasma
- 5-4 Psychomotore retardatie
- 10-4 Pneumosepsis
- 9-15 Multipole klepaandoeningen
- 13-13 Artrose primair / secundair
- 14-2 Urosepsis
- 15-15 Bekkeninstabiliteit
- 15-16 Hoofddiagnose bij bevallingen
- 15-17 Afbreken zwangerschap vanwege foetale afwijking

### 20150101 Mutaties op bestaande adviezen

Codeadvies	Mutatie
0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen	Verduidelijkt
3-3 Doorgesloten antistolling	Gedeelte van het advies over doorgesloten antistolling met een gespecificeerde bloeding aangepast in: D68.3 'Hemorragische aandoening door circulerende anticoagulantia'+ Y44.2 'Ongewenst gevolg Anticoagulantia' + aanvullend de bloeding. Was: de bloeding als eerste, gevolgd door Y44.2
21-12 Z-codes voor verrichtingen in de LBZ	Voorbeelden aangepast aan het nieuwe codeadvies 2-4 Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit

### 20150101 Vervallen adviezen

Codeadvies	Reden
2-2 Klatskin-tumor	De code "Klatskin-tumor" is juist opgenomen in de index van de 2014 versie van de ICD-10.
11-1 Mucositis van de mond na chemotherapie	Orale mucositis is opgenomen in de 2014 versie van de ICD-10 (K12.3).
20-1 Bromfietsongevallen	De bromfiets(er) en de motorfiets(er) zijn in de 2014 versie van de ICD-10 wél goed te onderscheiden.
21-1 Aanwezigheid ICD/zorg ICD	De omschrijving "cardiale pacemaker" is vervangen door de omschrijving "elektronische cardiale hulpmiddelen" in de 2014 versie van de ICD-10
21-3 Cytostaticumkuur	In verband met nieuw codeadvies 2-4 Hoofddiagnose bij behandeling maligniteit
21-4 Zelfverwaarlozing	De term "zelfverwaarlozing" is opgenomen in de 2014 versie van de ICD-10 (bij R46.8 staat nu de inclusie "zelfverwaarlozing NNO" en tevens exclusie naar R63.6)

## Bijlage 1 Lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren

Bijlage heeft betrekking op, codeadvies 0-2.

Deze lijst bevat (chronische) aandoeningen en factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden met de daarbij behorende ICD-10 codes. De aandoening/omschrijving is bepalend voor het toepassen van de lijst en niet de code. Soms is de ICD-10 code in zijn geheel opgenomen en soms moet deze worden aangevuld met het passende vierde en/of vijfde teken (te herkennen aan het platte streepje achter de code). Als een code in zijn geheel is opgenomen dan geldt deze alleen voor de daarbij genoemde aandoening. Bijvoorbeeld J82, de richtlijn om deze altijd te coderen geldt alleen in het geval deze code is geregistreerd voor eosinofiel astma.

Mutaties in deze lijst gelden met ingang van registratiejaar 2022 (zie mutatieblad)

aandoening/omschrijving	ICD-10
chronische virushepatitis	B18.-
ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]	B20-B24
maligne neoplasma	C00-C96
diabetes mellitus, met en zonder complicaties	E10.- t/m E14.-
dementie	F00-F03
zwakzinnigheid	F70-F79
psychomotore retardatie	F83
ziekte van Huntington	G10
hereditaire ataxie	G11.-
spinale spier-atrofie en verwante syndromen	G12.-
ziekte van Parkinson	G20
ziekte van Alzheimer	G30.-
overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd	G31.-
multiple sclerose	G35
cerebral palsy	G80.-
hypertensie	I10
hypertensieve hartziekte	I11.-
hypertensieve nierziekte	I12.-
hypertensieve hart- en nierziekte	I13.-
vroeger myocardinfarct	I25.2
ischemische cardiomyopathie	I25.5
cardiomyopathie	I42.-
chronisch hartfalen	I50.-
late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten	I69.-
eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis	J41.-
niet-gespecificeerde chronische bronchitis	J42
emfyseem	J43.-
COPD (overige chronische obstructieve longaandoeningen)	J44.- -
astma	J45.-
bronchiectasie	J47
mijnwerkerspneumoconiose	J60
pneumoconiose door astbest en andere minerale vezels	J61

pneumoconiose door silicahoudende stof	J62.-
pneumoconiose door overige anorganische stofdeeltjes	J63.-
niet-gespecificeerde pneumoconiose	J64
pneumoconiose samengaannd met tuberculose	J65
eosinofiel astma	J82
overige interstitiele longziekten	J84.-
alcoholische leverfibrose en leversclerose	K70.2
alcoholische levercirrose	K70.3
toxische leverziekte met chronische persisterende hepatitis	K71.3
toxische leverziekte met chronische lobulaire hepatitis	K71.4
toxische leverziekte met chronische actieve hepatitis	K71.5
toxische leverziekte met leverfibrose en levercirrose	K71.7
chronische leverinsufficiëntie	K72.1
chronische hepatitis	K73.-
leverfibrose en levercirrose	K74.-
reumatoïde artritis	M05-M06
lupus erythematoses disseminatus [LED]	M32.-
systemische sclerose	M34.-
chronische nierziekte/insufficiëntie	N18.-
aanwezigheid van niertransplantaat	Z94.0
aanwezigheid van harttransplantaat	Z94.1
aanwezigheid van longtransplantaat	Z94.2
aanwezigheid van hart-longtransplantaat	Z94.3
aanwezigheid van levertransplantaat	Z94.4
aanwezigheid van darmtransplantaat	Z94.8
aanwezigheid van pancreastransplantaat	Z94.8
aanwezigheid van therapeutische cardiale en vasculaire implantaten en transplantaten	Z95.-
afhankelijkheid van kunsthart	Z99.4