

Handleiding Morfologiecodering (ICD-O-3.2) in de LBZ

Publicatie januari 2021

Codeerinstructie morfologie in de LBZ

Met ingang van het registratiejaar 2021 vindt de morfologiecodering binnen de LBZ plaats aan de hand van de ICD-O-3.2 (Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie, 3e editie, 2^{de} versie).

De topografiecode wijkt bij de ICD-O-3.2 in een aantal gevallen af van de ICD-10. Voor de lokalisatie van de tumor moet hierom de ICD-10 worden aangehouden. Niet alle secundaire lokalisaties zijn in de ICD-O-3.2 opgenomen. Derhalve gebruiken we bij secundaire lokalisaties altijd de morfologie van de primaire lokalisatie (/3).

Als uw ziekenhuis geen morfologiecodes aanlevert voor de LBZ, verandert er niets.

Indien u wel de morfologie codeert, gebruik dan voor de lokalisatie de ICD-10 en voor de morfologie de ICD-O-3.2.

Hieronder vindt u een codeerinstructie voor de registratie van de topografie en de morfologie van nieuwvormingen. Bestudering van de zoekpaden, aanwijzingen en voorbeelden, geeft u voldoende expertise voor een juiste toepassing van de ICD-O-3.2 in combinatie met de ICD-10 in de dagelijkse codeerpraktijk.

De ICD-O-3.2 met morfologiecodes uit de numerieke- en alfabetische lijst vindt u als Excelbestand [hier](#) (via pagina Downloads en Links van WHO-FIC.NL). De numerieke lijst staat in het eerste tabblad en de alfabetische lijst in het tweede tabblad. De ICD-O-3.2 codes worden voor in de LBZ-medisch aangeduid met een 'M' als eerste teken. Waar in de ICD-O-3.2 bij carcinoom NNO code 8010/3 staat, registreert u in de LBZ-medisch M8010/3.

Zoekpaden

De topografische term uit -hoofdstuk II van de ICD-10-, zoekt u op in sectie I van de **alfabetische lijst van de ICD-10**. De mogelijkheden zijn:

1. het orgaan, de lokalisatie of nieuwvorming staan genoemd met een code uit hoofdstuk II van de ICD-10.
2. het orgaan, de lokalisatie of nieuwvorming staan niet genoemd: volg dan de 'zie Neoplasma'-verwijzing naar de lijst neoplasmata naar anatomische lokalisatie
3. er is geen 'zie'- verwijzing aanwezig: volg de instructie bij het hoofdwoord

De morfologische term zoekt u via de **alfabetische lijst van de ICD-O-3.2** in het tweede tabblad van het [Excel bestand](#).

Aanwijzingen

Secundaire tumoren (metastasen) coderen met /3

Er staan in de ICD-O-3.2 totaal 6 morfologiecodes voor metastasen met /6 als gedragscode.

Afgesproken is om deze /6 codes niet te gebruiken in de LBZ. In plaats van de /6 code wordt de /3 code gebruikt voor de morfologiecodering van metastasen. De secundaire lokalisaties worden in de ICD-10 als zodanig al beschreven in de drie-teken categorieën (C77-C79). Voor de morfologiecodering van **een primaire tumor met één of meerdere metastasen volstaat dus één M-code met /3**.

Termen bij multipele morfologie

Indien de histologie van de tumor door de omschrijving **meerdere M-codes** zou opleveren, codeer dan het codenummer dat het meest specifiek is (meestal de hoogste code).

Handleiding Morfologiecodering (ICD-O-3.2) in de LBZ versie 20210111

Suggesties uit de ICD-O-3.2

De ICD-O-3.2 bevat morfologietermen die een suggestie geven voor een topografiecode (C-code). De suggesties naar deze topografiecodes staan tussen haakjes vermeld achter de morfologietermen. Deze suggesties mogen niet gebruikt worden in het zoekpad naar de topografiecode in de ICD-10! De opbouw van de topografie in de ICD-O-3.2 verschilt te veel ten opzichte van de topografie in de ICD-10. Zo zijn suggesties in de ICD-O-3.2 voor benigne neoplasmata allemaal voorzien van een topografiecode uit de categorieën C00-C97, terwijl de benigne neoplasmata in de ICD-10 te vinden zijn in de categorieën D10-D36. Verder staan er in de ICD-O-3.2 codes die onbestaanbaar zijn in de ICD-10. C42 "Hematopoëtisch en reticulo-endotheliaal stelsel" is bijvoorbeeld een categorie met codes die niet bestaan in de ICD-10.

Codeer daarom de topografie altijd rechtstreeks via de zoekpaden in de ICD-10! Negeer de suggesties uit de ICD-O-3.2.

Termen met een gewijzigde gedragscode

Bij sommige termen in de ICD-O-3.2 is de gedragscode gewijzigd. Bij een gewijzigde gedragscode in de ICD-O-3.2 mag de ICD-10 topografiecode niet worden gewijzigd (bijvoorbeeld van D.-- naar C.--). In een enkel geval kan er bijvoorbeeld een D-code staan uit de ICD-10 met een /3 code voor de morfologie (zie voorbeeld 5).

Codeer daarom de topografie altijd rechtstreeks via de zoekpaden in de ICD-10!

Voorbeelden

(In onderstaande voorbeelden zijn alle morfologiecodes voorzien van een M als eerste teken)

1. Talgklieradenoom hals
Zoekpad topografie ICD-10
Adenoom
- talgklier (M8410/0) – zie Neoplasma, huid, benigne
Neoplasma
- huid
- - hals benigne **D23.4**

Zoekpad morfologie ICD-O-3.2
Talgklieradenoom: **M8410/0** (C44._)

Aanwijzing: negeer de suggestie C44._

2. Sessiel adenoom caecum
Zoekpad topografie ICD-10
Adenoom (M8140/0) – zie ook Neoplasma, benigne
Neoplasma
- caecum benigne **D12.0**

Zoekpad morfologie ICD-O-3.2
Sessiel adenoom, NNO: **M8213/0**

3. Kleincellig longcarcinoom LBK met mediastinale lymfekliermetastasen
Zoekpad topografie ICD-10

Carcinoom (M8010/3) – *zie ook* Neoplasma, maligne
Neoplasma

- long

- - bovenkwab maligne **C34.1**

Metastase, metastatisch

- uitzaaiing (naar)(M8000/6) – *zie* Neoplasma, metastatisch, naar lokalisatie
Neoplasma

- lymfe

- - klier

- - - mediastinaal, metastatisch **C77.1**

Zoekpad morfologie ICD-O-3.2

Kleincellig carcinoom, NNO **M8041/3**

Aanwijzing: codeer secundaire tumoren (metastasen) met /3

4. Opname voor longmetastasen van een verwijderd melanoom van de huid

Zoekpad topografie ICD-10

Metastase, metastatisch

- uitzaaiing (naar)(M8000/6) – *zie* Neoplasma, metastatisch, naar lokalisatie
Neoplasma

- long, metastatisch **C78.0**

Zoekpad morfologie ICD-O-3.2

Melanoom, NNO: **M8720/3**

5. Myelodysplastisch syndroom NNO

Zoekpad topografie ICD-10

Syndroom

- myelodysplastisch **D46.9**

Zoekpad morfologie ICD-O-3.2

Myelodysplastisch syndroom, NNO **M9989/3**

Aanwijzing: bij een gewijzigde gedragscode in de ICD-O-3.2 mag de ICD-10 topografiecode niet worden gewijzigd (van D.—naar C.--)!

6. Plaveiselcelcarcinoom tongbasis met lymfekliermetastase hals

Zoekpad topografie ICD-10

Carcinoom (M8010/3) – *zie ook* Neoplasma, maligne

Neoplasma

- tong

- - tongbasis, maligne **C01**

Metastase, metastatisch

- uitzaaiing (naar)(M8000/6) – *zie* Neoplasma, metastatisch, naar lokalisatie
Neoplasma

- lymfe

- - klier

- - - hals, metastatisch **C77.0**

Zoekpad morfologie ICD-O-3.2
Plaveiselcelcarcinoom, NNO M8070/3

Aanwijzing: het is voor de lymfekliermetastase in de hals niet toegestaan om morfologiecode M8070/6 te gebruiken! Afgesproken is om de /6 codes niet te gebruiken in de LBZ. In plaats van de /6 code wordt de /3 code gebruikt voor de morfologiecodering van metastasen. **Ook als u via het zoekpad in de ICD-O-3.2 uitkomt op een /6 code, gebruik dan een /3 code!**