

# Handleiding

# Morfologiecodering in de LBZ

Publicatie februari 2014

## Codeerinstructie morfologie in de LBZ

Met ingang van het registratiejaar 2014 vindt de morfologiecodering binnen de LBZ plaats aan de hand van de ICD-O-3 (Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie, 3e editie). De eigen morfologiecoderingen van de ICD-10 zijn net als bij de ICD-9 gebaseerd op de ICD-O-2. De afgelopen jaren is gebleken dat deze morfologiecodering teveel verouderd is. In Nederland wordt voor de kankerregistratie de ICD-O-3 gebruikt. Deze classificatie lost veel problemen met de ICD-O-2 op. Ook PALGA gebruikt de ICD-O-3.

De topografiecode wijkt bij de ICD-O-3 in een aantal gevallen af van de ICD-10. Voor de lokalisatie van de tumor moet hierom de ICD-10 worden aangehouden. Niet alle secundaire lokalisaties zijn in de ICD-O-3 opgenomen. Derhalve gebruiken we bij secundaire lokalisaties altijd de morfologie van de primaire lokalisatie (/3). Metastasen die voorheen met de morfologiecode /6 werden gecodeerd krijgen vanaf registratiejaar 2014 dus een morfologiecode /3. Voor de foutencontrole heeft dit geen consequenties. Regel bij de foutencontrole is dat meerdere codes uit hoofdstuk 2 direct gevolgd moeten worden door een morfologiecode indien uw ziekenhuis morfologiecodes aanlevert voor de LBZ. Verder zijn er in de morfologie van de ICD-O-3 een aantal gedragscodes veranderd, bijvoorbeeld voor het Myelodysplastisch syndroom NNO (in de ICD-O-2 was dit M9989/1, in de ICD-O-3 is dit M9989/3, zie voorbeeld 5).

Als uw ziekenhuis geen morfologiecodes aanlevert voor de LBZ, verandert er niets. Indien u wel de morfologie codeert, gebruik dan voor de lokalisatie de ICD-10 en voor de morfologie de ICD-O-3.

Hieronder vindt u een codeerinstructie voor de registratie van de topografie en de morfologie van nieuwvormingen. Bestudering van de zoekpaden, aanwijzingen en voorbeelden, geeft u voldoende expertise voor een juiste toepassing van de ICD-O-3 in combinatie met de ICD-10 in de dagelijkse codeerpraktijk.

De ICD-O-3 (derde editie) met morfologiecodes uit de numerieke lijst (pag. 69 t/m 106) en alfabetische index (pag. 107 t/m 217) vindt u [hier](#).

Pathologen coderen de morfologie m.b.v. de ICD-O-3 in PALGA (Pathologisch Anatomisch Geautomatiseerd Archief). Geadviseerd wordt de ICD-O-3 codering t.b.v. PALGA over te nemen, in plaats van zelf te coderen. Dit leidt tot minder werk (niet meer zelf coderen van de morfologie) en een betere kwaliteit.

## Zoekpaden

**De topografische term** uit -hoofdstuk II van de ICD-10-, zoekt u op in sectie I van de **alfabetische lijst van de ICD-10**. De mogelijkheden zijn:

1. het orgaan, de lokalisatie of nieuwvorming staan genoemd met een code uit hoofdstuk II van de ICD-10.
2. het orgaan, de lokalisatie of nieuwvorming staan niet genoemd: volg dan de 'zie Neoplasma'-verwijzing naar de lijst neoplasmata naar anatomische lokalisatie
3. er is geen 'zie'- verwijzing aanwezig: volg de instructie bij het hoofdwoord

**De morfologische term** zoekt u via de **alfabetische index van de ICD-O-3** op (blz 107 t/m 217).

De mogelijkheden zijn:

1. de morfologische term staat genoemd met een morfologiecode uit de numerieke lijst van de ICD-O-3 (blz 69 t/m 106)
2. de morfologische term staat genoemd, maar er wordt geen ICD-O-morfologiecode gegeven na de M- maar wel zeven streepjes (M-----): deze aandoeningen worden niet beschouwd als neoplasmata en krijgen dus ook geen M-code

## Aanwijzingen

### Secundaire tumoren (metastasen) coderen met /3

Er staan in de ICD-O-3 totaal 7 morfologiecodes voor metastasen met /6 als gedragscode.

Afgesproken is om deze /6 codes niet te gebruiken in de LBZ. In plaats van de /6 code wordt de /3 code gebruikt voor de morfologiecodering van metastasen. De secundaire lokalisaties worden in de ICD-10 als zodanig al beschreven in de drie-teken categorieën (C77-C79). Voor de morfologiecodering van **een primaire tumor met één of meerdere metastasen volstaat dus één M-code met /3.**

### Termen bij multipele morfologie

Indien de histologie van de tumor door de omschrijving **meerdere M-codes** zou opleveren, codeer dan het codenummer dat het meest specifiek is (meestal de hoogste code).

### Suggesties uit de ICD-O-3

De ICD-O-3 bevat morfologietermen die een suggestie geven voor een topografiecode (C-code). De suggesties naar deze topografiecodes staan tussen haakjes vermeld achter de morfologietermen. Deze suggesties mogen niet gebruikt worden in het zoekpad naar de topografiecode in de ICD-10! De opbouw van de topografie in de ICD-O-3 verschilt te veel ten opzichte van de topografie in de ICD-10. Zo zijn suggesties in de ICD-O-3 voor benigne neoplasmata allemaal voorzien van een topografiecode uit de categorieën C00-C97, terwijl de benigne neoplasmata in de ICD-10 te vinden zijn in de categorieën D10-D36. Verder staan er in de ICD-O-3 codes die onbestaanbaar zijn in de ICD-10. C42 "Hematopoëtisch en reticulo-endotheliaal stelsel" is bijvoorbeeld een categorie met codes die niet bestaan in de ICD-10.

**Codeer daarom de topografie altijd rechtstreeks via de zoekpaden in de ICD-10! Negeer de suggesties uit de ICD-O-3.**

### Termen met een gewijzigde gedragscode

Bij sommige termen in de ICD-O-3 is de gedragscode gewijzigd. Bij een gewijzigde gedragscode in de ICD-O-3 mag de ICD-10 topografiecode niet worden gewijzigd (bijvoorbeeld van D.-- naar C.--). In een enkel geval kan er bijvoorbeeld een D-code staan uit de ICD-10 met een /3 code voor de morfologie (zie voorbeeld 5).

**Codeer daarom de topografie altijd rechtstreeks via de zoekpaden in de ICD-10!**

## Voorbeelden

1. Talgklieradenoom hals  
Zoekpad topografie ICD-10  
Adenoom  
- talgklier (M8410/0) – *zie* Neoplasma, huid, benigne  
Neoplasma  
- huid  
- - hals benigne **D23.4**  
  
Zoekpad morfologie ICD-O-3  
Adenoom, talgklier: **M8410/0** talgklier (C44.\_)  
  
Aanwijzing: negeer de suggestie C44.\_
2. Sessiel adenoom caecum  
Zoekpad topografie ICD-10  
Adenoom (M8140/0) – *zie ook* Neoplasma, benigne  
Neoplasma  
- caecum benigne **D12.0**  
  
Zoekpad morfologie ICD-O-3  
Adenoom, sessiel: **M8213/0** sessiel
3. Kleincellig longcarcinoom LBK met mediastinale lymfekliermetastasen  
Zoekpad topografie ICD-10  
Carcinoom (M8010/3) – *zie ook* Neoplasma, maligne  
Neoplasma  
- long  
- - bovenkwab maligne **C34.1**  
Metastase, metastatisch  
- uitzaaiing (naar)(M8000/6) – *zie* Neoplasma, metastatisch, naar lokalisatie  
Neoplasma  
- lymfe  
- - klier  
- - - mediastinaal, metastatisch **C77.1**  
  
Zoekpad morfologie ICD-O-3  
Carcinoom, kleincellig, NNO **M8041/3**  
  
Aanwijzing: codeer secundaire tumoren (metastasen) met /3
4. Opname voor longmetastasen van een verwijderd melanoom van de huid  
Zoekpad topografie ICD-10  
Metastase, metastatisch

- uitzaaiing (naar)(M8000/6) – zie Neoplasma, metastatisch, naar lokalisatie Neoplasma
- long, metastatisch **C78.0**

Zoekpad morfologie ICD-O-3  
Melanoom, NNO: **M8720/3** NNO

Zoekpad ICD-10 verwijderd melanoom van de huid  
Anamnese

- maligne neoplasma
- - huid **Z85.8**

5. Myelodysplastisch syndroom NNO  
Zoekpad topografie ICD-10  
Syndroom
- myelodysplastisch (M9989/1) **D46.9**

Zoekpad morfologie ICD-O-3  
Myelodysplastisch syndroom **M9989/3** NNO

Aanwijzing: bij een gewijzigde gedragscode in de ICD-O-3 mag de ICD-10 topografiecode niet worden gewijzigd!

6. Plaveiselcelcarcinoom tongbasis met lymfekliermetastase hals  
Zoekpad topografie ICD-10  
Carcinoom (M8010/3) – zie ook Neoplasma, maligne Neoplasma
- tong
  - - tongbasis, maligne **C01**
- Metastase, metastatisch
- uitzaaiing (naar)(M8000/6) – zie Neoplasma, metastatisch, naar lokalisatie Neoplasma
  - lymfe
  - - klier
  - - - hals, metastatisch **C77.0**

Zoekpad morfologie ICD-O-3  
Plaveiselcel(-), Carcinoom, NNO **M8070/3**

Aanwijzing: het is voor de lymfekliermetastase in de hals niet toegestaan om morfologiecode M8070/6 te gebruiken! Afgesproken is om de /6 codes niet te gebruiken in de LBZ. In plaats van de /6 code wordt de /3 code gebruikt voor de morfologiecodering van metastasen. **Ook als u via het zoekpad in de ICD-O-3 uitkomt op een /6 code, gebruik dan een /3 code!**

